

QUALL ECZEMA CREAM

Betamethasone (as Betamethasone Dipropionate USP) (0.05% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Quall Eczema Cream
2. Bagaimana Quall Eczema Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Quall Eczema Cream
4. Cara menggunakan Quall Eczema Cream
5. Semasa menggunakan Quall Eczema Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Quall Eczema Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Quall Eczema Cream

Quall Eczema Cream digunakan untuk melegakan keradangan kulit seperti kemerahan, bengkak, dan gatal-gatal dalam keadaan kulit tertentu yang bertindak balas terhadap rawatan steroid.

Bagaimana Quall Eczema Cream berfungsi

Ubat ini mengandungi Betamethasone dipropionate, glukokortikoid sintetik.

Ia berfungsi dengan mengurangkan kemerahan, keradangan, bengkak, dan kerengsaan pada kulit.

Sebelum menggunakan Quall Eczema Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan ubat ini jika:

- anda alah kepada betamethasone atau mana-mana bahan-bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut)

- Sebelum menggunakannya

Beritahu doktor atau ahli farmasi:

- Keadaan kesihatan anda, alahan dan semua ubat yang sedang anda ambil.
- Jika anda mempunyai sebarang jangkitan kulit.
- Jika anda mempunyai diabetes (kencing manis). Ubat steroid boleh meningkatkan paras glukosa

(gula) dalam darah atau air kencing anda. Doktor anda perlu melaraskan dos ubat diabetes anda.

Jika anda tidak pasti sama ada mana-mana perkara di atas berkenaan dengan anda, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Quall Eczema Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Krim ini adalah untuk penggunaan luaran sahaja.

Sapu krim dengan lapisan yang nipis pada kawasan kulit yang terjejas 2 kali sehari, pada waktu pagi dan petang.

- Bila perlu digunakan

Sapukan dua kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Setelah kulit anda bertambah baik, anda mungkin tidak perlu menggunakannya dengan kerap.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan terlalu banyak krim ini boleh membenarkannya diserap ke dalam badan dan menyebabkan kesan sampingan seperti peningkatan berat badan, wajah yang lebih bulat, gula darah tinggi (rasa lebih dahaga atau kencing lebih kerap), gula dalam air kencing, dan ketidakseimbangan hormon sementara di mana badan menghasilkan lebih sedikit steroid semula jadi. Jika ini berlaku, doktor anda mungkin akan mengurangkan kekerapan penggunaannya, menghentikan rawatan, atau beralih kepada krim yang lebih lembut, dan dalam beberapa kes memberikan ubat tambahan jika gejala berlaku selepas menghentikan penggunaan. Kesan-kesan ini biasanya boleh dipulihkan setelah rawatan disesuaikan atau dihentikan atas nasihat perubatan.

Semasa menggunakan Quall Eczema Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Basuh tangan sebelum dan selepas menggunakan krim ini.

Bersihkan dan keringkan bahagian kulit yang terjejas sebelum menyapukan krim.

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada doktor dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Quall Eczema Cream.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Quall Eczema Cream adalah untuk kegunaan luaran sahaja. Jangan masukkan krim ke dalam mulut anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Quall Eczema Cream dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Jangan gunakan di dalam atau di sekeliling mata

Jangan gunakan lebih daripada dos yang disyorkan oleh doktor anda.

Jangan tutup kawasan kulit yang dirawat melainkan jika diarahkan oleh doktor anda. Menutup kulit boleh meningkatkan jumlah ubat yang diserap ke dalam kulit, ini boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini.

Jangan gunakan pada kanak-kanak tanpa nasihat doktor. Kanak-kanak boleh menyerap lebih banyak ubat ini melalui kulit (disebabkan oleh luas permukaan kulit yang besar kepada nisbah berat badan) dan berkemungkinan besar mengalami kesan sampingan. Ubat ini juga boleh menjejaskan pertumbuhan kanak-kanak.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Perhatikan sebarang kerengsaan kulit, penipisan, atau jika keadaan kulit anda semakin teruk dan maklumkan kepada doktor anda jika ini berlaku. Jika anda melihat tanda-tanda jangkitan seperti kemerahan, bengkak, atau nanah, dapatkan nasihat doktor dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan-kesan sampingan yang boleh disebabkan oleh kortikosteroid topikal termasuk penipisan kulit, tanda regangan kulit serta jerawat.

Kegunaan dalam jangka masa panjang, dalam kuantiti yang banyak, atas luka terbuka serta dalam pembalut luka occlusive boleh menyebabkan sindrom Cushing.

Kegunaan dalam kalangan kanak-kanak dalam tempoh yang lama boleh mengganggu kadar pertumbuhan.

Jika anda mengalami sebarang gejala, sila dapatkan nasihat doktor anda secepat mungkin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Quall Eczema Cream

- Penyimpanan
Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Jangan dibekukan.

Simpan pada suhu di bawah 30°C.

- Pelupusan
Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Krim putih licin dalam pek tiub aluminium 15 g.
- Bahan-bahan kandungan
 - Bahan aktif
 - Betamethasone Dipropionate

- Bahan tidak aktif
 - Chlorocresol
 - White Soft Paraffin
 - Cetomacrogol 1000
 - Sodium Acid Phosphate
 - Liquid Paraffin
 - Purified Water
 - Cetostearyl Alcohol
 - Sodium Hydroxide
 - Phosphoric Acid

- Nombor MAL
MAL11060001AZ

Pengilang

TORRENT PHARMACEUTICALS LTD.,
Plot No. 810, Sector III,
Industrial Area, Pithampur,
District Dhar - 454 775 (M.P.)
India

Pemegang Pendaftaran Produk

Zulat Pharmacy Sdn Bhd
No. 23 & 23A, Jalan Bandar 3,
Taman Melawati, 53100
Kuala Lumpur,
Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP
19/05/2026

Nombor Siri

NPRA(R4/1)090426/00015