

EPIKLIN SKIN OINTMENT

Betamethasone Dipropionate, Salicylic Acid (0.064% w/w, 3.0% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Epiklin Skin Ointment
2. Bagaimana Epiklin Skin Ointment berfungsi
3. Sebelum menggunakan Epiklin Skin Ointment
4. Cara menggunakan Epiklin Skin Ointment
5. Semasa menggunakan Epiklin Skin Ointment
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Epiklin Skin Ointment
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Epiklin Skin Ointment

Epiklin Skin Ointment digunakan untuk melegakan keradangan, gatal-gatal, kemerahan dan kerak pada kulit dalam keadaan seperti ekzema, psoriasis, kelemumur (dermatitis seborrhoeic) dan gangguan kulit kering atau menebal yang lain.

Bagaimana Epiklin Skin Ointment berfungsi

Epiklin Skin Ointment mengandungi bahan aktif betamethasone dan *salicylic acid*. Betamethasone adalah kortikosteroid yang berfungsi dengan mengurangkan kemerahan, keradangan, bengkak, dan kerengsaan kulit.

Salicylic acid membantu menghilangkan kulit yang menebal dan bersisik, meningkatkan keberkesanan rawatan.

Sebelum menggunakan Epiklin Skin Ointment

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna ubat ini jika:

- anda alah kepada betamethasone atau *salicylic acid* atau mana-mana bahan lain ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut)
- anda mempunyai jangkitan kulit yang tidak dirawat (seperti bakteria, virus seperti herpes atau cacar air, atau jangkitan kulat)

- anda mempunyai keadaan kulit tertentu seperti jerawat, rosacea, atau penipisan kulit
- anda menyapunya pada kulit yang pecah atau rosak tanpa nasihat perubatan

- Sebelum menggunakannya

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika:

- Anda menggunakannya pada kanak-kanak, terutamanya untuk tempoh yang lama
- Anda bercadang untuk menggunakan pada muka, pangkal paha atau ketiak (kawasan sensitif)
- Anda perlu menggunakannya di kawasan badan yang luas badan atau untuk masa yang lama
- Anda menghidap diabetes atau peredaran darah yang lemah

Mengandung dan menyusukan anak

Jika anda hamil atau merancang untuk hamil atau sedang menyusu, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini.

Gunakan hanya jika jelas diperlukan dan untuk tempoh yang paling singkat seperti yang dinasihatkan. Jika anda hamil semasa mengambil Epiklin Skin Ointment, hentikan pengambilannya dengan segera dan hubungi doktor anda.

Jangan sapukan ubat ini pada bahagian payudara untuk mengelakkan tertelan secara tidak sengaja oleh bayi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Epiklin Skin Ointment

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk kegunaan topikal sahaja.

Sapukan lapisan nipis salap pada kawasan yang terjejas dua kali sehari. Gosok perlahan-lahan sehingga ubat meresap.

- Bila perlu digunakan

Gunakan dua kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan lebih daripada jumlah yang disyorkan atau gunakan lebih lama daripada yang disyorkan.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda atau sesiapa sahaja mungkin menggunakan terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera

Menggunakan terlalu banyak ubat ini untuk masa yang lama boleh menjejaskan keseimbangan hormon normal badan anda, tetapi ini biasanya kembali normal selepas menghentikan ubat. Ia juga boleh menyebabkan kesan sampingan daripada *salicylic acid*, seperti kerengsaan kulit.

Semasa menggunakan Epiklin Skin Ointment

- Perkara yang perlu dilakukan

Basuh tangan sebelum dan selepas menggunakan salap ini.

Bersihkan dan keringkan bahagian kulit yang terlibat sebelum menyapukan salap.

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Epiklin Skin Ointment.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- **Perkara yang tidak boleh dilakukan**

Epiklin Skin Ointment adalah untuk kegunaan luaran sahaja. Salap ini tidak boleh dimakan atau diguna pada mata.

Jangan melebihi dos yang dibenarkan.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Epiklin Skin Ointment dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- **Perkara yang perlu diberi perhatian**

Sila berunding dengan doktor anda atau ahli farmasi, terutamanya mereka cenderung untuk mengalami tindak balas alahan.

Jangan tutup kawasan yang dirawat dengan sebarang pembalut melainkan dinasihatkan oleh doktor anda, kerana ini boleh meningkatkan penyerapan ubat dan risiko kesan sampingan.

Penggunaan ubat ini untuk masa yang lama, pada kawasan yang luas, atau pada kulit yang rosak boleh meningkatkan risiko kesan sampingan.

Gunakan dengan berhati-hati jika anda menghidap psoriasis, kerana keadaan anda mungkin bertambah teruk atau kembali selepas menghentikan ubat.

Elakkan terkena mata dan membaran mukus (seperti di dalam hidung atau mulut), kerana ia boleh menyebabkan kerengsaan.

Berhati-hati apabila menggunakan ubat ini pada bayi dan kanak-kanak, kerana mereka mungkin menyerap lebih banyak ubat.

Gunakan di bawah pengawasan perubatan jika digunakan pada kawasan

yang besar, lipatan kulit, atau untuk tempoh yang berpanjangan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Epiklin Skin Ointment boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan yang mungkin termasuk:

- Kulit menjadi nipis atau lemah
- Tanda regangan muncul
- Salur darah kecil menjadi lebih kelihatan (terutama di muka)
- Terbakar, gatal-gatal, atau kerengsaan
- Kulit kering
- Benjolan kecil yang meradang di sekitar folikel rambut (seperti jerawat kecil)
- Rambut tambahan tumbuh di kawasan itu
- Letusan seperti jerawat
- Tompok kulit yang lebih cerah
- Ruam di sekitar mulut
- Reaksi kulit alahan

Jika anda mengalami tanda-tanda berterusan melebihi 7 hari, sila berjumpa dengan doktor, doktor gigi atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Epiklin Skin Ointment

- **Penyimpanan**

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Jangan bekukan.

Simpan pada suhu di bawah 30°C.

Jangan sapu ubat ini selepas tarikh luput atau jika penutup muncung tiub telah rosak atau tiub telah bocor.

- **Pelupusan**

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- **Rupa dan warna produk**

Salap putih pudar licin dalam pek tiub aluminium 15 g.

- **Bahan-bahan kandungan**

- Bahan aktif

- Betamethasone Dipropionate
- Salicylic Acid

- Bahan tidak aktif

- Liquid Paraffin
- White Soft Paraffin

- **Nombor MAL**

MAL20112105AZ

Pengilang

TORRENT PHARMACEUTICALS LTD.,
Plot No. 810, Sector III,
Industrial Area, Pithampur,
District Dhar - 454 775 (M.P.)
India

Pemegang Pendaftaran Produk

Zulat Pharmacy Sdn Bhd
No. 23 & 23A, Jalan Bandar 3,
Taman Melawati, 53100
Kuala Lumpur,
Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

29/04/2026

Nombor Siri

NPRA(R4/1)310326/00011