

DIPVITE SKIN CREAM

Betamethasone Dipropionate USP (0.064% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dipvite Skin Cream
2. Bagaimana Dipvite Skin Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dipvite Skin Cream
4. Cara menggunakan Dipvite Skin Cream
5. Semasa menggunakan Dipvite Skin Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dipvite Skin Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim tentang Dipvite Skin Cream. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang tersedia. Ia juga tidak menggantikan tempat ahli farmasi atau doktor anda.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Ahli farmasi atau doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda mengambil Dipvite Skin Cream berbanding manfaat yang mereka jangka untuk anda.

Jika anda mempunyai sebarang kemusykilan tentang pengambilan ubat ini, tanya ahli farmasi atau doktor anda.

Simpan risalah ini bersama ubat. Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan Dipvite Skin Cream

Dipvite Skin Cream digunakan untuk mengurangkan kemerahan, bengkak, dan kegatalan dalam masalah kulit tertentu seperti ekzema, keradangan kulit (dermatitis), atau alahan.

Bagaimana Dipvite Skin Cream berfungsi

Dipvite Skin Cream mengandungi bahan aktif yang dipanggil betamethasone dipropionate. Ia tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai steroid yang mempunyai tindakan anti radang, melegakan kegatalan dan penyempitan saluran darah.

Sebelum menggunakan Dipvite Skin Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- Anda alah (hipersensitif) kepada betamethasone dipropionate, kortikosteroid lain, atau mana-mana ramuan lain ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat Lanjut).

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan guna ubat ini jika anda hamil, sedang merancang untuk hamil atau mungkin hamil.

Jika anda sedang menyusukan bayi, bincang dengan doktor anda sebelum menggunakan krim ini.

Jangan sapukan krim pada bahagian payudara sejurus sebelum menyusukan bayi anda.

- Sebelum menggunakannya

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda:

- Jika anda menghadapi sebarang jangkitan kulit yang lain.
- Jika anda menghidap penyakit diabetes (kencing manis). Ubat steroid mungkin meningkatkan paras gula dalam darah atau air kencing. Doktor anda juga mungkin perlu mengubah dos ubat diabetes.

Jika anda tidak pasti, tanya doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Dipvite Skin Cream

Sentiasa guna ubat ini seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan satu lapisan yang nipis pada bahagian kulit yang terjejas sekali atau dua kali sehari sebagaimana yang telah diarahkan oleh doktor dan ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Sapukan dua kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor anda.

Gunakan untuk tempoh sesingkat mungkin dan jangan gunakan untuk tempoh yang berpanjangan melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakan secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Dipvite Skin Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Dipvite Skin Cream.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan beri ubat ini kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai tanda-tanda atau keadaan yang sama seperti anda.

Jangan guna pada atau di sekeliling mata

Jangan tutup bahagian kulit yang sedang dirawat kecuali jika diarahkan oleh doktor anda.

Menutup bahagian tersebut mungkin meningkatkan jumlah ubat yang menyerap ke dalam kulit yang boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini.

Jangan guna pada kanak-kanak tanpa nasihat doktor. Kanak-kanak mungkin menyerap ubat ini dengan lebih banyak melalui kulit (disebabkan nisbah luas permukaan kulit kepada berat badan yang besar) dan lebih cenderung untuk mendapat kesan sampingan. Ubat ini juga mungkin membantutkan pertumbuhan kanak-kanak.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Hentikan penggunaan jika berlaku kerengsaan atau kepekaan dan dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Elakkan guna ubat ini pada luka yang terdedah. Elakkan guna ubat ini pada bahagian muka, ketiak, atau pangkal paha tanpa arahan doktor anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Dipvite Skin Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Dipvite Skin Cream mengandungi chlorocresol yang boleh menyebabkan reaksi alahan.

Kesan sampingan pada kulit yang dilaporkan ialah rasa terbakar, rasa gatal-gatal, kerengsaan, kekeringan, *folliculitis* (inflamasi pada akar rambut), pertumbuhan rambut yang banyak, jerawat, kulit menjadi lembut, perubahan warna kulit, jangkitan kedua, tanda

regangan, ruam panas dan penglihatan kabur.

Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan, walaupun yang tidak dinyatakan di dalam risalah ini, maklumkan doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Dipvite Skin Cream

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terlindung daripada cahaya.

Simpan pada suhu di bawah 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Dipvite Skin Cream ialah krim putih, licin, bebas daripada bendasing.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Betamethasone Dipropionate
0.064% w/w

- Bahan tidak aktif

- Sodium Hydroxide
- Carbomer 940
- Purified Water
- Titanium Dioxide
- Propylene Glycol

- Nombor MAL
MAL09102914AZ

Pengilang

TORRENT PHARMACEUTICALS LTD.
Plot No. 810, Sector III,
Industrial Area, Pithampur,
District Dhar - 454 775 (M.P.)
India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Zulat Pharmacy Sdn Bhd
No. 23 & 23A, Jalan Bandar 3,
Taman Melawati, 53100
Kuala Lumpur,
Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

19/06/2026

Nombor Siri

NPRA(R4/1)080426/00014