

BITVIO OINTMENT

Mometasone Furoate USP (0.1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Bitvio Ointment
2. Bagaimana Bitvio Ointment berfungsi
3. Sebelum menggunakan Bitvio Ointment
4. Cara menggunakan Bitvio Ointment
5. Semasa menggunakan Bitvio Ointment
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Bitvio Ointment
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Bitvio Ointment

Bitvio Ointment digunakan untuk melegakan keradangan dan kegatalan yang disebabkan oleh masalah kulit tertentu.

Bagaimana Bitvio Ointment berfungsi

Bitvio Ointment mengandungi mometasone sebagai bahan aktif, yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil kortikosteroid. Bitvio Ointment mempunyai tindakan anti-radang, mengurangkan kegatalan dan penyempitan saluran darah.

Sebelum menggunakan Bitvio Ointment

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan terhadap mometasone furoate atau kortikosteroid lain atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

- Sebelum menggunakannya

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika:

- kawasan kulit yang terjejas adalah besar
- Anda bercadang untuk menggunakan ubat ini pada kanak-kanak.

Mengandung dan menyusukan anak

Sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengandung,

merancang untuk mengandung atau menyusukan bayi sebelum menggunakan sebarang ubat.

Ubat ini hanya boleh digunakan semasa mengandung jika benar-benar diperlukan dan atas nasihat doktor. Penggunaan dalam jumlah yang banyak atau untuk tempoh yang lama harus dielakkan.

Tidak diketahui sama ada ubat ini masuk ke dalam susu ibu dalam jumlah yang boleh menjejaskan bayi. Ibu yang menyusukan bayi harus menggunakan ubat ini dengan berhati-hati dan hanya atas nasihat doktor, selepas mempertimbangkan manfaat dan risiko dengan teliti.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Bitvio Ointment

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan lapisan nipis pada kawasan kulit yang terjejas.

- Bila perlu digunakan

Sapukan sekali sehari.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan sehingga kawasan yang terjejas sembuh atau selama 3 minggu, yang mana terdahulu, atau rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan

telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan atau terlalu lama boleh menjejaskan sistem hormon badan, menyebabkan badan menghasilkan lebih sedikit steroid semula jadi. Kesannya biasanya boleh dipulihkan.

Jika ubat ini telah digunakan untuk jangka masa yang lama, doktor mungkin menasihati untuk menghentikannya secara beransur-ansur.

Semasa menggunakan Bitvio Ointment

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Bitvio Ointment.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Bitvio Ointment kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jangan gunakan pada kawasan kulit yang luas atau untuk jangka masa yang lama melainkan dinasihatkan.
- Elakkan menutup kawasan yang dirawat dengan pembalut melainkan diarahkan.
- Jangan gunakan pada kulit yang luka, dijangkiti atau sensitif (contohnya muka atau pangkal

paha) melainkan dinasihatkan oleh doktor.

- Basuh tangan selepas menggunakan (melainkan tangan yang dirawat).
- Elakkan sentuhan dengan mata, hidung dan mulut.
- Untuk kanak-kanak, gunakan hanya kuantiti yang sedikit untuk masa yang singkat.
- Hentikan penggunaan dan berjumpa doktor jika berlaku kerengsaan atau kemerosotan.

Kesan-kesan sampingan

Sesetengah orang mungkin mengalami reaksi kulit ringan (jarang berlaku) seperti rasa terbakar, kegatalan, kesemutan, atau penipisan kulit.

Kesan kulit lain kurang berlaku, termasuk kerengsaan, pertumbuhan rambut yang meningkat, pencerahan kulit, ruam di sekitar mulut, reaksi alahan kulit, kulit yang terlalu lembap atau lembut, jangkitan kulit, tanda regangan, atau ruam panas kecil.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan *Adverse* Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Bitvio Ointment

- Penyimpanan

Simpan pada suhu di bawah 30°C.

Jangan bekukan.

Lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Salap yang licin berwarna putih hingga putih pudar.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Mometasone Furoate

- Bahan tidak aktif

- *Hexylene glycol*
- *Propylene glycol stearate*
- *Purified water*
- *White wax*
- *White soft paraffin*
- *Phosphoric acid*

- Nombor MAL

MAL09062111AZ

Pengilang

TORRENT PHARMACEUTICALS LTD.,

Plot No. 810, Sector III, Industrial Area, Pithampur,

District Dhar – 454 775 (M.P.) India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Zulat Pharmacy Sdn Bhd

No. 23 & 23A, Jalan Bandar 3,

Taman Melawati, 53100

Kuala Lumpur,

Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

19/06/2026

Nombor Siri

NPRA(R4/1)020426/00012