

Nova Gastrix Suspension

Sodium Alginate (1000 mg) Potassium Bicarbonate (200 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Nova Gastrix Suspension
2. Bagaimana Nova Gastrix Suspension berfungsi
3. Sebelum menggunakan Nova Gastrix Suspension
4. Cara menggunakan Nova Gastrix Suspension
5. Semasa menggunakan Nova Gastrix Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Nova Gastrix Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Nova Gastrix Suspension

Untuk merawat gejala refluks gastro-esofageal seperti regurgitasi asid, pedih ulu hati, ketidakhadaman yang berlaku terhadap refluks kandungan perut, contohnya, selepas pembedahan gastrik, akibat hernia hiatus, semasa mengandung atau yang disertai dengan refluks esofagitis.

Bagaimana Nova Gastrix Suspension berfungsi

Selepas pengambilan, penggantungan bertindak balas dengan asid gastrik untuk membentuk rakit gel asid alginik dengan pH hampir neutral. Ia terapung pada kandungan perut dengan berkesan (sehingga 4 jam), menghalang refluks gastro-esofagus.

Sebelum menggunakan Nova Gastrix Suspension

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda alah kepada natrium alginat, kalium bikarbonat atau mana-mana bahan yang disenaraikan di hujung risalah ini.
- Gejala tidak bertambah baik selepas tujuh hari, keadaan klinikal perlu dikaji semula.
- ia menyebabkan tindak balas alahan (mungkin tertunda) kerana produk

perubatan mengandungi *methyl hydroxybenzoate* dan *propyl hydroxybenzoate*.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mula mengambil ubat ini, berbincang dengan ahli farmasi atau doktor anda

- Sebelum menggunakannya

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Nova Gastrix Suspension jika anda:

- mengambil diet garam yang sangat terhad
- anda mempunyai tahap kalsium yang tinggi darah
- anda mempunyai tahap gastrik yang sangat rendah asid
- anak-anak anda berumur kurang daripada 12 tahun umur
- anda hamil, fikir anda hamil, mengandung atau merancang untuk hamil
- anda sedang menyusu atau merancang untuk menyusu

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Nova Gastrix Suspension

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa

Botol: Oral, 5-10 ml (satu hingga dua sudu penyukat 5 ml) selepas makan dan sebelum tidur atau semasa diarahkan.

Sachet: Dewasa, termasuk orang tua dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas: Ambil 1 sachet (10ml) selepas makan dan sebelum tidur, atau seperti yang diarahkan.

Kanak-kanak di bawah 12 tahun
Hanya boleh diambil atas nasihat perubatan.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal, sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan kembung perut.

Semasa menggunakan Nova Gastrix Suspension

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doctor atau ahli farmasi.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Nova Gastrix Suspension.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Nova Gastrix Suspension kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini tidak menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Nova Gastrix Suspension boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan yang mungkin berlaku adalah gejala alahan seperti ruam kulit atau bronkospasme, tindak balas anafilaksis atau anafilaktoid.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan *Adverse* Ubat

Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Nova Gastrix Suspension

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Simpan pada suhu di bawah 30°C. Jangan simpan di dalam peti ais.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Suspensi likat kuning air muda dengan perisa pudina

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
 - Setiap 10 ml mengandungi:
 - Sodium Alginate 1000 mg
 - Potassium Bicarbonate 200 mg
- Bahan tidak aktif
 - Xanthan Gum
 - Calcium Carbonate
 - Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil
 - Dipotassium Hydrogen Phosphate
 - Methyl Parahydroxybenzoate
 - Propyl Parahydroxybenzoate
 - Stevia Rebaudiana
 - Peppermint flavour
 - Purified Water

- Nombor MAL

MALXXXXXXX

Pengilang

Nova Laboratories Sdn. Bhd.
(179832-D)
Lot 708, Nova Avenue, Batu 4, Sungai Pelek, 43950, Sepang, Selangor, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Nova Laboratories Sdn. Bhd.
(179832-D)
Lot 708, Nova Avenue, Batu 4, Sungai Pelek, 43950, Sepang, Selangor, Malaysia

Tarikh kemas kini RiMUP

27/10/2025

Nombor Siri

NPRA (R2) 25/157