

MONOCLOX CAPSULE

Cloxacillin sodium (250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Monoclox
2. Bagaimana Monoclox berfungsi
3. Sebelum menggunakan Monoclox
4. Cara menggunakan Monoclox
5. Semasa menggunakan Monoclox
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Monoclox
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Produk Pendaftaran
10. Tarikh kemas kini RIMUP

Apakah kegunaan Monoclox

Monoclox digunakan untuk merawat pelbagai jenis jangkitan bakteria. Monoclox digunakan untuk merawat jangkitan kulit, tisu lembut, jantung, paru-paru, saluran kencing, tulang, otot, sendi dan usus.

Bagaimana Monoclox berfungsi

Monoclox mengandungi bahan aktif cloxacillin. Cloxacillin adalah sejenis ubat antibiotik yang tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil *penicillins*. Ia bertindak dengan menghalang proses penghasilan dinding sel bakteria dan seterusnya membunuh bakteria tersebut.

Sebelum menggunakan Monoclox

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan mengambil Monoclox jika anda mempunyai alahan terhadap cloxacillin, atau kumpulan ubat penicillins, cephalosporins atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).
- Jangan berikan Monoclox kepada kanak-kanak di bawah umur 6 tahun.

- Sebelum menggunakan Monoclox

Monoclox boleh menyebabkan alahan yang teruk dan reaksi kulit yang serius. Berhenti menggunakan Monoclox dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera sekiranya anda mengalami gejala berikut:

- kemerahan kulit, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda:

- Sekiranya anda pernah mengalami reaksi alahan terhadap ubat

penicillin, cephalosporin, carbapenem, ubat beta-lactam atau ubat antibiotik yang lain

- Sekiranya anda mengalami masalah buah pinggang atau hati
- Jika anda mengalami cirit-birit berair atau berdarah yang teruk, walaupun ia berlaku beberapa minggu selepas anda berhenti mengambil ubat ini
- Jika anda mengalami atau mempunyai sejarah sawan atau jangkitan otak

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusui bayi sebelum menggunakan sebarang ubat-ubatan. Jika anda hamil, ambil kapsul Monoclox dengan hati-hati seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Cloxacillin dirembeskan ke dalam susu ibu dalam jumlah yang kecil dan boleh memberi kesan kepada bayi yang menyusui. Hentikan penyusuan susu ibu dan berjumpa doktor jika anak anda mengalami cirit-birit, jangkitan yis atau ruam.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil:

- ubat cair darah
- methotrexate (ubat untuk merawat penyakit artritis reumatoid)

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat yang lain termasuk ubat yang boleh dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Monoclox

Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa: Ambil 2 kapsul

Kanak-kanak berumur di bawah umur 6 tahun dikontraindikasikan, umur 6 hingga 10 tahun, ½ dos dewasa

Doktor anda akan memberikan dos yang bersesuaian bergantung kepada keterukan jangkitan anda.

Bila perlu digunakan

Gunakan empat kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Telan kapsul Monoclox dengan segelas air, setengah jam sebelum makan.

Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Monoclox mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak kapsul Monoclox boleh menjejaskan fungsi buah pinggang anda, mengganggu fungsi otak atau menyebabkan masalah sistem pencernaan.

Semasa menggunakan MONOCLOX

- Perkara yang perlu dilakukan

- Guna ubat anda mengikut arahan doktor.
- Teruskan mengambil ubat ini walaupun anda berasa lebih baik. Jika jangkitan anda menjadi lebih teruk atau anda tidak mula berasa lebih sihat dalam masa beberapa hari atau berlaku jangkitan baru, sila berjumpa dengan doktor anda.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Monoclox.

MONOCLOX CAPSULE

Cloxacillin sodium (250mg)

- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Gunakan Monoclox hanya dengan preskripsi doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberikan Monoclox kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Setiap kapsul mengandungi 13.2mg natrium. Maklumkan kepada doktor anda jika anda perlu mengawal pengambilan garam natrium pemakanan anda.

Monoclox juga mengandungi *Sunset Yellow* yang boleh menyebabkan reaksi alahan.

Memandu dan menggunakan mesin

Monoclox tidak memberi kesan pada keupayaan memandu atau menggunakan jentera.

Kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Monoclox boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Jika anda mengalami sebarang kesan-kesan sampingan yang berikut, berhenti menggunakan ubat ini dan beritahu doktor anda dengan segera:

- Gegata, bengkak pada muka dan / atau tekak yang menyebabkan masalah pernafasan (berdehit, sesak nafas), reaksi alahan yang teruk
- Reaksi kulit yang teruk seperti kulit mengelupas, lepuh dan kemerahan.
- Loya, muntah, cirit-birit, keradangan usus besar
- Tanda-tanda gangguan fungsi hati (cirit-birit berdarah, najis pucat, kulit dan putih mata menjadi kuning)

- Kekeliruan, hilang arah, sawan atau pergerakan yang tidak normal
- Kegagalan buah pinggang, air kencing menjadi lebih gelap
- Gangguan darah yang menyebabkan jumlah sel darah putih, sel darah merah atau platelet yang rendah
- Demam

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan MONOCLOX

- Penyimpanan

Jauhi ubat-ubatan daripada kanak-kanak

Simpan ubat di bawah suhu 30°C di dalam bungkus asal

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya kepada ahli farmasi cara membuang ubat yang tidak digunakan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Kapsul gelatin keras berwarna oren dan dicetak "MEDOCHEMIE". Kapsul ini dibungkus dalam blister PVC-Alu dan ditutup dengan foil aluminium tambahan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Cloxacillin sodium

- Bahan tidak aktif

Magnesium stearate, gelatin, titanium dioxide, *Sunset Yellow*

- Nombor MAL

MAL19871957AZ

Pengilang

Medochemie Ltd, (Factory B)

48, Iapetou Street, Agios Athanassios Industrial Area, 4101 Agios Athanassios, Limassol, Cyprus

Pemegang Produk Pendaftaran

Komedic Sdn Bhd, 4 Jalan PJS 11/14, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor D.E.

Tarikh kemaskini RIMUP

15/10/2022

Nombor siri

NPRA (R4/1)140922/00071