

AKILEN

Verapamil (as hydrochloride) 40mg, 80mg

Apakah yang ada pada risalah ini:

1. Apakah kegunaan AKILEN
2. Bagaimana AKILEN berfungsi
3. Sebelum menggunakan AKILEN
4. Cara menggunakan AKILEN
5. Semasa menggunakan AKILEN
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan AKILEN
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan AKILEN

AKILEN digunakan untuk merawat dan/atau mencegah:

- Tekanan darah tinggi
- Sesetengah jenis rentak jantung yang tidak teratur
- Serangan sakit dada

Bagaimana AKILEN berfungsi

AKILEN mengandungi verapamil, yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai *calcium channel blockers*. Ia mengembangkan saluran darah untuk membolehkan pengaliran darah yang lebih tinggi.

Sebelum menggunakan AKILEN

- Bila tidak boleh menggunakan

- Janagan mengambil AKILEN jika anda:
- mempunyai alahan terhadap verapamil atau terhadap bahan lain dalam tablet ini
 - hamil atau merancang untuk mengandung
 - sedang menyusui
 - mempunyai tekanan darah rendah
 - mempunyai penyakit jantung yang lain daripada yang penyakit yang memerlukan ubat AKILEN.

- Sebelum menggunakan AKILEN

Bercakap dengan doktor anda sebelum mengambil AKILEN jika anda:

- mempunyai penyakit hati
- mempunyai penyakit buah pinggang
- mempunyai sawan

Kehamilan dan penyusuan

Verapamil tidak seharusnya diambil semasa tiga bulan pertama kehamilan. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Anda juga harus memberitahu doktor anda jika anda mengambil mana-mana yang berikut:

- sebarang ubat untuk mengurangkan tekanan darah, terutamanya ubat jenis *beta-blockers*. Ini termasuk atenolol, propranolol dan metoprolol)
- cyclosporine, ubat untuk mengelakkan penolakan transplan
- carbamazepine, phenytoin atau phenobarbitone, ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat sawan
- rifampicin, ubat antibiotik yang biasanya digunakan untuk merawat tuberculosis
- ubat lithium yang digunakan untuk merawat gangguan mental
- ubat yang dipanggil cimetidine, yang digunakan untuk merawat lebihan asid perut atau ulser
- digoxin, ubat yang digunakan untuk merawat penyakit jantung
- theophylline, ubat yang digunakan untuk merawat asma

Cara menggunakan AKILEN

- Berapa banyak harus digunakan

Hipertensi: dos biasa adalah 120mg dua kali sehari; ini boleh dinaikkan kepada 160mg dua kali sehari, atau lebih tinggi, kepada dos maksimum 480mg sehari
Angina: dos yang disyorkan adalah tiga kali sehari
Supraventricular tachycardias (degupan jantung yang cepat): dos biasa adalah 40mg-120mg tiga kali sehari, bergantung pada resopns pesakit dan keseriusan keadaan.

Kanak-kanak

Sehingga umur dua tahun: dos yang dicadangkan adalah 20mg dua atau tiga kali sehari.

Unur dua tahun ke atas: 40mg-120mg tiga kali sehari, bergantung kepada usia dan keberkesanan

- Bila perlu digunakan

Sentiasa ambil ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti. AKILEN seharusnya ditelan semasa atau sejurus selepas makan, bersama dengan

sedikit cecair. Bilangan tablet yang perlu diambil bergantung kepada rawatn anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan AKILEN untuk tempoh yang doktor cadangkan.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan AKILEN

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu pakar bedah atau doktor gigi anda bahawa anda sedang mengambil AKILEN sekiranya terdapat pembedahan telah dirancang. Ia boleh menjejaskan penggunaan anestetik

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Anda tidak boleh minum jus limau gedang semasa mengambil AKILEN.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berikan AKILEN kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Minuman alkohol dengan AKILEN boleh menyebabkan anda merasa mengantuk, pening atau pitam. Sila berhati-hati semasa anda mengambil alkohol bersama dengan AKILEN.

Memandu dan menggunakan mesin

AKILEN boleh mempengaruhi keupayaan seseorang memandu atau mengendalikan jentera, terutamanya semasa mereka mula mengambil ubat ini.

AKILEN

Verapamil (as hydrochloride) 40mg, 80mg

Jangan memandu, mengendalikan mesin atau melakukan apa-apa yang memerlukan anda berwaspada, sehingga anda mengetahui bagaimana tablet ini mempengaruhi anda.

AKILEN (40mg sahaja) mengandungi carmoisine

AKILEN mengandungi laktosa, iaitu sejenis gula. Sekiranya anda diberitahu doktor bahawa anda mempunyai intoleransi terhadap gula, hubungi doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, AKILEN boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mendapati mana-mana yang berikut:

- degupan jantung yang perlahan, cepat atau tidak teratur
- sakit dada yang berkekalan lebih daripada beberapa minit
- rasa kelemahan
- kesukaran untuk bernafas
- kebengkakan pada kaki atau pergelangan kaki
- reaksi alahan seperti ruam, kemerahan kulit, kegatalan atau kebenjolan pada kulit
- sembelit
- sakit kepala atau pening kepala
- *flushing*
- rasa loya atau muntah
- keletihan, gegaran
- sakit otot

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan AKILEN

- Penyimpanan

Jauhkan ubat-ubatan daripada kanak-kanak
Simpan ubat di bawah 30°C, dalam bungkusan asal

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda untuk cara melupuskan ubat yang tidak diperlukan

lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

AKILEN 40mg tablet bersalut filem: hijau pucat, bulat, tablet bersalut filem cembung, dengan diameter teras 7.0mm
AKILEN 80mg tablet bersalut filem: oren, bulat, dwicembung, dengan diameter teras 7.0mm

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Bahan aktif adalah verapamil hydrochloride

- Bahan tidak aktif

Bahan-bahan lain ialah:

Cangkang kapsul:

AKILEN 40mg tablet bersalut filem
Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate, opadry green OY-3875H (hypromellose E464, titanium dioxide E171, macrogol/polyethylene glycol 400, iron oxide yellow E172, indigo carmine aluminium lake E132, iron oxide black E172) PEG 6000

AKILEN 80mg tablet bersalut filem

Cellulose microcrystalline, croscarmellose sodium, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate, opadry orange OY-2500 (hypromellose E464, titanium dioxide E171, macrogol/polyethylene glycol 400, sunset yellow lake E110) PEG 6000

- Nombor MAL:

AKILEN 40mg film-coated tablets:
MAL19861544AZ

AKILEN 80mg film-coated tablets:
MAL19861548AZ

Pengilang

Medochemie Ltd, 1-10
Constantinopleos Street, 3011
Limassol, Cyprus

Pemegang Pendaftaran Produk

KOMEDIC Sdn Bhd, 4 Jalan PJS 11/14,
Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya,
Selangor DE.

Tarikh kemaskini RiMUP

02/092022

Nombor Siri

NPRA (R2/1)220908/952