

COTRIM TABLET

Sulphamethoxazole / Trimethoprim (400mg/80mg, 800mg/160mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Cotrim
2. Bagaimana Cotrim berfungsi
3. Sebelum menggunakan Cotrim
4. Cara menggunakan Cotrim
5. Semasa menggunakan Cotrim
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Cotrim
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Produk Pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Cotrim

Cotrim boleh digunakan untuk merawat:

- Jangkitan saluran pernafasan
- Jangkitan telinga dan hidung
- jangkitan saluran kencing dan prostat
- jangkitan saluran penghadaman
- jangkitan kulit

Bagaimana Cotrim berfungsi

Cotrim mengandungi sulphamethoxazole dan trimethoprim; atau biasanya dikenali sebagai cotrimoxazole.

Cotrimoxazole adalah sejenis antibiotik yang membunuh penyebab jangkitan.

Sebelum menggunakan Cotrim

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Cotrim:

- jika anda alah terhadap sulphamethoxazole, trimethoprim atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut)
- jika anda mengalami kerosakan hati yang teruk
- jika anda mengalami kerosakan atau penyakit buah pinggang yang teruk

- Sebelum menggunakan Cotrim

Beritahu doctor atau ahli farmasi anda sekiranya anda:

- mempunyai sejarah reaksi alahan yang teruk atau asma
- mempunyai penyakit hati, buah pinggang, atau sebarang gangguan darah (termasuk *porphyria*)
- mempunyai gangguan protein yang dipanggil *phenylketonuria*
- mempunyai masalah kekurangan *glucose-6-phosphate dehydrogenase* (G6PD)
- mempunyai paras potassium yang tinggi atau natrium yang rendah

- mempunyai gangguan genetik yang berkaitan intoleransi gula

Mengandung dan menyusukan anak

Jika anda mengandung atau cuba untuk hamil atau sedang menyusukan bayi, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Cotrim. Cotrimoxazole tidak boleh diambil semasa mengandung, terutamanya pada trimester pertama, melainkan jika benar-benar diperlukan. Jika digunakan semasa mengandung, anda mesti mengambil folate sebagai suplemen.

Cotrimoxazole boleh dirembeskan ke dalam susu ibu dalam jumlah yang kecil. Oleh itu, cotrimoxazole tidak disarankan untuk digunakan semasa anda menyusu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doctor atau ahli farmasi jika anda mengambil:

- rifampicin (untuk merawat tibi)
- amantadine (untuk merawat penyakit Parkinson)
- procainamide (untuk merawat degupan jantung yang tidak teratur)
- warfarin (untuk mengelakkan pembekuan darah)
- sulphonylureas (untuk merawat kencing manis)
- phenytoin (untuk sawan)
- pyrimethamine (untuk merawat malaria)
- antivirus seperti zidovudine dan lamivudine
- ubat anti kanser seperti methotrexate
- ubat untuk merawat penyakit jantung contohnya digoxin
- diuretik (untuk merawat tekanan darah tinggi)
- cyclosporine (untuk mencegah penolakan selepas pemindahan organ)

Beritahu doctor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan

Cara menggunakan Cotrim

- Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan menentukan jumlah Cotrim yang perlu diambil setiap hari. Dos dan tempoh masa anda perlu mengambil Cotrim bergantung pada jenis jangkitan yang anda alami.

Cotrim 480 tablets

Dewasa dan kanak-kanak berumur lebih 12 tahun

Dos biasa adalah dua tablet setiap 12 jam diambil selama sehingga 14 hari. Untuk jangkitan teruk, 6 tablet mungkin diberikan setiap hari dibahagikan dalam 2 atau 3 kali.

Kanak-kanak berumur 6-12 tahun yang boleh menelan tablet:

Sebiji tablet dua kali sehari

Cotrim DS 960 tablets

Dewasa dan kanak-kanak berumur lebih 12 tahun

Dos biasa adalah satu tablet setiap 12 jam diambil selama sehingga 14 hari. Untuk jangkitan teruk, 2 tablet mungkin diberikan setiap hari dibahagikan dalam 2 atau 3 kali.

- Bila perlu digunakan

Gunakan Cotrim seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Ambil Cotrim sebaiknya dengan makanan atau minuman untuk mengelakkan gangguan gastrousus.

- Berapa lama perlu digunakan

Anda mungkin perlu mengambil Cotrim sehingga 14 hari. Gunakan Cotrim untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor. Ambil ubat ini pada masa yang tetap dan habiskan antibiotik seperti yang diarahkan oleh doktor. Adalah penting untuk anda menghabiskan antibiotik, walaupun anda berasa lebih baik untuk mengelakkan jangkitan yang sama kembali.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

COTRIM TABLET

Sulphamethoxazole / Trimethoprim (400mg/80mg, 800mg/160mg)

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan rasa loya, muntah, pening dan kekeliruan.

Semasa menggunakan Cotrim

- Perkara yang perlu dilakukan

- Guna ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Cotrim.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Gunakan Cotrim hanya dengan preskripsi doktor.
- Beritahu doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami batuk dan sesak nafas yang semakin teruk.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil tablet anda tanpa nasihat doktor anda.
- Jangan guna ubat yang baharu tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi anda
- Jangan kongsi ubat anda dengan orang lain walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Berhati-hati memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana Cotrim mempengaruhi anda.

Semasa mengambil Cotrim, pastikan anda membuang air kecil dengan secukupnya untuk mengelakkan pembentukan kristal dalam air kencing.

Jika Cotrim digunakan dalam tempoh yang lama, doktor anda mungkin perlu memantau kiraan darah anda dengan kerap.

Ubat ini mengandungi laktosa. Jika anda tidak boleh mengambil gula tertentu, anda tidak boleh mengambil Cotrim.

Kesan sampingan

Seperti semua ubat, Cotrim boleh menyebabkan kesan yang tidak diingini. Walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Sangat biasa

- kandungan potassium tinggi dalam darah

Biasa

- sakit kepala
- loya, cirit-birit
- ruam kulit
- Jangkitan yis

Tidak biasa

- muntah

Sangat jarang

- kandung sel darah menurun
- reaksi alahan yang teruk dan auto-imun
- gangguan permakanan
- kemurungan dan khayalan
- sawan
- masalah keseimbangan, bunyi berdering dalam telinga dan pening
- batuk, sesak nafas, masalah pernafasan
- radang pada lidah, mulut, usus besar atau pancreas
- radang mata
- ujian fungsi hati yang tidak normal atau masalah hati seperti penyakit kuning
- tindak balas kulit yang teruk (kemerahan kulit, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata)
- sakit sendi atau otot
- masalah buah pinggang

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) of Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Cotrim

- Penyimpanan

Jauhi ubat-ubatan daripada kanak-kanak. Simpan ubat di bawah suhu 30°C di dalam bungkus asal

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet Cotrim 480mg berwarna putih, bulat, rata, bergaris ditengah, dicetak perkataan "MC", dengan diameter 12.7mm.

Tablet Cotrim DS 960mg berwarna putih, berbentuk kapsul, bergaris ditengah, dicetak perkataan "MC", saiz 17.5mmx8mm

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Tablet Cotrim 480mg mengandungi 400 mg sulfamethoxazole dan 80 mg trimethoprim.

Tablet Cotrim DS 960mg mengandungi 800 mg sulfamethoxazole dan 160 mg trimethoprim

- Bahan tidak aktif

Povidone, lactose spray dried, croscarmellose sodium dan magnesium stearate.

- Nombor MAL

COTRIM	Tablet	480mg
MAL19870922AZ		
COTRIM DS	Tablet	960mg
MAL19870913AZ		

Pengilang

MEDOCHEMIE LTD, Factory AZ, 2, Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area, Agios Athanassios, 4101 Limassol, Cyprus

Pemegang Pendaftaran Produk

Komedic Sdn Bhd, 4 Jalan PJS 11/14, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor D.E.

Tarikh Kemaskini Rimup

29/03/2023

Nombor siri

NPRA(R4/1)090323/00023