

ALMIRAL 1% GEL

Diclofenac diethylamine (1% W/W)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ALMIRAL
2. Bagaimana ALMIRAL berfungsi
3. Sebelum menggunakan ALMIRAL
4. Cara menggunakan ALMIRAL
5. Semasa menggunakan ALMIRAL
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ALMIRAL
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan ALMIRAL

Gel ALMIRAL digunakan untuk melegakan kesakitan, mengurangkan bengkak dan meredakan radang pada otot dan sendi. Untuk sapu luaran sahaja.

Bagaimana ALMIRAL berfungsi

ALMIRAL adalah sekumpulan ubat yang dipanggil "Non steroidal anti-inflammatory drug" (NSAID) yang berfungsi dengan mengurangkan hormon yang menyebabkan radang dan rasa sakit dalam badan

Sebelum menggunakan ALMIRAL

-Bila tidak boleh menggunakan

Anda tidak harus mengguna ALMIRAL:

- jika anda mempunyai alahan terhadap diclofenac atau kepada mana-mana bahan komponen gel dalam ALMIRAL
- jika anda mempunyai hipersensitiviti terhadap ubat lain yang digolong dalam kumpulan ubat NSAID atau acetylsalicylic acid (aspirin)
- jika anda mengandung dan pada trimester terakhir
- jika umur anda kurang daripada 12 tahun

-Sebelum menggunakan ALMIRAL

Sentiasa cuci tangan sebelum dan selepas mengguna gel ALMIRAL.

- Berhenti menggunakan gel ini jika kulit anda ruam, merah dan gatal
- Jangan sentuh mata anda sehingga anda telah membasuh tangan anda selepas menggunakan gel tersebut.

- Jangan mengguna gel ini pada kulit yang berdarah atau sudah luka
- Anda boleh menggunakan gel ini bersama dengan pembalut non-oklusif dan bukan pembalut oklusif kedap udara
- Jika anda telah diberitahu oleh doktor anda bahawa anda mempunyai ulser perut, keradangan usus atau hati atau buah pinggang yang lemah, hubungi doktor anda sebelum bermula rawatan ini.

Kehamilan dan Penyusuan

Sekiranya anda mengandung, menyusu atau anda rasa anda mungkin mengandung atau merancang untuk hamil, sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan gel ini. Penggunaan diclofenac pada trimester terakhir harus dielakkan. Sila rujuk doktor anda sebelum anda menggunakan ALMIRAL jika anda menyusu.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sebelum menggunakan gel ini, beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil:

- Ubat untuk masalah emosi (Lithium)
- Ubat untuk masalah jantung (Digoxin)
- Ubat untuk pencairan darah
- Ubat untuk kencing manis
- Ubat untuk menyekat imunitas badan (Ciclosporin)
- Ubat kanser (Methotrexate)
- Ubat antibiotik (Quinolone)
- Ubat NSAIDs yang lain
- Steroid
- Ubat penambahan kencing (diuretik)

Cara menggunakan ALMIRAL

-Berapa banyak harus digunakan

Guna gel ini lebih kurang saiz cheri hingga walnut dan disapu 3-4 kali sehari, pada tempat yang sakit dan digosok masuk dengan perlahan-lahan.

-Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Anda digalakkan untuk jumpa doktor jika keadaan anda bertambah baik atau bertambah teruk dalam masa 7 hari bermula rawatan ini. Gel ALMIRAL tidak boleh digunakan lebih lama daripada 14 hari.

-Jika terlupa menggunakan

Jangan bimbang jikalau anda terlupa satu dos, sapukan apabila anda masih ingat dan teruskan seperti biasa.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda secara tidak sengaja termakan gel ini, sila hubungi ahli farmasi atau doktor anda dengan segera. Jika anda tidak boleh, pergi ke hospital terdekat. Sentiasa mengambil bungkusan ubat dengan anda supaya mereka tahu apa ubat yang telah diambil.

Semasa menggunakan ALMIRAL

-Perkara yang perlu dilakukan

Cuci tangan sebelum dan selepas menggunakan gel ini. Sentiasa tutup tiub dengan ketat.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Gel ini bukan untuk dimakan. Ia juga tidak boleh dicairkan atau diadun dengan persediaan yang lain.

Jangan sekali-kali memberikan gel ALMIRAL kepada orang lain walaupun mereka mungkin mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan mengendalikan mesin

Jika anda rasa pening atau mempunyai gangguan penglihatan bila menggunakan ALMIRAL, berhenti memandu atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan yang lain, semasa rawatan dengan ALMIRAL anda mungkin mengalami beberapa kesan sampingan. Kesan sampingan adalah seperti:

- Kulit merah atau gatal
- Sakit tajam selepas menyapu gel
- Kulit sensitive kepada cahaya matahari

ALMIRAL 1% GEL

Diclofenac diethylamine (1% W/W)

Jika anda mendapati sebarang kesan sampingan, hubungi doktor anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [(Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (CONSERF) or Vaccines (AEFI))]

Cara penyimpanan dan pelupusan ALMIRAL

-Penyimpanan

- Gel ALMIRAL harus disimpan pada suhu di bawah 30°C dalam bungkus asal. Jauhi daripada kanak-kanak

-Pelupusan

Baki gel tidak harus dilupuskan melalui sisa air atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi apa yang perlu dilakukan dengan baki ubat yang tidak diperlukan lagi. Ini akan bantu melindungi alam sekitar.

ALMIRAL tidak harus digunakan selepas tarikh tamat tempoh.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Krim ALMIRAL adalah tidak berwarna, telus, licin, homogen dengan bau peppermint.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Setiap tiub gel 25g mengandungi acyclovir 1% w/w
- Bahan tidak aktif
Bahan-bahan tidak aktif untuk gel ALMIRAL ialah propylene glycol, isopropanol, carboxypolymethylene monomethylether, minyak peppermint, air.

-Nombor MAL:

MAL19913223AZ

Pengilang

Medochemie Ltd (Cogols Facility), Konstantinoupoleos 1-10, Limassol 3011, Cyprus

Pemegang Pendaftaran Produk

Komedic Sdn Bhd, 4 Jalan PJS 11/14, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya

Tarikh kemaskini RiMUP:

26/05/2025

Nombor Siri

NPRA (R4/1)080420/00058