

IPOLIPID KAPSUL

Gemfibrozil (300mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan IPOLIPID
2. Bagaimana IPOLIPID berfungsi
3. Sebelum menggunakan IPOLIPID
4. Cara menggunakan IPOLIPID
5. Semasa menggunakan IPOLIPID
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan IPOLIPID
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Produk Pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. No. siri

Apakah kegunaan IPOLIPID

IPOLIPID digunakan, bagi merawat masalah hiperlipidemia (kandungan lemak tinggi dalam darah) dan bagi mengelakkan penyakit jantung dalam pesakit yang mengalami hiperlipidemia.

IPOLIPID membantu mengurangkan kolesterol dan trigliserida (asid lemak) dalam darah. Paras kolesterol dan trigliserida yang tinggi dalam darah akan meningkatkan risiko untuk mendapat arteriosklerosis (pengerasan salur darah/arteri).

IPOLIPID juga digunakan bagi mengurangkan risiko strok, serangan jantung, atau komplikasi jantung yang lain pada pesakit yang mempunyai paras kolesterol dan trigliserida yang tinggi yang tidak dapat dibantu melalui kaedah diet atau Langkah-langkah pencegahan yang lain.

Bagaimana IPOLIPID berfungsi

IPOLIPID mengandungi bahan aktif, *gemfibrozil* yang tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai *fibrates*. Ubat-ubatan ini digunakan untuk menurunkan tahap lemak (lipid) dalam darah contohnya trigliserida.

Sebelum menggunakan IPOLIPID

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil IPOLIPID:

- Jika anda mempunyai alahan terhadap *gemfibrozil* atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini
- Jika anda mempunyai penyakit hati
- Jika anda mempunyai penyakit buah pinggang yang serius
- Jika anda mempunyai sejarah batu hempedu, penyakit hempedu dan pundi hempedu (penyakit saluran biliari).

- Jika anda pernah mengalami fotoalergi atau tindak balas fototoksik (tindak balas alahan yang dicetuskan oleh pendedahan kepada cahaya matahari) semasa rawatan dengan *fibrates*

- Sebelum mula menggunakan

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil IPOLIPID terutamanya jika anda mempunyai keadaan yang berikut:

- risiko tinggi kerosakan otot (rhabdomyolysis): faktor risiko termasuk kerosakan buah pinggang; kelenjar tiroid kurang aktif; umur melebihi 70 tahun; penggunaan alkohol yang berlebihan; sejarah sakit otot dan kelemahan sebelum ini (otot toksik) dengan *fibrate* atau statin lain; penggunaan IPOLIPID dalam kombinasi dengan statin yang digunakan untuk menurunkan tahap kolesterol seperti rosuvastatin dan simvastatin penyakit buah pinggang ringan atau sederhana
- kelenjar tiroid kurang aktif
- penyakit kencing manis

Kehamilan dan penyusuan

Jika anda sedang hamil atau menyusu, fikir anda hamil atau merancang untuk hamil, tanya doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Anda disarankan supaya tidak mengambil IPOLIPID semasa menyusukan bayi anda. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat-ubatan.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang atau pernah mengambil sebarang ubat-ubatan yang lain, termasuk ubat-ubatan yang boleh diperolehi tanpa preskripsi.

Ini termasuk:

- ubat kencing manis terutamanya rosiglitazone atau repaglinide (untuk menurunkan paras gula dalam darah)
- dasabuvir, ubat untuk merawat jangkitan hepatitis C
- selixipag, rawatan untuk tekanan darah tinggi
- ubat statin untuk menurunkan paras kolesterol seperti atorvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin and simvastatin
- dabrafenib, rawatan untuk melanoma (kanser kulit)

- loperamide, untuk cirit birit
- montelukast, untuk asma
- pioglitazone, untuk penyakit kencing manis
- warfarin, acenocoumarol, dan phenprocoumon (antikoagulan untuk mencairkan darah)
- resin-granul colestipol untuk merawat paras lemak (kolesterol) yang tinggi di dalam darah
- bexarotene, ubat untuk merawat kanser kulit
- colchicine untuk merawat penyakit gout
- paclitaxel, rawatan untuk kanser
- enzalutamide, rawatan untuk kanser prostat

Cara menggunakan IPOLIPID

- Berapa banyak harus digunakan

Dos dewasa biasa:

Telan 4 kapsul (1.2g) sehari dalam 2 dos yang terbahagikan tiga puluh minit sebelum makan.

- Bila perlu digunakan

Ubat ini diambil tiga puluh minit sebelum makan pagi dan malam

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan IPOLIPID untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk mengambil satu dos, jangan risau. Abaikan dos itu dan ambil dos seterusnya pada masa kebiasaan. Jangan gandakan dos untuk menggantikan dos yang terlupa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda secara tidak sengaja mengambil terlalu banyak IPOLIPID, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke hospital yang terdekat. Sentiasa membawa bungkusan ubat yang berlabel dengan anda.

Semasa menggunakan IPOLIPID

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan IPOLIPID.

IPOLIPID KAPSUL

Gemfibrozil (300mg)

- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan beri IPOLIPID kepada orang lain, walaupun gejala penyakit mereka adalah sama seperti anda.
- Jangan berhenti mengambil IPOLIPID melainkan diarahkan oleh doktor anda. Adalah disyorkan agar anda mengikuti semua nasihat yang diberikan semasa anda mengambil IPOLIPID supaya mendapat manfaat sepenuhnya daripada rawatan tersebut.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Dalam kes-kes yang jarang berlaku IPOLIPID boleh menyebabkan anda menjadi pening dan menjejaskan penglihatan anda, jika ini berlaku, jangan memandu atau mengendalikan jentera

Kesan-kesan sampingan

Seperti dengan ubat-ubatan yang lain, ubat ini juga boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan-kesan sampingan serius

Walaupun kesan sampingan yang serius akan berlaku, anda dinasihatkan untuk menghubungi doktor sekiranya anda mengalami simptom-simptom yang berikut selepas mengambil IPOLIPID:

Jarang (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 1,000 orang)

- tindakbalas alahan di mana muka, lidah atau tekak mungkin mula membengkak, menyebabkan kesukaran bernafas (*angioedema*)
- mengelupas dan melepuh pada kulit, mulut, mata dan alat kelamin
- ruam yang menjejaskan seluruh badan anda
- kelemahan atau kelemahan otot disertai dengan air kencing yang gelap, demam, degupan jantung yang cepat (berdebar-debar), loya atau muntah

Kesan sampingan lain yang dilaporkan termasuk:

Kesan sampingan yang sangat biasa (boleh menjejaskan lebih daripada 1 dalam 10 orang)

- senak perut

Kesan sampingan biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 10 orang)

- sakit kepala, vertigo (rasa berpusing atau bergoyang)
- cirit-birit, muntah, loya, sakit perut, sembelit, angin
- ekzema, ruam (terutamanya ruam gatal atau bengkak)
- keletihan

Kesan sampingan yang tidak biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang)

- degupan jantung tidak teratur

Jarang (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 1,000 orang)

- pengurangan atau peningkatan sel darah putih (leukopenia, eosinofilia), penyakit sumsum tulang (kegagalan sumsum tulang), anemia teruk
- kemurungan, penurunan libido
- pening, mengantuk, kebas pada anggota badan
- penglihatan kabur
- apendisitis, pankreatitis
- jaundis (kulit menguning), fungsi hati terganggu, keradangan hati (hepatitis), batu karang (*cholelithiasis*), keradangan pundi hempedu (*cholecystitis*)
- kulit merah, timbul dan gatal, rambut gugur, fotosensitiviti (sensitiviti kepada cahaya yang boleh menyebabkan perubahan warna kulit atau ruam), gatal-gatal, keradangan kulit atau kulit yang meradang mengelupas atau gugur
- sakit sendi dan jari-jemari, sendi bengkak atau kelemahan otot akibat keradangan otot (*myositis*), keradangan membran sinovial (*synovitis*),
- mati pucuk
- lebam atau pendarahan luar biasa akibat pengurangan platelet darah (*thrombocytopenia*)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan IPOLIPID

- Penyimpanan

- Jauhkan ubat-ubatan daripada kanak-kanak
- Simpan ubat di bawah 30°C, dalam bungkus asal

- Pelupusan

- Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada karton dan blister selepas EXP. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir pada bulan yang dinyatakan.
- Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda untuk cara melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Kapsul gelatin keras IPOLIPID 300mg berwarna merah *maroon*-putih, saiz "0" dan dicetak perkataan "IPOLIPID".

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Bahan aktif adalah Gemfibrozil

- Bahan tidak aktif

Bahan tidak aktif termasuk: sodium starch glycolate, colloidal hydrated silica, pregelatinised maize starch and magnesium stearate.

- Nombor MAL:

MAL19900461AZ

Pengilang

MEDOCHEMIE LTD. (Factory AZ), 2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area, Agios Athanassios, 4101 Limassol, Cyprus

Pemegang pendaftaran produk

KOMEDIC SDN BHD, 4 Jalan PJS 11/14, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor D.E.

Tarikh kemaskini RIMUP

03/04/2023

Nombor siri

NPRA(R2/1)230331/1035