

MELOX TABLET

Meloxicam (7.5mg, 15mg)

Apakah yang ada pada risalah ini:

1. Apakah kegunaan MELOX
2. Bagaimana MELOX berfungsi
3. Sebelum menggunakan MELOX
4. Cara menggunakan MELOX
5. Semasa menggunakan MELOX
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan MELOX
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan MELOX

“MELOX” digunakan untuk:

- Rawatan gejala osteoarthritis yang menyakitkan (arthrosis, penyakit sendi degeneratif)
- Rawatan gejala rheumatoid arthritis (keradangan dalam penyakit reumatik)
- Rawatan gejala ankylosing spondylitis (penyakit keradangan tulang yang kronik)

Doktor mungkin memberi anda MELOX untuk sebab yang lain. Sila rujuk kepada doktor jika anda mempunyai sebarang soalan mengapa anda diberikan ubat ini.

Bagaimana MELOX berfungsi

MELOX adalah ubat anti-inflamasi yang boleh mengurangkan sakit dan demam. Ia tergolong dalam sekumpulan ubat yang dikenali sebagai NSAIDs (ubat anti-radang bukan steroid).

Sebelum menggunakan MELOX

- Bila tidak boleh menggunakan

Anda tidak harus mengambil MELOX jika anda mempunyai:

- Anda mengandung dan sudah masuk trimester ke-tiga atau anda menyusu
- Anda alah terhadap meloxicam atau bahan lain dalam tablet ini.
- Anda alah kepada asid acetylsalicylic (aspirin) atau ubat hilang radang (NSAID)
- Anda pernah mengeluarkan bunyi semasa bernafas, terdapat halangan dalam hidung akibat bengkak di dalam lapisan hidung anda bersama

dengan hidung berair, bengkak (angioedema) pada kulit, *urticarial* (ruam bulat merah) bila mengambil acetylsalicylic acid (aspirin) atau ubat anti-radang yang lain (NSAID)

- Anda mempunyai atau pernah mengalami ulser gastrointestinal berulang atau pendarahan (ulser, perut atau usus)
- Anda pernah mengalami pendarahan gastrousus (endarahan di dalam perut atau usus) yang berkaitan dengan penggunaan NSAID
- Anda mempunyai penyakit hati yang tenak
- Anda mempunyai penyakit buah pinggang yang tenak tetapi tidak membuat dialisis
- Anda mengalami kegagalan jantung yang teruk
- Anda seorang kank-kanak atau remaja yang berumur 16 tahun ke bawah

Kehamilan dan Penyusuan

Jika anda mengandung atau menyusu anak, atau mungkin mengandung atau merancang untuk mengandung, minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini.

Wanita mengandung pada trimester ke-3 tidak seharusnya mengambil MELOX. Penggunaan MELOX perlu dielakkan jika anda merancang untuk mengandung atau sedang hamil. Rawatan MELOX pada mana-mana tahap kehamilan mestilah dibawah perskripsi doktor.

MELOX mungkin dirembes dalam susu ibu dan tidak seharusnya diambil jika anda menyusu

- Sebelum menggunakan MELOX

Beritahu ahli farmasi/doktor anda jika:

- Anda pernah mengalami ulser gastrointestinal atau pendarahan (ulser atau pendarahan perut atau usus)
- Anda mempunyai penyakit tekanan darah tinggi
- Anda adalah warga tua
- Anda mempunyai hipovolemia (pengurangan darah) yang mungkin berlaku jika anda mengalami kehilangan darah yang serius atau

terbakar, pembedahan atau kurang mengambil air

- Anda pernah mengalami paras potassium yang tinggi dalam darah

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sebelum mengambil ubat ini, beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil ubat yang lain, termasuk ubat tanpa prekspsi. Adalah amat penting untuk memaklumkan doktor jika anda mengambil:

- Ubat NSAIDs yang lain dan acetylsalicylate acid
- Trimethoprim (antibiotic)
- Cholestyramine, yang digunakan untuk menurunkan tahap kolesterol
- Ubat yang memberi kesan kepada pembekuan darah (anti-koagulan dan perencat trombosit)
- Methotrexate, yang digunakan dalam rawatan kanser, psoriasis dan rheumatism
- Diuretik (pil air) dan ubat penurun tekanan darah, seperti penghambat ACE, beta-blockers dan antagonis angiotensin II
- Lithium, yang digunakan untuk pelbagai gangguan psikologi
- Cyclosporine, tacrolimus yang digunakan untuk menindas sistem imun
- Kortikosteroid cth. glucocorticoids yang digunakan untuk alahan dan radang
- Ubat anti-murung
- Keberkesanan gegelung kontraseptif boleh dikurangkan

Cara menggunakan MELOX

- Berapa banyak harus digunakan

Doktor akan memberitahu anda berapa banyak MELOX yang perlu diambil dan bila mengambilnya.

Untuk osteoarthritis:

7.5mg sekali sehari (1 pil MELOX 7.5mg atau setengah tablet MELOX 15mg). Apabila perlu, dos boleh ditingkatkan hingga 15mg sekali sehari.

Untuk arthritis rheumatoid atau ankylosing spondylitis: 15mg sekali sehari (2 pil MELOX 7.5mg atau 1 pil MELOX 15mg). Ini boleh

MELOX TABLET

Meloxicam (7.5mg, 15mg)

dikurangkan menjadi 7.5mg sekali sehari.

Untuk warga tua: Untuk rawatan jangka panjang, 7.5mg sekali sehari (1 pil MELOX 7.5mg atau setengah tablet MELOX 15mg) disyorkan.

Jangan melebihi dos maksimum yang disyorkan sebanyak 15mg sehari. MELOX tidak boleh diberikan kepada kanak-kanak dan remaja di bawah umur 16 tahun.

Pil MELOX perlu ditelan dengan air semasa makan.

- Bila perlu digunakan

Sentiasa ambil MELOX seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Anda boleh tanya doktor atau ahli farmasi and jika anda tidak pasti.

- Berapa lama perlu digunakan

Adalah amat penting untuk bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum berhenti mengambil ubat.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil ubat, ambilnya sebaik sahaja anda ingat, melainkan ia adalah hampir masa untuk dos seterusnya. Jangan mengambil dua dos untuk mengganti dos yang dilupakan.

- Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda secara langsung atau pergi ke jabatan kecemasan hospital tempatan anda. Sentiasa bawa bungkusan ubat dengan anda, jika boleh, walaupun ia sudah kosong.

Semasa menggunakan MELOX

- Perkara yang perlu dilakukan

Semasa rawatan dengan Melox anda harus mengelakkan cahaya matahari yang berlebihan seperti berjemur kerana ia boleh mengakibatkan reaksi kulit (photosensitiviti) walaupun keadaan ini jarang berlaku.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berikan MELOX kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai

gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

MELOX mengandungi laktosa, iaitu sejenis gula.

Sekiranya anda telah diberitahu oleh doktor bahawa anda mempunyai sifat tidak toleransi terhadap sebahagian gula, hubungi doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Memandu dan mengendalikan mesin

Anda mungkin mempunyai kesn sampingan seperti gangguan penglihatan, mengantuk dan pening. Jika ini berlaku, jangan memandu atau menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mendapatnya. Jika anda mendapat apa-apa kesan sampingan berikut, berhenti mengambil MELOX dan hubungi doktor anda dengan segera:

- Masalah pencernaan (dyspepsia), rasa tidak sihat, muntah, sakit perut, kembung perut
- Sakit kepala, emosi berubah, mimpi buruk
- Alahan
- Ruam, masalah kulit yang serius cth. Sindrom Steven-Johnson
- Edema (pengumpulan air yang berlebihan pada badan)

Jangan bimbang tentang senarai kesan sampingan ini; anda mungkin tidak mengalami kesan sampingan tersebut. Jika kesan sampingan yang anda alami menjadi serius, atau jika anda mendapat kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [(Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan MELOX

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak. Simpan di tempat yang kering, pada suhu di bawah 30°C dalam bungkusan asal.

- Pelupusan

Jangan guna selepas tarikh luput yang dinyatakan pada kotak dan blister. Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui sisa air atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi apa yang perlu dilakukan dengan baki yang tidak diperlukan lagi. Ini akan bantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

- Tablet MELOX 7.5mg adalah bulat dan rata, berwarna kuning, mempunyai garisan skor pada satu belah dengan diameter 7mm.
- Tablet MELOX 15mg adalah bulat dan rata, berwarna kuning, mempunyai garisan skor pada satu belah dengan diameter 10.5mm.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
MELOX 7.5mg tablet mengandungi 7.5mg meloxicam.
MELOX 15mg tablet mengandungi 15mg meloxicam.
- Bahan tidak aktif
MELOX 7.5mg tablet mengandungi bahan-bahan tidak aktif yang terdiri daripada sodium citrate dehydrate, lactose monohydrate, microcrystalline, povidone, crospovidone, colloidal silicon dioxide dan magnesium stearate.
MELOX 15mg tablet mengandungi bahan-bahan tidak aktif yang terdiri daripada sodium citrate dehydrate, lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, povidone, crospovidone, colloidal silicon dioxide dan magnesium stearate.

- Nombor MAL:

MELOX 7.5mg Tablet
MAL20032425AZ

MELOX TABLET

Meloxicam (7.5mg, 15mg)

MELOX 15mg Tablet
MAL20032426AZ

Pengilang

MEDOCHEMIE LTD (Central
Factory), 1-10 Constantinoupoleos
Street, 3011 Limassol, Cyprus

Pemegang Pendaftaran

KOMEDIC SDN BHD, 4 Jalan PJS
11/14, Bandar Sunway, 46150 Petaling
Jaya

Tarikh kemaskini RiMUP:

25/01/2023

Nombor Siri

NPRA (R4/1) 240320/00048