

KLERIMED TABLET

Clarithromycin (250mg, 500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini:

1. Apakah kegunaan Klerimed
2. Bagaimana Klerimed berfungsi
3. Sebelum menggunakan Klerimed
4. Cara menggunakan Klerimed
5. Semasa menggunakan Klerimed
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Klerimed
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Klerimed

Klerimed digunakan untuk:

- jangkitan saluran pernafasan
- jangkitan kulit dan tisu lembut
- jangkitan *Helicobacter pylori* yang berkaitan dengan ulser duodenum

Bagaimana Klerimed berfungsi

Klerimed mengandungi bahan aktif clarithromycin yang tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil *macrolides*. Klerimed berfungsi dengan membunuh bakteria tertentu yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Klerimed

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Klerimed jika anda:

- mempunyai alahan terhadap clarithromycin, antibiotic macrolide yang lain seperti erythromycin atau azithromycin, atau mana-mana bahan-bahan lain dalam Klerimed (tersenarai dalam Maklumat lanjut)
- sedang mengambil ubat ergotamine atau dihydroergotamine
- mengambil terfenadine atau astemizole (untuk hay fever atau alahan) atau tablet cisapride (untuk pedih ulu hati) atau pimozone (ubat antipsikotik)
- mengambil ubat domperidone (digunakan untuk mual dan muntah)

- Sebelum menggunakan Klerimed

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- mempunyai masalah buah pinggang
- mempunyai masalah hati

Kehamilan dan penyusuan

Ubat ini boleh menyebabkan kemudaratan kepada janin anda. Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk mengandung atau menyusu sebelum menggunakan sebarang ubat.

Clarithromycin dirembeskan ke dalam susu ibu. Penyusuan susu ibu mesti dihentikan jika perlu mengambil Clarithromycin.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperoleh tanpa preskripsi, ubat-ubatan herba dan komplementari termasuk:

- digoxin, disopyramide (ubat untuk penyakit jantung)
- warfarin (ubat cair darah)
- carbamazepine atau phenytoin (ubat untuk sawan)
- lovastatin (untuk menurunkan kadar kolesterol)
- theophylline (untuk asma atau masalah pernafasan)
- triazolam atau midazolam (ubat bius),
- cyclosporin (digunakan untuk mencegah penolakan selepas pemindahan organ atau sumsum tulang)
- zidovudine (untuk rawatan jangkitan HIV)
- omeprazole, ranitidine (untuk gastrik)

Cara menggunakan Klerimed

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk jangkitan saluran pernafasan dan kulit:

Dos untuk orang dewasa, kanak-kanak umur 12 ke atas dan warga tua: 250mg dua kali sehari

Dos boleh ditingkatkan kepada 500mg dua kali sehari untuk jangkitan yang teruk.

Untuk jangkitan *Helicobacter pylori* di mana tablet Klerimed diambil bersama satu atau dua jenis ubat lain, doktor anda akan menentukan jumlah dan kekerapan mengikut keterukan keadaan anda.

Kombinasi rawatan yang anda terima mungkin berbeza dari yang di atas.

Doktor anda akan menentukan gabungan rawatan yang paling sesuai untuk anda. Sekiranya anda tidak yakin ubat mana yang perlu anda ambil atau berapa lama anda perlu mengambilnya, dapatkan nasihat doktor anda.

Orang yang mempunyai masalah buah pinggang yang serius

Dos akan dipinda oleh doktor anda

Kanak-kanak dibawah umur 12 tahun harus menggunakan sediaan cecair oral sahaja

- Bila perlu digunakan

Anda boleh mengambil Klerimed dengan atau tanpa makanan. Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda mungkin perlu mengambil ubat ini selama 7-14 hari bergantung kepada keterukan jangkitan anda. Rujuk doktor anda jika keadaan tidak bertambah baik. Jangan berhenti mengambil tablet walaupun anda berasa lebih baik. Adalah penting untuk menghabiskan ubat anda mengikut arahan doktor supaya jangkitan tidak kembali.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika hampir tiba masanya untuk dos seterusnya, tunggu sehingga kemudian untuk mengambil ubat dan langkau dos yang terlepas. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika menyambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukannya walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak tablet boleh menyebabkan ketidakselesaan gastrousus seperti loya, muntah dan cirit-birit.

Semasa menggunakan Klerimed

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda.

Beritahu doktor atau ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Klerimed.

KLERIMED TABLET

Clarithromycin (250mg, 500mg)

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini. Gunakan Klerimed hanya dengan preskripsi doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali dinasihatkan oleh doktor anda. Jangan mengambil sebarang ubat baharu tanpa berunding dengan doktor anda. Jangan berikan Klerimed kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sekiranya Klerimed diambil dalam tempoh masa yang lama atau berulang, terdapat kemungkinan akan berlaku jangkitan kedua yang lain. Rujuk doktor jika keadaan anda tidak bertambah baik atau bertambah buruk.

Memandu dan menggunakan mesin

Klerimed tidak mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Klerimed kadang-kadang boleh menyebabkan kesan yang tidak diingini walaupun bukan semua orang mendapatnya.

Ini termasuk:

- masalah gastrousus (loya, ketidakadaman, sakit perut, cirit-birit, muntah, keradangan mulut and lidah)
- tindak balas alahan seperti geligata atau ruam
- sakit kepala, pening, keresahan, susah tidur, kekeliruan, mimpi buruk, khayalan dan gangguan mental
- rasa sekeliling berputar, bunyi berdering dalam telinga, kehilangan pendengaran
- perubahan dalam deria rasa dan bau
- perubahan warna gigi
- penyakit hati (keputusan ujian fungsi hati yang tidak normal, keradangan hati atau penyakit kuning)
- sakit sendi, sakit otot
- masalah buah pinggang, keradangan pankreas
- perubahan rentak jantung
- pengurangan paras gula dalam darah

- sel darah putih dan platelet berkurangan
- jangkitan kulat dalam mulut

Klerimed boleh menyebabkan alahan teruk dan reaksi kulit yang serius. Berhenti menggunakan Klerimed dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang gejala berikut:

- kulit merah, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan KLERIMED

- Penyimpanan

Jauhkan ubat-ubatan daripada kanak-kanak

Simpan ubat di bawah suhu 30°C, dalam bungkusan asal

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda untuk cara melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Klerimed 250mg – tablet bersalut filem, berwarna kuning, berbentuk bujur, cembung, mempunyai garisan pada satu sisi, dengan dimensi 14 × 8mm

Klerimed 500mg – tablet bersalut filem, berwarna kuning, berbentuk bujur, cembung, mempunyai garisan pada satu sisi, dengan dimensi 19 × 10mm

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Bahan aktif adalah clarithromycin

- Bahan tidak aktif

Microcrystalline cellulose, colloidal anhydrous silica, povidone, stearic acid, talc, croscarmellose sodium, magnesium stearat, hypromellose, propylene glycol, sorbitan monooleate, vanilla dry flavour, quinoline yellow lake (E104), titanium dioksida (E171), hydroxypropyl cellulose, asid sorbik

- Nombor MAL:

Klerimed 250mg Tablet
MAL05101667AZ

Klerimed 500mg Tablet
MAL05101668AZ

Pengilang

MEDOCHEMIE (FAR EAST) LTD-ORAL FACILITY, 40, Street 6, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province, Vietnam

Pemegang Pendaftaran Produk

KOMEDIC SDN BHD
4, Jalan PJS 11/14, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor DE.

Tarikh kemaskini RiMUP

24/03/2023

Nombor Siri

NPRA (R4/1)090323/00022