

ERELAN FILM-COATED TABLETS

Moxifloxacin (400mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Erelan
2. Bagaimana Erelan berfungsi
3. Sebelum menggunakan Erelan
4. Cara menggunakan Erelan
5. Semasa menggunakan Erelan
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Erelan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Produk Pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Erelan

Erelan digunakan untuk merawat jangkitan bakteria yang disebabkan oleh bakteria yang moxifloxacin aktif terhadap:

- Jangkitan saluran pernafasan: Keradangan jangka panjang saluran pernafasan (bronkitis kronik) yang memburuk secara tiba-tiba, jangkitan peparu (pneumonia) yang diperoleh di luar hospital, atau jangkitan akut sinus
- Jangkitan ringan hingga sederhana pada saluran genital wanita (penyakit radang pelvis), termasuk jangkitan pada tiub fallopio dan jangkitan pada membran mukus rahim.
- Jangkitan kulit dan tisu lembut yang teruk (cth abses utama, luka bakar, ulser dan luka gigitan yang dijangkiti, jangkitan kaki diabetik)
- Jangkitan teruk pada rongga perut seperti abses

Bagaimana Erelan berfungsi

- Erelan mengandungi bahan aktif moxifloxacin yang tergolong dalam kumpulan antibiotik yang dipanggil fluoroquinolones. Erelan berfungsi dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Erelan

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika anda:

- Alah kepada moxifloxacin atau antibiotik quinolone yang lain atau sebarang ramuan dalam ubat ini
- Sadang mengandung atau menyusu

-Sebelum menggunakan Erelan

- Anda tidak boleh ambil ubat antibakteria fluoroquinolone, termasuk Erelan, jika anda pernah mengalami sebarang reaksi yang serius pada masa lalu semasa ambil fluoroquinolone.
- Beritahu pengamal kesihatan anda jika anda telah didiagnosis dengan pembesaran "bonjolan" saluran darah besar (aneurisma aorta atau aneurisma

periferi saluran besar).

- Beritahu pengamal kesihatan anda jika anda pernah ada episod pembedahan aorta (kekoyakan pada dinding aorta).
- Beritahu pengamal kesihatan anda jika anda mempunyai sejarah keluarga aneurisma aorta atau pembedahan aorta atau faktor risiko lain atau keadaan predisposisi (cth. Gangguan tisu penghubung seperti sindrom Marfan, atau sindrom Ehlers-Danlos vaskular, atau gangguan vaskular seperti Takayasu arteritis, arteritis sel gergasi, penyakit Behcet's, tekanan darah tinggi, atau aterosklerosis).
- Anda tidak boleh mengambil ubat antibakteria fluoroquinolone, termasuk Erelan, jika anda pernah mengalami sebarang reaksi yang serius dahulu apabila mengambil fluoroquinolone (lihat bahagian Perkara yang perlu diberi perhatian dan Kesan Sampingan). Dalam keadaan ini, anda harus maklumkan pengamal kesihatan secepat mungkin.

Amaran dan langkah berjaga-jaga

Bercakap dengan doktor anda sebelum mengambil Erelan buat kali pertama:

- Erelan boleh mengubah ECG jantung anda (rakaman elektrik jantung), terutamanya jika anda wanita, atau warga tua. Jika anda dilahirkan dengan atau mempunyai sebarang irama jantung yang tidak normal, mempunyai ketidakseimbangan garam dalam darah (terutamanya tahap rendah potassium dalam darah), mempunyai irama jantung yang sangat perlahan (dipanggil 'bradikardia'), menghidap penyakit jantung koronari, menghidap penyakit hati yang teruk (sirosis hati), atau anda sedang mengambil ubat lain yang menjejaskan irama jantung anda,
- Jika anda mengambil ubat yang mengurangkan paras kalium darah
- Jika anda mengalami sawan atau keadaan yang menyebabkan anda mengalami sawan
- Jika anda mempunyai myasthenia gravis (sejenis kelemahan otot) kerana mengambil Erelan boleh memburukkan gejala penyakit anda.
- Jika anda mempunyai atau pernah mengalami masalah kesihatan mental
- Jika anda ada sejarah penyakit gangguan tendon yang kaitkan dengan rawatan antibiotik fluorokuinolone
- Jika anda menghidap diabetes, dapatkan nasihat doktor sebelum mengambil Erelan kerana ia boleh menyebabkan gangguan pada paras gula darah, terutamanya jika anda warga tua dan

dirawat dengan ubat oral atau insulin untuk menurunkan gula darah anda. Doktor anda mungkin memantau paras gula darah anda.

- Jika anda mengalami jangkitan teruk pada saluran atas genital wanita (cth yang berkaitan dengan abses tiub fallopio dan ovari atau pelvis), yang mana doktor anda menganggap rawatan intravena perlu, rawatan dengan Erelan adalah tidak sesuai.
- Untuk jangkitan ringan hingga sederhana pada saluran atas genital wanita, doktor anda harus memberi antibiotik lain sebagai tambahan kepada Erelan.

Kanak-kanak dan remaja

Keberkesanan Erelan pada kanak-kanak dan remaja belum dikenalpasti. Tiada cadangan mengenai posologi boleh dibuat.

Mengandung dan menyusukan anak

- Jangan ambil Erelan jika anda sedang mengandung atau menyusu anak
- Dapatkan nasihat doktor anda jika anda mengandung atau menyusu anak atau merancang untuk hamil

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi:

- Ubat yang menjejaskan jantung kerana terdapat peningkatan risiko dalam perubahan irama jantung anda. Ubat yang tergolong dalam kumpulan anti-aritmia (cth quinidine, procainamide, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, dofetilide, ibutilide), antipsikotik (cth. phenothiazines, pimozide, sertindole, haloperidol, sultopride), antidepresan trisiklik, beberapa antimikrobal (cth saquinavir, sparfloxacin, erythromycin intravena, pentamidine, antimalaria terutamanya halofantrine), dan ubat-ubatan lain (cth cisapride, vincamine intravena, dan diphesine intravena).
- Ubat yang menurunkan paras potassium darah anda (cth. beberapa diuretik, julap dan enema [dos tinggi] atau kortikosteroid [ubat anti-radang], amphotericin B) atau menyebabkan degupan jantung yang perlahan kerana ini juga boleh meningkatkan risiko gangguan irama jantung yang serius semasa mengambil/menggunakan Erelan.
- [Tablet bersalut film sahaja] Sebarang ubat yang mengandungi magnesium atau aluminium seperti antasid untuk senak, atau sebarang ubat yang

ERELAN FILM-COATED TABLETS

Moxifloxacin (400mg)

mengandungi besi atau zink, mineral lain dan multi-vitamin, ubat yang mengandungi didanosin atau ubat yang mengandungi sucralfate untuk merawat gangguan gastrousus boleh mengurangkan tindakan Tablet Erelan. Oleh itu, anda perlu mengambil ubat ini sekurang-kurangnya 4 jam sebelum atau 2 jam selepas mengambil tablet Erelan.

- Antikoagulan oral (cth warfarin), doktor anda mungkin memantau masa pembekuan darah anda.
- Mengambil ubat oral *charcoal* pada masa yang sama dengan tablet Erelan mengurangkan tindakan Erelan. Oleh itu adalah disyorkan bahawa ubat-ubatan ini tidak digunakan bersama.

Erelan dengan makanan dan minuman:

Kesan Erelan tidak dipengaruhi oleh makanan termasuk produk tenusu.

Cara menggunakan Erelan

-Berapa banyak harus digunakan

Dos yang disyorkan ialah satu tablet 400mg sekali sehari dan tidak boleh lebih.

Tiada pelarasan dos diperlukan untuk pesakit tua, kumpulan etnik, pesakit dengan fungsi hati terjejas atau pesakit yang mengalami masalah buah pinggang

-Bila perlu digunakan

Tablet Erelan adalah untuk ditelan. Telan tablet secara keseluruhan dengan banyak air. Anda boleh mengambil Erelan dengan atau tanpa makanan.

-Berapa lama perlu digunakan

Tempoh rawatan bergantung kepada jenis jangkitan. Melainkan dinyatakan oleh doktor anda, tempoh penggunaan Erelan yang disyorkan adalah:

- Bronkitis kronik yang semakin teruk: 5 hari
- Jangkitan peparu (pneumonia) yang diperoleh di luar hospital: 10 hari
- Jangkitan akut pada sinus: 7 hari
- Jangkitan ringan hingga sederhana pada saluran genital atas wanita (penyakit radang pelvis): 14 hari
- Jangkitan teruk pada kulit dan tisu lembut: 7-21 hari (jumlah tempoh rawatan untuk terapi intravena diikuti dengan terapi oral)
- Jangkitan teruk pada rongga perut: 5-14 hari (jumlah tempoh rawatan untuk terapi intravena diikuti dengan oral)

Dos dan tempoh yang disyorkan tidak boleh dilebihi.

Jika anda mengambil Erelan lebih daripada yang sepatutnya

Jika anda ambil lebih daripada satu tablet yang ditetapkan sehari, dapatkan nasihat perubatan dengan segera dan, jika boleh, bawa baki tablet, pembungkusan atau risalah bersama anda untuk menunjukkan kepada doktor apa yang telah anda ambil.

-Jika anda terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil tablet anda dan ia adalah:

- **8 jam atau lebih** sehingga dos berjadual anda yang seterusnya, ambil dos anda yang terlepas dengan segera. Kemudian ambil dos seterusnya pada masa biasa anda.
- **kurang daripada 8 jam** sehingga dos dijadualkan anda yang seterusnya, jangan ambil dos yang terlepas. Ambil dos seterusnya pada masa biasa anda. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa

Semasa menggunakan Erelan

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jika anda mengalami berdebar-debar atau degupan jantung yang tidak teratur semasa tempoh rawatan, maklumkan kepada doktor anda dengan segera. Dia mungkin melakukan ECG untuk mengukur irama jantung anda.
- Risiko masalah jantung boleh meningkat dengan peningkatan dos. Oleh itu, dos yang disyorkan harus diikuti.
- Terdapat kemungkinan yang jarang berlaku bahawa anda mungkin mengalami reaksi alahan yang teruk dan tiba-tiba (tindak balas anafilaksis/*shock*) walaupun dengan dos pertama, dengan gejala: sesak dada, pening, rasa sakit atau pengan, atau pening semasa berdiri. Jika ya, henti mengambil Erelan dan dapat nasihat perubatan dengan segera.
- Erelan boleh menyebabkan radang hati yang cepat dan teruk yang boleh membawa kepada kegagalan hati yang mengancam nyawa (termasuk kes maut). Hubungi doktor anda jika anda mengalami tanda seperti cepat berasa tidak sihat dan/atau sakit yang berkaitan dengan kekuningan pada bahagian putih mata, air kencing gelap, kulit gatal, senang berdarah atau penyakit otak yang disebabkan oleh penyakit hati
- Jika anda mengalami tindak balas kulit atau melepuh dan/atau mengelupas kulit dan/atau tindak balas mukosa
- Erelan, boleh menyebabkan sawan. Jika ini berlaku, hentikan mengambil/menggunakan Erelan dan hubungi doktor anda dengan segera.
- Anda mungkin mengalami cirit-birit

semasa mengambil atau selepas mengambil Erelan. Jika ini menjadi teruk atau berterusan atau anda perasan najis anda mengandungi darah atau lendir, anda harus berhenti Erelan dan dapatkan nasihat doktor. Dalam keadaan ini, anda tidak boleh mengambil ubat yang menghentikan atau melambatkan pergerakan usus.

- Erelan boleh membuat kulit anda menjadi lebih sensitif kepada cahaya matahari atau cahaya UV. Anda harus mengelakkan pendedahan cahaya matahari yang berpanjangan atau cahaya matahari yang kuat dan tidak boleh menggunakan kerusi berjemur atau lampu UV semasa mengambil Erelan.
- Anda mungkin mengalami gejala neuropati seperti sakit, terbakar, kesemutan, kebas dan/atau lemah. Jika ini berlaku, maklum doktor anda dengan segera sebelum meneruskan rawatan dengan Erelan.
- Anda mungkin mengalami masalah kesihatan mental walaupun pertama kali mengambil Erelan. Dalam kes yang sangat jarang berlaku, kemurungan atau masalah kesihatan mental telah membawa kepada pemikiran membunuh diri dan tingkah laku yang mencederakan diri sendiri seperti percubaan membunuh diri. Jika anda mengalami reaksi sedemikian, berhenti mengambil Erelan dan maklum kepada doktor anda dengan segera.
- Anda mungkin jarang mengalami simptom kerosakan saraf (neuropati) seperti sakit, terbakar, kesemutan, kebas dan/atau lemah terutamanya pada kaki, tangan dan lengan. Jika ini berlaku, berhenti mengambil Erelan dan maklumkan kepada doktor anda dengan segera untuk mengelakkan perkembangan keadaan yang berpotensi tidak dapat dipulihkan.

Jika anda merasakan sakit yang tiba-tiba dan teruk di perut, dada atau belakang anda, pergi segera ke jabatan kecemasan.

Pelumpuhan berpanjangan dan kesan sampingan serius yang berkemungkinan tidak dapat dipulihkan

- Ubat antibakteria fluoroquinolone, termasuk Erelan, telah dikaitkan dengan kesan sampingan yang sangat jarang berlaku tetapi serius, sesetengahnya berpanjangan (berbulan-bulan atau bertahun-tahun), melumpuhkan atau berpotensi tidak dapat dipulihkan.
- Berhenti mengambil antibiotik fluoroquinolone dan hubungi pengamal kesihatan anda dengan segera jika anda

ERELAN FILM-COATED TABLETS

Moxifloxacin (400mg)

mempunyai tanda kesan sampingan berikut:

- Sakit tendon atau bengkak, selalunya bermula di buku lali atau betis. Jika ini berlaku, rehatkan kawasan yang sakit sehingga anda jumpa pengamal kesihatan anda.
 - Sakit pada sendi atau bengkak pada bahu, lengan atau kaki.
 - Kesakitan atau sensasi yang tidak normal (seperti pin dan jarum yang berterusan, kesemutan, menggelitik, kebas, atau terbakar), kelemahan pada badan anda, terutamanya pada kaki atau lengan, atau sukar berjalan.
 - Keletihan yang teruk, perasaan tertekan, kebimbangan, masalah dengan ingatan anda, atau masalah tidur yang teruk.
 - Perubahan dalam penglihatan, rasa, bau atau pendengaran.
- Beritahu pengamal kesihatan anda jika anda mengalami salah satu daripada kesan di atas semasa atau sejurus selepas mengambil fluoroquinolone - ini bermakna anda harus mengelakkannya pada masa hadapan. Anda dan pengamal kesihatan anda akan memutuskan untuk meneruskan rawatan dengan antibiotik daripada kelas lain.
 - Sakit dan bengkak pada sendi dan keradangan atau tendon koyak mungkin jarang berlaku. Risiko anda meningkat jika anda warga tua (berumur 60 tahun ke atas), telah menerima pemindahan organ, mengalami masalah buah pinggang atau jika anda sedang mengambil kortikosteroid. Keradangan dan tendon koyak mungkin berlaku dalam tempoh 48 jam bermula rawatan sehingga beberapa bulan selepas berhenti mengambil Erelan. Pada tanda pertama sakit atau keradangan tendon (contohnya di buku lali, pergelangan tangan, siku, bahu atau lutut), berhenti mengambil Erelan, hubungi pengamal kesihatan anda dan rehatkan kawasan yang sakit. Elakkan sebarang senaman yang tidak perlu kerana ini mungkin meningkatkan risiko tendon koyak.
 - Neuropati peripheral
Anda mungkin mengalami simptom kerosakan saraf (neuropati) seperti sakit, terbakar, kesemutan, kebas dan/atau lemah terutamanya pada kaki, tangan dan lengan walaupun jarang berlaku. Jika ini berlaku, hentikan mengambil Erelan dan maklumkan kepada pengamal kesihatan anda

dengan segera untuk mengelakkan keadaan menjadi tidak dapat dipulihkan.

Memandu dan mengendali mesin

Ubat ini boleh menyebabkan anda berasa pening, hilang penghilangan sekejap atau anda mungkin pengsan untuk tempoh yang singkat. Jika anda terjejas,, jangan memandu atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan yang lain, Erelan boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Fluoroquinolones telah dilaporkan menyebabkan kesan sampingan yang serius melibatkan tendon, otot, sendi dan saraf - dalam sebahagian kecil pesakit, kesan sampingan ini menyebabkan hilang upaya yang berpanjangan atau kekal

Biasa:boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 10 orang

- Superinfeksi mikotik (jangkitan kulat cth jangkitan mulut dan faraj yang disebabkan oleh Candida)
- Sakit kepala, pening
- Pemanjangan QT pada pesakit dengan hipokalemia (masa pemulihan elektrik tertunda dalam jantung (ditunjukkan oleh ECG) pada pesakit dengan paras kalium darah rendah)
- Mual, muntah, sakit gastrousus dan perut, cirit-birit
- Peningkatan transaminase (enzim hati khas dalam darah)

Jarang:boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang

- Anemia (jumlah sel darah merah rendah), leukopenia (bilangan sel darah putih rendah), neutropenia (bilangan rendah sel darah putih khas (neutrofil)), trombositopenia atau trombositemia (penurunan atau peningkatan sel darah khas yang diperlukan untuk pembekuan darah), berpanjangan masa protrombin / INR meningkat (penurunan pembekuan darah)
- Tindak balas alahan
- Pruritus (gatal), ruam, urtikaria (gatal kulit)
- Eosinofilia darah (peningkatan sel darah putih khusus (eosinofil))
- Hiperlipidemia (peningkatan lipid darah (lemak))
- Reaksi keresahan, hiperaktif/gelisah psikomotor (kegelisahan)
- Par- dan Disesthesia (sensasi kesemutan (pin dan jarum) dan/atau kebas, gangguan rasa (dalam kes yang

jarang berlaku ageusia (hilang rasa)), kekeliruan dan tidak orientasi, gangguan tidur (kebanyakannya sukar tidur), gegaran (gegar), vertigo (sensasi pening, berputar atau jatuh), mengantuk (mengantuk)

- Gangguan penglihatan termasuk penglihatan berganda dan kabur
- Pemanjangan QT (masa pemulihan elektrik tertunda dalam jantung yang ditunjukkan oleh ECG), berdebar-debar (degupan jantung tidak teratur), takikardia (degupan jantung cepat)
- Vasodilatasi (pelebaran saluran darah)
- Dyspnea (kesukaran bernafas) termasuk keadaan asma
- Mengurangkan selera makan dan pengambilan makanan, sembelit, dispepsia (sakit perut, senak, pedih ulu hati), kembung perut (angin), gastroenteritis (keradangan perut), peningkatan amilase (enzim penghadaman khas dalam darah)
- Fungsi hati terjejas, termasuk peningkatan LDH (enzim hati khas dalam darah), peningkatan bilirubin dalam darah, peningkatan gamma-glutamyl-transferase dan/atau fosfatase alkali dalam darah (enzim hati khas dalam darah)
- Arthralgia (sakit sendi), myalgia (sakit otot)
- Dehidrasi (disebabkan oleh cirit-birit atau pengurangan pengambilan cecair)
- Rasa tidak sihat (terutamanya lemah atau letih), sakit dan sakit yang tidak spesifik seperti sakit belakang, dada, pelvis dan kaki, perpeluh

Jarang:boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 1000 orang

- Tahap tromboplastin yang tidak normal (enzim khas dalam darah yang terlibat dalam pembekuan darah)
- Tindak balas anafilaksis / anafilaktoid (teruk, tindak balas alahan umum mengejut, cth kesukaran bernafas, penurunan tekanan darah, nadi cepat), edema alahan / angioedema termasuk edema laring (bengkak termasuk pembengkakan saluran pernafasan yang mungkin mengancam nyawa)
- Hiperglisemia (peningkatan gula dalam darah), hyperuricemia (peningkatan asid urik darah)
- Labiliti emosi, kemurungan (dalam kes yang jarang berlaku yang membawa kepada kecederaan diri, seperti idea/fikiran bunuh diri (keinginan untuk membunuh diri), atau percubaan membunuh diri), halusinasi
- Mimpi yang tidak normal
- Koordinasi terganggu (termasuk gangguan gaya berjalan, cth akibat

ERELAN FILM-COATED TABLETS

Moxifloxacin (400mg)

- pening atau vertigo; dalam kes yang sangat jarang menyebabkan terjatuh dengan kecederaan, pada orang tua)
- Hypoesthesia (rasa kulit berkurangan), gangguan bau (termasuk anosmia (hilang bau))
- Sawan termasuk sawan grand mal (hilang kesedaran dan pengecutan otot yang teruk)
- Fokus terganggu, pertuturan terjejas, amnesia (kehilangan separa atau keseluruhan ingatan), neuropati periferan dan polineuropati (masalah yang berkaitan dengan sistem saraf seperti sakit, terbakar, kesemutan, kebas dan/atau kelemahan pada anggota badan)
- Tinnitus (dering/bunyi di telinga), gangguan pendengaran termasuk pekak (biasanya boleh diterbalikkan)
- Takiaritmia ventrikel (irama jantung cepat yang tidak normal), pengsan (pengsan)
- Hipertensi (tekanan darah tinggi), hipotensi (tekanan darah rendah)
- Disfagia (kesukaran menelan), stomatitis (keradangan mulut), kolitis yang berkaitan dengan antibiotik (cirit-birit teruk yang mengandungi darah dan/atau lendir), yang dalam keadaan yang sangat jarang berlaku, boleh berkembang menjadi komplikasi yang mengancam nyawa
- Jaundis (kekuningan pada bahagian putih mata atau kulit), hepatitis (keradangan hati)
- Tendonitis (sakit dan bengkak tendon), peningkatan nada otot dan kekejangan, kelemahan otot
- Kerosakan atau kegagalan buah pinggang (disebabkan oleh dehidrasi esp. pada orang tua dengan gangguan buah pinggang yang sedia ada)
- Edema (bengkak tangan, kaki, buku lali, bibir, mulut, tekak)

Sangat jarang: boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 10,000 orang

- Tahap protrombin meningkat / INR menurun (peningkatan pembekuan darah) tahap protrombin / INR abnormal (pembekuan darah tidak normal)
- Kejutan anafilaksis / anafilaktoid (kejutan alahan umum yang teruk dan mendadak), berpotensi mengancam nyawa
- Hipoglisemia (penurunan gula darah)
- Depersonalisasi (perasaan mementingkan diri sendiri, tidak menjadi diri sendiri), tindak balas psikotik (berpotensi membawa kepada kecederaan diri, seperti

- idea/fikiran untuk membunuh diri (ingin membunuh diri sendiri), atau percubaan bunuh diri)
- Hyperesthesia (peningkatan sensitiviti kulit)
- Kehilangan penglihatan sementara
- Aritmia yang tidak ditentukan (irama jantung tidak normal), Torsade de Pointes (degupan jantung tidak teratur yang mengancam nyawa), henti jantung (berhenti degupan jantung)
- Hepatitis fulminan (keradangan hati yang teruk) berpotensi membawa kepada kegagalan hati yang mengancam nyawa (termasuk kes maut)
- Tindak balas kulit bulosa (melepuh yang menyakitkan di dalam mulut/hidung atau pada zakar/faraj), seperti Sindrom Stevens-Johnson atau Necrolysis Epidermal Toksik, yang berpotensi mengancam nyawa
- Irama jantung yang tidak normal, degupan jantung tidak teratur yang mengancam nyawa, degupan jantung berhenti
- Tendon koyak, arthritis (radang sendi), gangguan berjalan (disebabkan oleh gejala otot, tendon atau sendi), gejala myasthenia gravis yang semakin teruk

Dalam keadaan terpencil, beberapa reaksi buruk ubat yang serius mungkin berpanjangan (>30 hari) dan melumpuhkan; seperti tendinitis, tendon koyak, gangguan muskuloskeletal, dan tindak balas lain yang menjejaskan sistem saraf termasuk gangguan psikiatri dan gangguan deria.

Gejala berikut telah diperhatikan lebih kerap pada pesakit yang dirawat secara intravena (diikuti dengan terapi oral):

Biasa: Peningkatan gamma-glutamyl-transferase (enzim hati khas dalam darah)

Jarang: Takiaritmia ventrikel (irama jantung cepat yang tidak normal), hipotensi (tekanan darah rendah), edema (bengkak tangan, kaki, buku lali, bibir, mulut, tekak), kolitis yang berkaitan dengan antibiotik (cirit-birit teruk yang mengandungi darah dan/atau lendir), yang dalam keadaan yang sangat jarang berlaku, boleh berkembang menjadi komplikasi yang mengancam nyawa, Sawan termasuk sawan grand mal (hilang kesedaran dan pengecutan otot yang ganas), halusinasi, kerosakan dan kegagalan buah pinggang (akibat dehidrasi cth pada orang tua dengan pra -gangguan buah pinggang yang sedia ada).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan

sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Erelan

-Penyimpanan

- Simpan ubat di bawah suhu 30°C dan dalam bungkusan asal
- Jauhi ubat-ubatan daripada kanak-kanak

-Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui air sisa atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem biconvex berwarna merah, berbentuk bujur, timbul "MC" dengan dimensi nukleus 17.6mmx8mm

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: Moxifloxacin

- Bahan tidak aktif

Microcrystalline cellulose (PH101), lactose monohydrate, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, hypromellose 2910/5, macrogol 4000, Titanium dioxide (E171), Iron oxide red (E172)

-Nombor MAL

Erelan 400mg film-coated tablets MALxxxxxxxAZ

Pengilang

Medochemie (Far East) Ltd. (Oral Facility), No. 40, VSIP II Street 6, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Service-Urban Complex, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam

Pemegang Produk Pendaftaran

Komedic Sdn bhd, 4 Jalan PJS 11/14, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya

Tarikh kemaskini RiMUP

10/09/2025

Nombor siri

NPRA(R2)24/147