

YELLOW LOTION

Acriflavine hydrochloride (0.4%w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Yellow Lotion
2. Bagaimana Yellow Lotion berfungsi
3. Sebelum menggunakan Yellow Lotion
4. Cara menggunakan Yellow Lotion
5. Semasa menggunakan Yellow Lotion
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Yellow Lotion
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Yellow Lotion

Yellow Lotion adalah antiseptik yang digunakan untuk merawat jangkitan kulit yang terluka, terbakar atau sebagai disinfeksi kulit.

Bagaimana Yellow Lotion berfungsi

Yellow Lotion mengandungi acriflavine hydrochloride yang boleh menghalang pertumbuhan atau pembiakan bakteria dan juga bertindak terhadap kulat.

Sebelum menggunakan Yellow Lotion

- Bila tidak boleh menggunakan Yellow Lotion

Jangan gunakan Yellow Lotion jika anda hipersensitif kepada acriflavine hydrochloride atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam produk ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut produk).

- Sebelum menggunakan Yellow Lotion

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan ubat-ubatan.

- Jika menggunakan ubat-ubatan lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat lain termasuk ubat yang anda beli dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Yellow Lotion

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan dengan sempurna pada kawasan kulit yang terjejas. Goncangkan dengan baik sebelum digunakan.

Penyingkiran kesan kekotoran:

Gosok segera dengan serbuk pencuci atau sabun dan air panas.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor anda atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau orang lain mungkin telah menggunakan terlalu banyak ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Semasa menggunakan Yellow Lotion

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Yellow Lotion.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Yellow Lotion kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sekiranya anda melihat kesan sampingan, hentikan penggunaan ubat ini dan beritahu doktor atau ahli farmasi anda. Untuk kegunaan luar sahaja. Elakkan terkena mata, hidung dan mulut. Tidak boleh diminum.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Yellow Lotion boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

YELLOW LOTION

Acriflavine hydrochloride (0.4%w/v)

Cara penyimpanan dan pelupusan Yellow Lotion

- Penyimpanan

- Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.
- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Pastikan penutup ditutup rapat

Jangan sapu ubat ini selepas tarikh luput.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Yellow Lotion ialah larutan jernih berwarna oren kekuningan.

- Bahan-bahan

- Bahan aktif

Acriflavine hydrochloride 0.4%w/v

- Bahan tidak aktif

Sodium benzoate, purified water.

- Nombor MAL:

MAL19930003XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn. Bhd.

1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,

Taman I.K.S. Bukit Minyak,

14000 Bukit Mertajam,

Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

31/05/2021

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)170321/00019