

ACTIV-RUB LINIMENT

Methyl Salicylate (25%w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Activ-Rub Liniment
2. Bagaimana Activ-Rub Liniment berfungsi
3. Sebelum mengguna Activ-Rub Liniment
4. Cara mengguna Activ-Rub Liniment
5. Semasa mengguna Activ-Rub Liniment
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Activ-Rub Liniment
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Activ-Rub Liniment

Activ-Rub Liniment digunakan digunakan untuk melegakan sakit otot dan sendi

Bagaimana Activ-Rub Liniment berfungsi

Activ-Rub Liniment mengandungi Methyl Salicylate. Ia berfungsi dengan menyebabkan kulit berasa sejuk kemudian berasa hangat untuk mengurangkan kesakitan.

Sebelum mengguna Activ-Rub Liniment

- Bila tidak boleh mengguna

Jangan guna ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan terhadap methyl salicylate atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

- Sebelum mengguna Activ-Rub Liniment

Elakkan menggunakan pada bayi dan kanak-kanak di bawah umur 2 tahun kerana ubat ini mengandungi benzyl alcohol.

- Jika mengguna ubat- ubatan lain

Produk ini mengandungi methyl salicylate dan apabila disapu pada kulit, ia boleh diserap melalui kulit ke dalam darah. Jika anda mengambil warfarin, penggunaan berlebihan pada kulit boleh meningkatkan kemungkinan pendarahan.

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasarnya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara mengguna Activ-Rub Liniment

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan sedikit pada bahagian badan yang sakit dan urut perlahan-lahan sehingga diserap.

- Bila perlu digunakan

Guna 3 kali sehari atau mengikut keperluan untuk memberikan kesan kelegaan berterusan.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Dapatkan nasihat doktor jika gejala tidak bertambah baik.

- Jika terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan berlebihan produk ini boleh menyebabkan pening, telinga berdengung, berpeluh, loya, muntah, sakit kepala, kekeliruan mental, demam, kegelisahan, kesukaran bernafas, masalah jantung atau paras gula yang rendah.

Semasa mengguna Activ-Rub Liniment

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini
- Gunakan ubat anda betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Activ-Rub Liniment.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan gunakan sebarang ubat baharu tanpa berunding dengan doktor anda.
- Jangan memberikan Activ-Rub Liniment kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai symptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Produk ini adalah untuk kegunaan luaran sahaja. Elakkan daripada terkena mata, hidung dan mulut. Jangan sapukan pada luka.

Kesan-kesan Sampingan

Kadang-kala reaksi kulit sensitif boleh berlaku pada sesetengah orang. Ruam kulit, gatal-gatal dan kemerahan juga telah dilaporkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Activ-Rub Liniment

- Penyimpanan

- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak
- Pastikan penutup tertutup rapat selepas dibuka

- Pelupusan

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput atau jika penutup muncung tiub telah rosak atau tiub telah bocor.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair jernih, tidak berwarna, tidak berminyak dan mempunyai bau tertentu.

- Bahan-bahan

Bahan-bahan aktif
Methyl Salicylate

Bahan-bahan tidak aktif

Menthol, propylene glycol, polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, benzyl alcohol, isopropyl myristate, n-methyl-2-pyrrolidone, isopropyl alcohol.

- Nombor MAL:

MAL07082989X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn. Bhd.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

13/09/2022

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)290822/00055