

ANTISMINE SYRUP

Chlorpheniramine Maleate (2mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Antismine Syrup
2. Bagaimana Antismine Syrup berfungsi
3. Sebelum mengambil Antismine Syrup
4. Cara mengambil Antismine Syrup
5. Semasa mengambil Antismine Syrup
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Antismine Syrup
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Antismine Syrup

Antismine Syrup digunakan untuk rawatan alahan termasuk demam hay, hidung berair atau tersumbat, bersin, ruam kulit, gatal, mata berair, gatal-gatal hidung atau tekak.

Bagaimana Antismine Syrup berfungsi

Antismine Syrup mengandungi chlorpheniramine maleate bertindak melegakan alahan dengan menyekat kesan histamin. Histamin dihasilkan oleh badan semasa tindak balas alahan.

Sebelum mengambil Antismine Syrup

– Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil jika anda hipersensitif kepada chlorpheniramine maleate, antihistamin atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam produk ini.

Jangan ambil jika anda menerima terapi MAOI (Monoamine Oxidase Inhibitor) dalam tempoh 14 hari sebelumnya.

– Sebelum mula mengambil

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk mengandung atau menyusu sebelum menggunakan sebarang ubat. Sejumlah kecil antihistamin dirembeskan dalam susu ibu dan boleh menjejaskan penyusuan.

Sila dapatkan nasihat doktor jika anda mengalami :

- sawan
- penyakit jantung dan salur darah yang serius
- gangguan hati
- peningkatan tekanan di dalam mata
- pengekal kencing
- pembesaran kelenjar prostat

- halangan pada aliran keluar gastrik
- asma
- inflamasi respiratori
- kelenjar tiroid terlalu aktif
- tekanan darah yang sangat tinggi

Perhatian perlu diambil apabila memberi chlorpheniramine maleate kepada kanak-kanak dan warga tua kerana mereka lebih mudah mendapat kesan sistem saraf pusat.

– Jika mengambil ubat- ubatan lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain seperti di bawah:

- ubat penenang atau sedatif
- ubat penahan sakit jenis opioid
- phenytoin digunakan untuk merawat sawan

Cara mengambil Antismine Syrup

– Berapa banyak harus diambil

Dewasa dan kanak-kanak melebihi 12 tahun:

Ambil 10ml 3 hingga 4 kali sehari. Jangan melebihi 60ml sehari.

Kanak-kanak 6 hingga 12 tahun:

Bagi 5ml 3 hingga 4 kali sehari. Jangan melebihi 30ml sehari.

Kanak-kanak 1 hingga 5 tahun:

Bagi 2.5ml hingga 5ml 3 kali sehari. Jangan melebihi 15ml sehari.

Kanak-kanak sehingga 1 tahun:

Bagi 2.5ml 2 kali sehari. Jangan melebihi 5ml sehari.

– Bila perlu diambil

Ikut dos yang disyorkan dan jangan mengambil lebih daripada dos yang ditetapkan.

– Berapa lama perlu diambil

Ambil seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi.

– Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa ambil Antismine Syrup, ambil secepat mungkin apabila anda teringat. Jangan cuba ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

– Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah diambil. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda

mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak ubat ini boleh menyebabkan sedasi, kekeliruan atau khayalan, sawan, ketidakupayaan sementara untuk bernafas, kesan antikolinergik seperti penglihatan kabur, mulut dan kulit kering, degupan jantung tidak teratur.

Semasa mengambil Antismine Syrup

– Perkara yang perlu dilakukan

Sila merujuk kepada ahli farmasi / doktor jika simptom berlarutan selama lebih daripada 5 hari.

– Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil Antismine Syrup untuk merawat penyakit lain melainkan doktor atau ahli farmasi anda menasihati anda agar berbuat demikian.

– Perkara yang perlu diberi perhatian

Produk ini boleh menyebabkan mengantuk. Jika ini berlaku, jangan memandu atau mengendalikan jentera. Elakkan minuman beralkohol.

Kesan-kesan Sampingan

Kesan sampingan yang paling biasa termasuk mengantuk, gangguan gastrousus seperti loya, muntah, cirit-birit atau sembelit, dan sakit epigastrik, keletihan, pening, degupan jantung tidak teratur dan reaksi alahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Antismine Syrup

– Penyimpanan

- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Tutupkan penutup dengan ketat.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

– Pelupusan

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput dicetak pada label dan kotak ubat.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi

ANTISMINE SYRUP

Chlorpheniramine Maleate (2mg/5ml)

rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

– Rupa dan warna produk

Sirap jernih yang berwarna kuning kehijauan dan berperisa buah-buahan. Tanpa alkohol.

– Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Chlorpheniramine Maleate
- Bahan-bahan tidak aktif
Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Sucrose, Xanthan Gum, Liquid Glucose, Sorbitol Solution 70%, Sodium Citrate Dihydrate, Strawberry Flavour, Tutti Frutti Flavour, Quinoline Yellow, Purified Water.

– Nombor MAL:

MAL19900149AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn Bhd
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

13/01/2025

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)200624/00075