

WINDEXCO SYRUP

Dextromethorphan hydrobromide / Pseudoephedrine hydrochloride / Chlorpheniramine maleate (10mg / 30mg / 2mg per 5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Windexco Syrup
2. Bagaimana Windexco Syrup berfungsi
3. Sebelum menggunakan Windexco Syrup
4. Cara menggunakan Windexco Syrup
5. Semasa menggunakan Windexco Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Windexco Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Windexco Syrup

Windexco Syrup digunakan untuk melegakan batuk dan hidung tersumbat yang disebabkan oleh selesema biasa, alergi dan jangkitan pernafasan yang lain.

Bagaimana Windexco Syrup berfungsi

Windexco Syrup mengandungi dextromethorphan hydrobromide yang membantu menghentikan batuk, pseudoephedrine hydrochloride melegakan hidung tersumbat dan chlorpheniramine maleate yang merupakan antihistamin untuk meredakan reaksi alergi seperti bersin, hidung berair dan mata berair.

Sebelum menggunakan Windexco Syrup

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan mengambil produk ini jika anda alah (hipersensitiviti) terhadap dextromethorphan, pseudoephedrine dan chlorpheniramine atau sebarang bahan lain yang terkandung di dalam Windexco Syrup.
- Jangan mengambil jika anda mempunyai tekanan darah tinggi atau penyakit jantung.
- Jangan gunakan jika anda mengambil, atau telah mengambil dalam dua minggu terakhir, ubat-ubatan untuk kemurungan yang dikenali sebagai Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs).

- Sebelum mula menggunakan

- Jangan berikan produk ini kepada kanak-kanak yang berumur kurang dari 2 tahun.
- Produk ini harus digunakan dengan berhati-hati atas nasihat doktor atau ahli farmasi untuk kanak-kanak berumur 2 hingga 6 tahun.

- Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- mengalami masalah hati atau buah pinggang.
- menghidap asma
- menghidap diabetes atau sekiranya anda diberitahu oleh doktor bahawa anda mempunyai intoleransi terhadap beberapa gula.
- mengalami glaukoma (peningkatan tekanan pada mata)
- mengalami pembesaran prostat (kesukaran membuang air kecil atau kerap membuang air kecil)
- menghidap penyakit jantung
- menjalani rawatan masalah kemurungan
- menghadapi masalah pernafasan atau berisiko mengalaminya

Sila berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang kehamilan atau menyusui sebelum menggunakan sebarang ubat.

Jangan memberikan apa-apa ubat pada bulan pertama kehamilan, kecuali jika keadaan memerlukan.

Pseudoephedrine dan Chlorpheniramine diekskresikan dalam susu ibu. Penggunaannya oleh ibu menyusui tidak digalakkan kerana kesan sampingan luar biasa yang lebih tinggi atas bayi terutamanya bayi yang baru lahir dan bayi pramatang.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang menggunakan:

- Fluoxetine atau paroxetine or Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs)
- Quinidine (ubat untuk degupan jantung tidak teratur)
- Furazolidone (agen antibakteria)
- Bretylium, bethanidine, guanethidine, debrisoquine, methyl dopa, beta-blocker (ubat untuk tekanan darah tinggi)
- perangsang atau penekan selera makan dan ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat hidung tersumbat dan asma.

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Windexco Syrup

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak melebihi 12 tahun:

2 camca teh (10ml) setiap 6 jam.

Jangan melebihi 8 camca teh atau 40ml sehari.

Kanak-kanak 6 hingga 12 tahun:

1 camca teh (5ml) setiap 6 jam.

Jangan melebihi 4 camca teh atau 20ml sehari.

Kanak-kanak 2 hingga 5 tahun:

½ camca teh (2.5ml) setiap 6 jam.

Jangan melebihi 2 camca teh atau 10ml sehari.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan boleh menyebabkan kelemahan, pergerakan tidak terkawal, kesukaran membuang air kecil, masalah pernafasan, sawan, kekeliruan, keseronokan melampau, kegelisahan, kerengsaan, perubahan tekanan darah, debaran jantung dan degupan jantung yang cepat.

WINDEXCO SYRUP

Dextromethorphan hydrobromide / Pseudoephedrine hydrochloride / Chlorpheniramine maleate (10mg / 30mg / 2mg per 5ml)

Semasa menggunakan Windexco Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor atau ahli farmasi.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda menggunakan Windexco Syrup.

Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat kecuali diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Windexco Syrup kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian *Memandu dan menggunakan jentera*

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa mengantuk, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Elakkan alkohol.

Kesan-kesan sampingan

Produk ini boleh menyebabkan beberapa kesan sampingan yang biasa seperti mengantuk, masalah sukar tidur, gangguan gastrousus, dan kurang biasa seperti pening, perasaan teruja, berpeluh, dahaga, degupan jantung yang cepat, sakit dada, berdebar-debar, kesukaran membuang air kecil, khayalan dan sawan. Kulit dermatitis Nummular (tompok berbentuk duit syiling) telah dilaporkan dalam kejadian yang jarang berlaku.

Kesan sampingan antikolinergik, misalnya mulut kering, penglihatan kabur dan sembelit.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui

laman web nppra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Windexco Syrup

- Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Tutupkan botol dengan ketat.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

- Pelupusan

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput dicetak pada label dan kotak ubat.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Deskripsi Produk

- Rupa dan warna produk

Larutan sirap berwarna perang dan berperisa ubat batuk. Tanpa alkohol.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan-bahan aktif

Setiap 5ml mengandungi Dextromethorphan hydrobromide 10mg, pseudoephedrine hydrochloride 30mg dan chlorpheniramine maleate 2mg.

- Bahan-bahan tidak aktif

Methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, sugar, sodium saccharin, liquid glucose, sodium citrate, menthol, liquid caramel, peppermint oil, cough drop flavour, purified water.

- Nombor MAL:

MAL19910125AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn. Bhd.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

18/06/2021

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)110621/00045