

WINADRYL EXPECTORANT SYRUP

Diphenhydramine HCl / Ammonium chloride (14mg/5ml / 135mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Winadryl Expectorant Syrup
2. Bagaimana Winadryl Expectorant Syrup berfungsi
3. Sebelum menggunakan Winadryl Expectorant Syrup
4. Cara menggunakan Winadryl Expectorant Syrup
5. Semasa menggunakan Winadryl Expectorant Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Winadryl Expectorant Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Winadryl Expectorant Syrup

Winadryl Expectorant Syrup digunakan untuk melegakan batuk, kerdangan saluran pernafasan dan hidung tersumbat. Ia bantu mengurangkan kelikatan mukus dan pengeluaran kahak.

Bagaimana Winadryl Expectorant Syrup berfungsi

Diphenhydramine berfungsi dengan menyekat bahan semulajadi badan (histamine) yang dihasilkan semasa tindakbalas alahan. Ammonium chloride mengurangkan kepekatan kahak dan memudahkannya dibuang keluar.

Sebelum menggunakan Winadryl Expectorant Syrup

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan menggunakan produk ini jika anda alah (hipersensitiviti) terhadap diphenhydramine, ammonium atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut produk).
- Jangan mengambil jika anda mempunyai masalah pernafasan.
- Jangan berikan produk ini kepada kanak-kanak yang berumur kurang dari 2 tahun.

- Sebelum menggunakan Winadryl Expectorant Syrup

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Gunakan secara berhati-hati dan ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti untuk kanak-kanak berumur 2 – 6 tahun.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai masalah hati atau buah pinggang.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil:

- Ubat antimuscarinic (ubat untuk merawat ketidaksinambungan kencing)
- CNS depressants (ubat seperti barbiturates, hypnotic, analgesic opioid, sedative anxiolytic, dan antipsychotic).
- Beta blockers (ubat untuk merawat tekanan darah tinggi, masalah jantung dan denyutan jantung tidak teratur).

Cara menggunakan Winadryl Expectorant Syrup

- Berapa banyak harus digunakan

➤ Dewasa dan kanak-kanak melebihi 12 tahun:

Bagi 1 hingga 2 camca teh (5 hingga 10ml) setiap 4 hingga 6 jam.

➤ Kanak-kanak 6 hingga 12 tahun:

Bagi ½ hingga 1 camca teh (2.5 hingga 5ml) setiap 4 hingga 6 jam.

➤ Kanak-kanak 2 hingga 5 tahun:

Bagi ½ camca teh (2.5ml) setiap 4 hingga 6 jam.

Jangan melebihi 6 dos dalam masa 24 jam.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Winadryl Expectorant Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Winadryl Syrup.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Winadryl Syrup kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera
Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Elakkan minuman beralkohol.

Kesan-kesan sampingan

Produk ini boleh menyebabkan beberapa kesan sampingan yang tidak diingini seperti:

- Mengantuk
- Pening
- Gangguan koordinasi badan
- Sakit kepala
- Gangguan pergerakan tubuh yang berkaitan dengan mental

WINADRYL EXPECTORANT SYRUP

Diphenhydramine HCl / Ammonium chloride (14mg/5ml / 135mg/5ml)

- Penglihatan kabur
- Kesukaran atau pengekal kencing
- Sembelit
- Refluks gastrik
- Loya
- Muntah
- Cirit-birit
- Sakit epigastric

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Winadryl Expectorant Syrup

- Penyimpanan

- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Tutupkan penutup dengan ketat.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Larutan sirap berwarna perang dan berperisa plum.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap 5ml mengandungi diphenhydramine HCl 14mg dan ammonium chloride 135mg.

- Bahan tidak aktif

Methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, sugar, xanthan gum, liquid glucose, sodium citrate, citric acid, menthol, aniseed oil, liquid caramel, plum flavour, polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, purified water.

Nombor MAL:

MAL08010745AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn. Bhd.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

11/03/2021

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)080321/00008