

WINPAMOL SYRUP

Paracetamol (120mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Winpamol Syrup
2. Bagaimana Winpamol Syrup berfungsi
3. Sebelum mengambil Winpamol Syrup
4. Cara mengambil Winpamol Syrup
5. Semasa mengambil Winpamol Syrup
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Winpamol Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Winpamol Syrup

Winpamol Syrup digunakan untuk melegakan demam dan kesakitan yang ringan hingga sederhana seperti sakit kepala dan sakit gigi.

Bagaimana Winpamol Syrup berfungsi

Winpamol Syrup yang mengandungi Paracetamol merupakan sejenis ubat yang termasuk dalam kategori analgesia dan antipiretik yang dijadikan ubat penahan sakit dan penurunan panas.

Sebelum mengambil Winpamol Syrup

- Bila tidak boleh mengambil

- Jangan mengambil produk ini jika anda alah (alergi) terhadap Paracetamol atau bahan-bahan lain dalam produk ini.
- Penyediaan ini mengandungi Sodium metabisulphite yang boleh menyebabkan tindak-balas jenis alergi yang serius pada individu yang mudah terdedah.
- Jangan mengambil jika anda diketahui hipersensitif kepada bisulphites.

- Sebelum mula mengambil

- Tidak dicadangkan kepada bayi umur di bawah 1 bulan.
- Produk ini harus diberi dengan perhatian kepada individu mempunyai masalah hati dan buah pinggang atau individu yang sedang mengambil ubat yang mengancam fungsi hati.
- Produk ini selamat diambil semasa mengandung dan menyusui.

- Jika mengambil ubat- ubatan lain

Dos antikoagulan mungkin memerlukan pengurangan jika ubat Paracetamol diberi berpanjangan.

Cara mengambil Winpamol Syrup

- Berapa banyak harus digunakan

Kanak-kanak 7 hingga 12 tahun:
Ambil 2 hingga 4 sudu teh (10 hingga 20ml).
Kanak-kanak 1 hingga 6 tahun:
Ambil 1 hingga 2 sudu teh (5 hingga 10ml).

Bayi 3 bulan hingga 1 tahun:

Ambil ½ hingga 1 sudu teh (2.5ml hingga 5ml).

Jangan melebihi dos yang dicadangkan

- Bila perlu diambil

Ambil 3 hingga 4 kali sehari dengan atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu diambil

Sila mengikuti nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa beri Winpamol Syrup 120mg/5ml kepada anak anda, berikannya secepat mungkin apabila anda teringat. Jangan cuba beri dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Gejala-gejala termasuk muntah, sakit perut, pucat, loya, kehilangan selera makan, kerosakan hati, keluarbiasaan metabolisme glukosa dan kandungan asid tinggi dalam badan.

Keracunan serius termasuk kegagalan fungsi hati yang akan mengancam fungsi otak, koma dan kematian. Kegagalan buah pinggang akut dan dengupan jantung tidak teratur juga dilaporkan. Sekiranya terambil berlebihan, sila menghubungi Pusat Racun Negara (1800 888 099) atau doktor anda, ataupun pergi ke unit kecemasan hospital yang terdekat secepat mungkin.

Semasa mengambil Winpamol Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

Periksa dengan doktor anda sekiranya:

1. Anak anda menghadapi masalah alergi atau ruam.
2. Jika rasa sakit atau demam terus berlanjutan selama 5 hari untuk kanak-kanak / 10 hari untuk orang dewasa atau menjadi teruk.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat ini untuk keadaan lain kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan mengambil ubat-ubatan lain yang mengandungi Paracetamol pada masa yang sama.

Kesan-kesan Sampingan

Amaran alahan: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk

termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini boleh menjadi tanda keadaan serius. Jika tindak-balas ini berlaku, berhenti menggunakannya dan dapatkan rawatan segera

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web nppra.gov.my (Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF or Vaccines (AEFI))).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Winpamol Syrup

- Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Tutupkan penutup dengan ketat.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap jernih berwarna perang muda dan berperisa mawar dan pudina.

- Bahan-bahan Kandungan

- Bahan-bahan aktif
Setiap 5ml mengandungi Paracetamol 120mg

- Bahan-bahan tidak aktif
Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Sodium Benzoate, Sodium Saccharin, Sugar, Propylene Glycol, Sorbitol Solution, Glycerin, Sodium Metabisulphite, Peppermint Oil, Rose Flavour, Purified Water.

- Nombor MAL:

MAL19912817XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn. Bhd.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP
30/10/2018

Nombor Siri:
NPRA(R4/1)041018/00277