

# MIFUKO OINTMENT

Salicylic acid / Zinc oxide (5%w/w / 6%w/w)

## What is in the leaflet

1. What Mifuko Ointment is used for
2. How Mifuko Ointment works
3. Before you use Mifuko Ointment
4. How to use Mifuko Ointment
5. While you are using it
6. Side Effects
7. Storage and Disposal of Mifuko Ointment
8. Product Description
9. Manufacturer and Product Registration Holder
10. Date of revision

## What Mifuko Ointment is used for

Mifuko Ointment is used for ringworm, athlete's foot, eczema, psoriasis, seborrheic dermatitis, scabies, warts and corns.

## How Mifuko Ointment works

Salicylic acid has the ability to prevent the growth of bacteria and kill fungi. Zinc oxide works to break down the outer layers of the skin and assist exfoliation of the skin cells.

## Before you use Mifuko Ointment

### - When you must not use it

Do not use Mifuko Ointment if you are hypersensitive to salicylic acid, zinc oxide or any other ingredients in this product.

Do not use in infants below 2 years of age as camphor can cause convulsions.

### - Before you start to use it

Inform your doctor or pharmacist if you have other medical conditions before using Mifuko Ointment.

Cautions must be exercised when older children are treated.

It is dangerous to place any camphor containing product into the nostrils of children. A small amount applied in this way may cause immediate collapse.

### - Taking other medicines

Do not use other skin products on the affected area.

## How to use Mifuko Ointment

### - How much to use

For external use only.

Clean and dry the affected areas. Follow the recommended dose and should not use more than the prescribed dose.

### - When to use it

Apply 2 times daily.

### - How long to use it

Use Mifuko Ointment for the duration that your doctor or pharmacist recommends.

### - If you forget to use it

If you forget to use Mifuko Ointment, use it as soon as you remember.

Do not use a double dose to make up for the missed dose.

### - If you use too much (overdose)

Symptoms of systemic salicylate poisoning includes dizziness, ringing in the ears, deafness, sweating, headache, nausea and vomiting. In the event of accidental ingestion, you should be under observation and treated symptomatically.

Contact your doctor immediately or your nearest hospital for medical advice.

## While you are using Mifuko Ointment

### - Things you must do

Use your medicine exactly as your doctor has told you.

### - Things you must not do

Do not use any new medicines without consulting your doctor or pharmacist.

### - Things to be careful of

If you notice any side effects, stop using this medicine and tell your doctor or pharmacist. Avoid in contact with eyes, nose and mouth.

Not to be taken.

Use with care on large areas of skin.

## Side Effects

Skin inflammation may occur on sensitive skin.

You may report any side effects or adverse drug reactions directly to the National Centre for Adverse Drug Reaction Monitoring by visiting the website [npa.gov.my](http://npa.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## Storage and Disposal of Mifuko Ointment

### - Storage

- Store below 30°C.
- Protect from light.
- Keep out of reach of children.

Do not use this after the expiry date. An expiry date is printed on the label and box of the medicine.

### - Disposal

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

## Product Description

### - What it looks like

Mifuko Ointment is a white smooth ointment.

### - Ingredients

#### - Active ingredient

Salicylic acid 5%w/w

Zinc oxide 6%w/w

#### - Inactive ingredients

Menthol crystal, camphor, liquid paraffin, white soft paraffin.

### - MAL Number:

MAL19912829X

## Manufacturer and Product Registration Holder

Winwa Medical Sdn Bhd  
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,  
Taman I.K.S. Bukit Minyak,  
14000 Bukit Mertajam,  
Pulau Pinang, Malaysia.

## Date of revision

13/09/2022

## Serial Number:

NPRA(R4/1)070922/00063

X.EMK-PIL.01

# MIFUKO OINTMENT

Salicylic acid / Zinc oxide (5%w/w / 6%w/w)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Mifuko Ointment
2. Bagaimana Mifuko Ointment berfungsi
3. Sebelum menggunakan Mifuko Ointment
4. Cara menggunakan Mifuko Ointment
5. Semasa menggunakan Mifuko Ointment
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Mifuko Ointment
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Mifuko Ointment

Mifuko Ointment digunakan untuk penyakit kulit seperti kurap, panau, ekzema, psoriasis, *seborrheic dermatitis*, kudis buta, kutil dan belulang.

## Bagaimana Mifuko Ointment berfungsi

Salicylic acid boleh merencatkan pembiakan bakteria dan membunuh kulat. Zinc oxide berfungsi untuk memecahkan lapisan luar kulit dan membantu pengelupasan sel kulit.

## Sebelum mengguna Mifuko Ointment

- Bila tidak boleh menggunakan  
Jangan menggunakan Mifuko Ointment jika anda hipersensitif kepada salicylic acid, zinc oxide atau mana-mana bahan-bahan lain yang terkandung dalam produk ini.

Jangan guna pada bayi di bawah umur 2 tahun kerana camphor boleh menyebabkan sawan.

## - Sebelum mula menggunakan

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai keadaan perubatan lain sebelum menggunakan Mifuko Ointment.

Perhatian mesti diberikan apabila kanak-kanak dirawat.

Adalah berbahaya untuk meletakkan sebarang produk yang mengandungi camphor ke dalam lubang hidung kanak-kanak. Sejumlah kecil digunakan dengan cara ini boleh menyebabkan rebah serta-merta.

## - Jika menggunakan ubat- ubatan lain

Jangan gunakan produk kulit yang lain di kawasan yang dirawat .

## Cara menggunakan Mifuko Ointment

### - Berapa banyak harus digunakan

Untuk kegunaan luar sahaja.

Bersih dan keringkan kawasan yang akan dirawat. Ikut dos yang disyorkan, jangan menggunakan lebih daripada dos yang ditetapkan.

### - Bila perlu digunakan

Guna 2 kali sehari.

### - Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Mifuko Ointment mengikut tempoh yang disyorkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

### - Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa menggunakan Mifuko Ointment, gunakannya apabila anda teringat.

Jangan gunakan dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

### - Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Gejala keracunan salicylate sistemik termasuk pening, bunyi deringan di dalam telinga, pekak, berpeluh, sakit kepala, loya dan muntah. Sekiranya tertelan, anda harus di bawah pemerhatian dan dirawat.

Hubungi doktor anda dengan segera atau hospital terdekat anda untuk mendapatkan nasihat perubatan.

## Semasa menggunakan Mifuko Ointment

### - Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor anda.

### - Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mempunyai sebarang kesan sampingan, hentikan penggunaan ubat ini dan beritahu doktor atau ahli farmasi anda. Elakkan terkena mata, hidung dan mulut. Tidak boleh diambil. Gunakan dengan berhati-hati pada kawasan kulit yang luas.

## Kesan Sampingan

Radang kulit mungkin berlaku pada kulit sensitif.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## Cara Penyimpanan dan Pelupusan Mifuko Ointment

### - Penyimpanan

- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

Jangan sapu ubat ini selepas tarikh luput yang tertera pada label dan kotak.

### - Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

## Maklumat lanjut

### - Rupa dan warna produk

Mifuko Ointment adalah salap putih yang licin.

### - Bahan-bahan

- Bahan-bahan aktif  
Salicylic acid 5%w/w  
Zinc oxide 6%w/w

- Bahan-bahan tidak aktif  
Menthol crystal, camphor, liquid paraffin, white soft paraffin.

### - MAL Number:

MAL19912829X

## Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn Bhd  
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,  
Taman I.K.S. Bukit Minyak,  
14000 Bukit Mertajam,  
Pulau Pinang, Malaysia.

## Tarikh kemaskini RiMUP

13/09/2022

## Nombor Siri:

NPRA(R4/1)070922/00063