

# MIFULIN LOTION

Salicylic acid (12% w/v)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Mifulin Lotion
2. Bagaimana Mifulin Lotion berfungsi
3. Sebelum menggunakan Mifulin Lotion
4. Cara menggunakan Mifulin Lotion
5. Semasa menggunakan Mifulin Lotion
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Mifulin Lotion
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

## Apakah kegunaan Mifulin Lotion

Mifulin Lotion digunakan untuk rawatan kematu, ketuat, dan kurap.

## Bagaimana Mifulin Lotion berfungsi

Mifulin Lotion mengandungi Salicylic acid, yang membantu mengawal bakteria serta kulit dan menanggalkan kulit mati. Ia berfungsi melembutkan keratin, sejenis protein dalam kulit anda. Ini menjadikannya lebih mudah untuk mengeluarkan kulit kering dan bersisik.

## Sebelum menggunakan Mifulin Lotion

### - Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Mifulin Lotion jika:

- anda mempunyai alahan terhadap Salicylic acid atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat Lanjut)
- anda mempunyai luka atau kulit yang rosak
- pesakit adalah bayi di bawah umur 2 tahun kerana ia mungkin menyebabkan sawan.

### - Sebelum menggunakan Mifulin Lotion

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

### - Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

## Cara menggunakan Mifulin Lotion

Bersihkan dan keringkan kawasan yang terjejas. Sapukan Mifulin Lotion pada kawasan yang terjejas dan elakkan daripada terkena kulit sihat di sekelilingnya.

### - Berapa banyak harus digunakan

Sapukan lapisan nipis Mifulin Lotion terus pada kulit yang terjejas.

### - Bila perlu digunakan

Gunakan sekali sehari.

### - Berapa lama perlu diambil

Guna ubat ini sehingga kematu / ketuat / kurap sembuh sepenuhnya.

### - Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Sapu dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapu dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

### - Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Keracunan salicylate boleh berlaku selepas pengambilan secara tidak sengaja atau selepas penggunaan topikal salicylate yang berlebihan.

Anda mungkin mengalami simptom ketidakselesaan seperti pening, deringan di telinga, kehilangan pendengaran, berpeluh, sakit kepala, loya, muntah, pernafasan yang cepat, kegelisahan dan kekeliruan.

Hentikan penggunaan dan hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau orang lain mungkin telah menggunakan ubat ini dengan terlalu banyak. Lakukan demikian walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera.

## Semasa menggunakan Mifulin Lotion

### - Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi, dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Mifulin Lotion.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandungi semasa menggunakan ubat ini.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Mifulin Lotion kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

### - Perkara yang perlu diberi perhatian

Mifulin Lotion mengandungi Camphor (kapur barus) dan ia boleh menyebabkan sawan. Berhati-hati apabila merawat kanak-kanak yang lebih besar.

Elakkan penggunaan secara langsung ke dalam lubang hidung. Adalah berbahaya untuk meletakkan sebarang produk yang mengandungi Camphor (kapur barus) ke dalam lubang hidung kanak-kanak. Jumlah yang kecil digunakan dengan cara ini boleh menyebabkan kanak-kanak hilang kesedaran dengan serta-merta.

Elakkan daripada terkena mata atau membran mukus. Jika berlaku sebarang kerengsaan, hentikan penggunaan.

Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan Mifulin Lotion terhadap anda.

## Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Mifulin Lotion boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Produk ini boleh menyebabkan kerengsaan kulit (dermatitis) seperti kemerahan, kegatalan atau kulit yang meradang.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

# MIFULIN LOTION

Salicylic acid (12% w/v)

---

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [nppra.gov.my](http://nppra.gov.my) [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or *Vaccines (AEFI)*].

## Cara penyimpanan dan pelupusan Mifulin Lotion

### - Penyimpanan

- Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.
- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Lindungi daripada cahaya.
- Pastikan penutup tertutup rapat.

### - Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

## Maklumat lanjut

### - Rupa dan warna produk

Larutan jernih yang tidak berwarna dengan bau thymol dan camphor.

### - Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif  
Salicylic acid
- Bahan tidak aktif  
Methylated spirit, thymol, camphor, purified water.

### - Nombor MAL

MAL19912812XZ

## Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn. Bhd.  
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,  
Taman I.K.S. Bukit Minyak,  
14000 Bukit Mertajam,  
Pulau Pinang, Malaysia.

## Tarikh kemas kini RiMUP

17/12/2024

## Nombor Siri

NPRA(R4/1)061224/00126