

Juyanko Cream

Consumer Medication Information Leaflet (RiMUP)

Chlorhexidine Gluconate 20% Solution 1%v/w

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Juyanko Cream
2. Bagaimana Juyanko Cream berfungsi
3. Sebelum mengambil Juyanko Cream
4. Cara mengambil Juyanko Cream
5. Semasa mengambil Juyanko Cream
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Juyanko Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Juyanko Cream

Juyanko Cream digunakan untuk gigitan serangga, ruam kulit, luka dan lelasan. Atas permohonan, ia menghasilkan rasa kesejukan dan melegakan ketidakselesaan.

Bagaimana Juyanko Cream berfungsi

Juyanko Cream berkesan terhadap pelbagai vegetatif bakteria gram positif dan bakteria gram negatif dan ia aktif pada pH neutral atau sedikit beralkali.

Sebelum mengambil Juyanko Cream

- Bila tidak boleh mengambil
Jangan mengambil jika anda hipersensitiviti kepada Chlorhexidine atau mana-mana bahan-bahan lain dalam produk ini.

- Sebelum mula mengambil
Produk ini adalah kontraindikasi pada kanak-kanak di bawah 2 tahun. Perhatian perlu diambil jika anak dewasa dilayan.

- Jika mengambil ubat- ubatan lain
Jangan gunakan produk kulit yang lain di kawasan yang terjejas.

Cara mengambil Juyanko Cream

- Berapa banyak harus digunakan
Sapukan pada kawasan terjejakit 2 hingga 3 kali sehari.

- Bila perlu diambil

Anda perlu mengikut dos yang disyorkan

dan tidak patut mengambil lebih daripada dos yang ditetapkan.

- Berapa lama perlu diambil

Jika tiada permulihan diperhatikan dalam 1 minggu, pesakit perlu hentikan penggunaan dan rujuk kepada doktor.

- Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa ambil Juyanko Cream, ambilkannya apabila anda teringat.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tiada penawar khusus boleh didapati. Sekiranya tersalah makan secara berlebihan, pesakit perlu diperhatikan dan dirawat mengikut keadaan.

Hubungi doktor atau hospital terdekat dengan segera untuk nasihat rawatan.

Semasa mengambil Juyanko Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Periksa dengan doktor anda jika simptom berlarutan atau bertambah teruk.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat ini untuk keadaan lain kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ia adalah merbahaya untuk menggunakan produk mengandungi camphor ke dalam hidung kanak-kanak. Penggunaan sedikit boleh menyebabkan terjejas serta-merta.

Juyanko Cream mengandungi chlorhexidine. Beritahu ahli pakar kesihatan anda jika anda mempunyai alahan yang diketahui untuk chlorhexidine.

Kesan Sampingan

Berhenti menggunakan produk ini dan dapatkan bantuan perubatan segera jika anda mengalami ruam, gatal-gatal, bengkak, kesukaran bernafas, ketepikan cahaya atau degupan jantung yang cepat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumer → Reporting).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Juyanko Cream

Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

Pelupusan

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Juyanko Cream adalah krim licin yang berwarna putih.

Bahan-bahan

Bahan-bahan aktif
Chlorhexidine Gluconate 20% Solution 1%v/w

Bahan-bahan tidak aktif
Propyl Hydroxybenzoate, Methyl Hydroxybenzoate, Menthol, Methyl Salicylate, Liquid Paraffin, Cetomacrogol Emulsifying Wax, Camphor, Purified Water qs

- MAL Number:

MAL19912765XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

WINWA MEDICAL SDN. BHD.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

6 July 2017