

Benzyl Benzoate (25%w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Ridped Lotion
2. Bagaimana Ridped Lotion berfungsi
3. Sebelum menggunakan Ridped Lotion
4. Cara menggunakan Ridped Lotion
5. Semasa menggunakan Ridped Lotion
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ridped Lotion
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Ridped Lotion

Ridped Lotion digunakan untuk rawatan kutu kepala dan kudis buta.

Bagaimana Ridped Lotion berfungsi

Apabila Ridped Lotion disapukan pada kulit, dan diserap ke dalam tisu kulit. Benzyl Benzoate tidak berbahaya kepada manusia tetapi adalah racun untuk kutu dan tungau yang menyebabkan kudis buta pada kulit.

Sebelum menggunakan Ridped Lotion

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan terhadap benzyl benzoate atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

- Sebelum mula menggunakan

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat- ubatan lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil ubat-ubat lain, termasuk yang tidak memerlukan preskripsi dari farmasi, pasar raya atau dari sumber lain.

Cara menggunakan Ridped Lotion

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak melebihi 12 tahun: Rawatan untuk kutu kepala:

1. Cuci dan keringkan rambut dan kulit kepala sebelum rawatan.
2. Sapukan losyen pada rambut basah dan kulit kepala dengan jari.
3. Cuci rambut dengan syampu dan air suam selepas 24 jam dan keringkan dengan tuala yang bersih.
4. Sikat rambut untuk menyingkirkan telur kutu yang masih ada dengan sikat bergigi rapat.
5. Ulangi rawatan selepas tujuh hari jika masih terdapat tanda-tanda kutu kepala.

Rawatan untuk kudis buta:

1. Mandi dengan air suam sambil menggosok dan keringkan badan sebelum rawatan.
2. Sapukan losyen ke seluruh badan dengan berus, kecuali bahagian kepala dan muka.
3. Biarkan sehingga losyen sudah kering sebelum memakai pakaian yang bersih.
4. Mandi dengan air suam dan cuci dengan sabun selepas 24 jam dan keringkan dengan

tuala yang bersih.

5. Ulangi rawatan selepas 5 hari jika ada tanda-tanda kudis buta.

Kanak-kanak 2 hingga 12 tahun:

Cairkan losyen dengan kuantiti air yang sama sebelum sapuan ubat.

Goncangkan sebelum guna.

- Bila perlu digunakan

- Gunakannya sekali dalam sehari. Secara alternatif, 3 kali pada setiap 12 jam atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Ridped Lotion untuk tempoh yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Apabila Benzyl Benzoate tertelan secara tidak sengaja, ia boleh menyebabkan gelisah dan sawan.

Semasa menggunakan Ridped Lotion

- Perkara yang perlu dilakukan

- Guna ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Ridped Lotion.
- Semua cadar katil dan pakaian yang bersentuhan dengan anda harus dibasmi kuman atau dibasuh dalam air panas secara berasingan dari semua pakaian lain.
- Jumpa doktor jika gejala berlanjutan atau bertambah teruk.
- Semua ahli keluarga yang bersentuhan rapat hendaklah dirawat pada masa yang sama untuk mengelakkan jangkitan semula.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi Ridped Lotion kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Untuk kegunaan luaran sahaja. Elakkan daripada terkena mata, hidung dan mulut.

Dilarang minum.

- Jangan sapukan pada kulit yang meradang dan bahagian luka pada kulit atau kulit kepala. Ini adalah kerana benzyl benzoate mungkin akan memudaratkan keadaan dan meningkatkan penyerapan ubat.
- Losyen ini mungkin boleh menyebabkan sedikit iritasi pada kulit. Sapukan sedikit losyen pada kulit dan lihat jika terdapat kehangatan atau kemerahan kulit.
- Jika mana-mana kesan ini berlaku, cairkan losyen dengan air sebelum meneruskan penggunaan.

Kesan-kesan Sampingan

Kadang-kala boleh menyebabkan kerengsaan kulit dan rasa hangat sementara. Jika kesannya teruk, basuh losyen dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Ridped Lotion

- Penyimpanan

- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput. pada label dan kotak ubat.

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa air atau sampah isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Emulsi putih dengan bau tertentu.

- Bahan-bahan

Bahan-bahan aktif

Benzyl benzoate 25%w/v

Bahan-bahan tidak aktif

Chlorocresol, emulsifying wax, purified water.

- Nombor MAL:

MAL19912831XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn. Bhd.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

13/09/2022

Nombor Siri:

NPRA(R/1)080922/00066