

WINGESIC 650 TABLET

Paracetamol (650mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Wingsic 650 Tablet
2. Bagaimana Wingsic 650 Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Wingsic 650 Tablet
4. Cara mengambil Wingsic 650 Tablet
5. Semasa mengambil Wingsic 650 Tablet
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Wingsic 650 Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Wingsic 650 Tablet

Wingsic 650 Tablet digunakan untuk melegakan demam, sakit kepala, sakit gigi dan ringan kepada sakit sederhana termasuk dysmenorrhea, keadaan yang melibatkan sakit otot, myalgias, neuralgias, analgesik selepas mencabut gigi dan dalam tumbuh gigi dan sakit telinga.

Bagaimana Wingsic 650 Tablet berfungsi

Wingsic 650 Tablet yang mengandungi Paracetamol merupakan sejenis ubat yang termasuk dalam kategori analgesia dan antipiretik yang dijadikan ubat penahan sakit dan penurun panas. Ia diserap dengan cepat dan sempurna selepas administrasi dan menunjukkan kesannya dalam masa 30 minit ke 2 jam. Kesan ini akan kekal selama 3 hingga 4 jam.

Sebelum mengambil Wingsic 650 Tablet

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil produk ini jika anda alergi (hipersensitiviti) terhadap Paracetamol atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam produk ini.

- Sebelum mula mengambil

Produk ini harus diberi dengan perhatian kepada penderita gangguan fungsi hati dan buah pinggang atau mereka yang sedang mengambil ubat yang mengancam kesihatan hati.

- Jika mengambil ubat- ubatan lain

Sila periksa dengan doktor anda sekiranya anak anda sedang mengambil ubat-ubat seperti berikut:

Ubat-ubatan seperti enzim yang mendorong microsomal hati, Metoclopramide, Probenecid, Cholestyramine dan anticoagulant (cth Warfarin).

Cara mengambil Wingsic 650 Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak melebihi 12 tahun:

Ambil 1 tablet setiap 4 hingga 6 jam.

(Jangan melebihi 6 tablet dalam sehari)

- Bila perlu diambil

Boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu diambil

Sila mengikuti nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa beri Wingsic 650 Tablet kepada anak anda, berikannya secepat mungkin apabila anda teringat. Jangan cuba beri dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya terambil berlebihan, rawatan khusus segera adalah penting.

Sila menghubungi Pusat Racun Negara (1800 888 099) atau doktor anda, ataupun pergi ke unit kecemasan hospital yang terdekat secepat mungkin.

Semasa mengambil Wingsic 650 Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Jangan melebihi dos yang disyorkan dan penggunaan berterusan tidak boleh melebihi 5 hari pada satu masa (10 hari untuk dewasa), tanpa nasihat doktor.

Jika simptom berlarutan, sila dapatkan nasihat doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat ini untuk keadaan lain kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sediaan ini mengandungi Paracetamol. Jangan mengambil sediaan lain yang juga mengandungi Paracetamol pada masa yang sama.

Kesan Sampingan

Tanda alahan: Paracetamol boleh menyebabkan alahan kulit yang teruk termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan serius. Jika tindak-balas ini berlaku, berhenti menggunakannya dan dapatkan rawatan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web nppra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Wingsic 650 Tablet

- Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Tutupkan botol dengan ketat.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Wingsic 650 Tablet adalah tablet kuning berbentuk heksagon dan tidak bersalut. Sumber gelatin adalah dari bovin. Ia boleh didapati dalam botol 90's.

- Bahan-bahan

Bahan-bahan aktif

Setiap tablet mengandungi Paracetamol 650mg

Bahan-bahan tidak aktif

Colour Certolake Quinoline Yellow, Gelatin, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate and Corn Starch

- Nombor MAL:

MAL06081399XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

WINWA MEDICAL SDN. BHD.

1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3, Taman I.K.S. Bukit Minyak, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

02/04/2019

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)XXXXXX/XXXXX