

M-ZOLE CHEWABLE TABLET

Mebendazole (500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan M-zole Chewable Tablet
2. Bagaimana M-zole Chewable Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil M-zole Chewable Tablet
4. Cara mengambil M-zole Chewable Tablet
5. Semasa mengambil M-zole Chewable Tablet
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan M-zole Chewable Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan M-zole Chewable Tablet

M-zole Chewable Tablet digunakan sebagai dos tunggal untuk merawat sejenis jangkitan cacing atau jangkitan campuran.

Bagaimana M-zole Chewable Tablet berfungsi

M-zole Chewable Tablet mengandungi mebendazole yang berfungsi dengan menghalang cacing daripada menggunakan gula glukosa dan menyebabkan kematian cacing.

Sebelum mengambil M-zole Chewable Tablet

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil produk ini jika anda alah kepada mebendazole, ubat-ubatan yang serupa atau mana-mana bahan lain dalam produk.

- Sebelum mula mengambil

Produk ini tidak sesuai untuk orang yang mengalami *phenylketonuria*. Tidak disyorkan untuk digunakan semasa mengandung atau semasa menyusui.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat seperti dexamethasone (melegakan keradangan), praziquantel (merawat jangkitan) dan cimetidine (melegakan pedih ulu hati).

Cara mengambil M-zole Chewable Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak melebihi 2 tahun:

Ambil 1 tablet sekali sahaja.

Boleh dikunyah, dihancurkan atau dicampurkan dengan jus atau makanan.

- Bila perlu diambil

Ambil sekali sahaja selepas makan atau diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu diambil

Dos kedua boleh diambil selepas 2 hingga 3 minggu jika jangkitan cacing berulang lagi.

- Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa mengambil M-zole Chewable Tablet, ambil ubat apabila anda teringat. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda atau sesiapa terambil terlalu banyak ubat ini, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera. Gangguan perut dan usus serta cirit-birit mungkin berlaku.

Semasa mengambil M-zole Chewable Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini. Jika simptom berlarutan, sila dapatkan nasihat doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil sebarang ubat baharu tanpa nasihat doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Semua ahli keluarga dan orang lain yang mempunyai kontak rapat harus dirawat serentak untuk mencegah jangkitan cacing berulang.

Kesan-kesan Sampingan

Kesan sampingan termasuk gangguan perut dan usus, cirit-birit, sakit kepala dan pening mungkin berlaku tetapi jarang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan M-zole Chewable Tablet

- Penyimpanan

- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Lindungi daripada cahaya, haba dan kelembapan.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet tidak bersalut berwarna kuning muda, bulat dan rata dengan perisa pisang dan vanila.

- Bahan-bahan

- Bahan aktif
Mebendazole

- Bahan-bahan tidak aktif

Isomalt, microcrystalline cellulose, aspartame, colloidal silicon dioxide, precipitated silicon dioxide, banana flavour, vanilla flavour, quinoline yellow lake, magnesium stearate.

- Nombor MAL:

MAL06061546X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn. Bhd.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

22/02/2023

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)150223/00013