

# M-ZOLE SUSPENSION

Mebendazole (500mg/10ml)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan M-zole Suspension
2. Bagaimana M-zole Suspension berfungsi
3. Sebelum menggunakan M-zole Suspension
4. Cara menggunakan M-zole Suspension
5. Semasa menggunakan M-zole Suspension
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan M-zole Suspension
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan M-zole Suspension

M-zole Chewable Tablet ialah rawatan dos tunggal terhadap jangkitan cacing usus tunggal atau campuran.

## Bagaimana M-zole Suspension berfungsi

M-zole Chewable Tablet mengandungi mebendazole yang berfungsi dengan menghentikan cacing daripada menggunakan gula glukosa dan menyebabkan kematian cacing.

## Sebelum menggunakan M-zole Suspension

### - Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil produk ini jika anda alah kepada mebendazole, ubat-ubatan yang serupa atau mana-mana bahan lain dalam produk.

### - Sebelum mula menggunakan

Rujuk doktor anda sebelum menggunakan jika anda mengalami gangguan hati.

Tidak boleh diberikan kepada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun melainkan disyorkan oleh doktor.

Tidak disyorkan untuk digunakan semasa mengandung atau semasa menyusui.

### - Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat seperti:

- carbamazepine, phenytoin (ubat yang digunakan untuk sawan)
- cimetidine (ubat yang digunakan untuk pedih ulu hati dan ulser perut)

## Cara mengambil M-zole Suspension

### - Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak melebihi 2 tahun:

Ambil 10ml sekali sahaja.

Ambil dengan segelas penuh air. Goncang sebatil sebelum digunakan.

### - Bila perlu digunakan

Ambil sekali sahaja atau seperti diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

### - Berapa lama perlu digunakan

Dos kedua boleh diambil selepas 2 hingga 3 minggu jika jangkitan cacing berulang lagi.

### - Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa M-zole Suspension, ambilkannya apabila anda teringat. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

### - Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda atau sesiapa terambil terlalu banyak ubat ini, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera. Gangguan perut dan usus mungkin berlaku.

## Semasa mengambil M-zole Suspension

### - Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

Jika simptom berlarutan, sila dapatkan nasihat doktor.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil sebarang ubat baharu tanpa nasihat doktor anda.

### - Perkara yang perlu diberi perhatian

Semua ahli keluarga dan orang lain yang mempunyai kontak rapat harus dirawat serentak untuk mencegah jangkitan cacing berulang.

## Kesan-kesan Sampingan

Kesan-kesan sampingan termasuk gangguan perut dan usus, cirit-birit, sakit kepala dan pening mungkin berlaku tetapi jarang.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan semasa mengambil M-zole Suspension.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npa.gov.my](http://npa.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## Cara Penyimpanan dan Pelupusan M-zole Suspension

### - Penyimpanan

- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya, haba dan kelembapan.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak
- Pastikan botol tertutup rapat.

### - Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

## Maklumat Lanjut

### - Rupa dan warna produk

Suspensi berwarna kuning muda dengan perisa pisang dan vanilla.

### - Bahan-bahan

- Bahan aktif  
Mebendazole 500mg.

- Bahan-bahan tidak aktif

Citric acid, tragacanth gum, sugar, sorbitol solution 70%, xanthan gum, purified water, vanilla flavour, banana flavour, methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, sodium benzoate, quinoline yellow.

### - Nombor MAL:

MAL06091453X

## Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn. Bhd.  
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,  
Taman I.K.S. Bukit Minyak,  
14000 Bukit Mertajam,  
Pulau Pinang, Malaysia.

## Tarikh kemaskini RiMUP

23/02/2023

Nombor Siri:

NPRA(R2/1)230221/1018