

FLEXIJOINT GLUCOSAMINE 500MG CAPSULE

Glucosamine Sulphate (500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule
2. Bagaimana Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule berfungsi
3. Sebelum mengambil Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule
4. Cara mengambil Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule
5. Semasa mengambil Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule

Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule digunakan sebagai terapi tambahan untuk osteoarthritis.

Bagaimana Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule berfungsi

Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule mengandungi Glukosamin yang membentuk tisu rawan dalam badan dan memberi aktiviti perinciran dengan meningkatkan pengeluaran bendalir sinovia.

Sebelum mengambil Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil produk ini jika anda alergi (hipersensitiviti) terhadap Glukosamin, atau mana-mana bahan-bahan lain dalam produk ini.

Produk ini tidak sesuai untuk mereka yang alergi kepada kerang-kerangan.

- Sebelum mula mengambil

Produk ini patut diambil di bawah penyeliaan perubatan bagi wanita yang mengandung dan menyusukan. Administrasi bagi trimester pertama kehamilan perlu dielakkan.

- Jika mengambil ubat- ubatan lain

Glukosamin mungkin mengurangkan keberkesanan agen antidiabetik seperti: Acarbose, Acetohexamide, Chlorpropamide, Glipizide, Glyburide, Metformin, Miglitol, Pioglitazone, Repaglinide, Rosiglitazone, Glimepiride, Tolbutamide dan Troglitazone. Glukosamin mungkin juga mengurangkan keberkesanan agen antikanser seperti Doxorubicin, Etoposide dan Teniposide. Glukosamin meningkatkan kesan Warfarin sekiranya diambil seiringan.

Cara mengambil Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule

- Berapa banyak harus digunakan

Permulaan: Ambil 1 kapsul 3 kali sehari sebelum makan.

Terapi ini harus dikekalkan sekurang-kurangnya 3 bulan (atau ikut arahan

profesional kesihatan) untuk mendapat kesan yang nyata.

Pengekalan: Ambil 1 kapsul 2 kali sehari sebelum makan.

Selepas terapi selama 3 bulan, dos boleh ditambah atau dikurangkan mengikut keadaan peribadi.

- Bila perlu diambil

Boleh diambil sebelum makan.

- Berapa lama perlu diambil

Sila mengikuti nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule, ambilkannya apabila anda teringat. Jangan cuba beri dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tiada maklumat yang terlebih dos dilaporkan.

Semasa mengambil Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule

- Perkara yang perlu dilakukan

Untuk rawatan yang mendasari osteoarthritis, adalah dinasihati supaya mengambil ubat penahan sakit dan anti inflamasi bersama tempoh rawatan selama 2 atau 3 minggu sekiranya diperlukan sebab kesan terapi hanya boleh diperhatikan selepas 2 hingga 3 minggu.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Keselamatan dan keberkesanan belum ditentukan untuk kanak-kanak. Oleh itu, elakkannya daripada kanak-kanak.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Pesakit gangguan fungsi hati dan buah pinggang perlu diperhatikan di bawah pengawasan perubatan semasa mengambil produk ini.

Kesan Sampingan

Kardiavaskular: Periferal edema dan tachycardia telah dilaporkan.

Sistem Saraf Pusat: Mengantuk, sakit kepala, insomnia jarang sekali diperhati.

Gastrosus: Mual, muntah, cirit-birit, dispepsia, sakit gastrik, sembelit, pedih hulu hati dan anoreksia juga dinyatakan semasa terapi oral dengan Glukosamin. Kulit: Reaksi kulit seperti eritema dan pruritus telah dilaporkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Flexijoint Glucosamine 500mg Capsule

- Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya, kepanasan dan kelembapan.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Kapsul putih merah yang mengandungi serbuk putih halus.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan aktif
Glucosamine Sulphate 500mg.

Bahan-bahan tidak aktif
Magnesium Stearate, Isomalt.

- Nombor MAL:

MAL07091075X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

WINWA MEDICAL SDN. BHD.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

28/05/2024

Nombor Siri:

NPRA(R2/1)220301/844