

FREEDERM GEL

Terbinafine hydrochloride (1%w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Freederm Gel
2. Bagaimana Freederm Gel berfungsi
3. Sebelum menggunakan Freederm Gel
4. Cara menggunakan Freederm Gel
5. Semasa menggunakan Freederm Gel
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Freederm Gel
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Freederm Gel

Freederm Gel mengandungi bahan aktif Terbinafine Hydrochloride yang digunakan untuk rawatan jangkitan kulat pada:

- Kawasan pangkal paha.
- Kulit (cacing gelang).
- Kuku jari kaki dan tangan (kuku berwarna kuning, legap dan menebal).
- Kaki (*athlete's foot*).

Bagaimana Freederm Gel berfungsi

Freederm Gel mempunyai aktiviti antikulat dengan spektrum yang luas. Terbinafine berfungsi dengan menyerang pertumbuhan kulat, yang kemudiannya menyebabkan kelemahan dan kematian kulat.

Sebelum mengguna Freederm Gel

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Freederm Gel jika anda alah kepada Terbinafine hydrochloride atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut produk).

- Sebelum menggunakan Freederm Gel

Mengandung dan menyusukan anak –

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengguna ubat-ubatan lain

Terbinafine biasanya tidak menjejaskan aktiviti ubat lain.

Cara menggunakan Freederm Gel

- Berapa banyak harus digunakan

Bersihkan kawasan jangkitan dengan air suam dan keringkan sebelum menggunakan ubat.

Sapukan lapisan nipis ke kawasan yang dijangkiti dan persekitarannya. Gosokkan perlahan-lahan. Rawatan boleh diulang jika perlu.

- Bila perlu digunakan

Sapukan gel ini sekali sehari.

- Berapa lama perlu digunakan

Untuk mengelakkan jangkitan berulang, teruskan rawatan selama satu hingga dua minggu walaupun tiada tanda atau gejala jangkitan.

- Jika terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan tunggu untuk menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapu dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakan secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa mengguna Freederm Gel

- Perkara yang perlu dilakukan

Hubungi doktor atau ahli farmasi jika simptom anda bertambah teruk atau berlarutan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan Freederm Gel untuk keadaan lain kecuali diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan sentuhan dengan mata, hidung dan mulut. Jangan menelan ubat ini. Ubat ini hanya untuk kegunaan pada kulit sahaja.

Kesan Sampingan

Kadang-kala kegatalan atau kemerahan kulit mungkin berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Freederm Gel

- Penyimpanan

- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput atau jika tiub bocor atau jika penutup muncung tiub patah.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Freederm Gel ialah gel lembut berwarna putih hingga putih pudar.

- Bahan-bahan

Bahan aktif

Terbinafine hydrochloride 1%w/v

Bahan-bahan tidak aktif

Propylene glycol, carbomer 940, sodium hydroxide 1M, isopropyl myristate, hydrogenated polyisobutene, polysorbate 80, isopropyl alcohol, n-methyl-2pyrrolidone, benzyl alcohol, butylated hydroxytoluene, menthol, purified water.

- Nombor MAL:

MAL08021538X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn Bhd

1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3, Taman I.K.S. Bukit Minyak, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

23/02/2021

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)010221/00004