

FUDERM 2%W/W CREAM

Fusidic Acid (2%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Fuderm 2%w/w Cream
2. Bagaimana Fuderm 2%w/w Cream berfungsi
3. Sebelum mengguna Fuderm 2%w/w Cream
4. Cara mengguna Fuderm 2%w/w Cream
5. Semasa mengguna Fuderm 2%w/w Cream
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Fuderm 2%w/w Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Fuderm 2%w/w Cream

Fuderm 2%w/w Cream digunakan untuk merawat kulit yang dijangkiti oleh bakteria tertentu, seperti impetigo (bernanah, berkerak, bahagian bengkak), luka yang dijangkiti, folliculitis (jangkitan bakteria), bisul dan pekung (bengkak yang bernanah) sycosis barbae (*barbers itch*), hidradenitis (luka meradang), paronychia (penyakit kuku), eritrosma (jangkitan kulit).

Bagaimana Fuderm 2%w/w Cream berfungsi

Fuderm 2% w/w Cream mengandungi Fusidic Acid. Ia adalah jenis antibiotik yang berfungsi dengan membunuh kuman (bakteria) yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum mengguna Fuderm 2%w/w Cream

- Bila tidak boleh mengguna

Jangan mengguna jika anda alergi kepada Fusidic Acid atau mana-mana bahan-bahan lain dalam produk ini.

- Sebelum mula mengguna

Bercakap dengan doktor, ahli farmasi atau jururawat sebelum menggunakan Fuderm 2%w/w Cream.

- Ambil lebih perhatian jika anda menggunakan ubat ini dekat kawasan mata atau mata kanak-kanak.

- Sekiranya anda menggunakan krim ini dalam jangka masa yang panjang atau jumlah yang banyak, ia mungkin

mendorong kesan sampingan yang lebih tinggi. Kulit anda mungkin lebih sensitif terhadap ubat ini.

- Anda tidak boleh menggunakan ubat ini untuk masa yang lama atau dalam jumlah yang banyak.

Mengandung dan menyusukan anak

- Jika anda mengandung, anda fikir anda mengandung atau sedang menyusukan anak, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan ubat ini. Beritahu doktor anda jika anda didapati mengandung semasa menggunakan ubat ini.

- Jika mengguna ubat-ubatan lain

Beritahu doktor, ahli farmasi atau jururawat anda jika anda mengambil, baru-baru ini mengambil atau mungkin mengambil ubat-ubatan lain.

Cara mengguna Fuderm 2%w/w Cream

Keluarkan penutup. Pastikan meterai tidak pecah sebelum menggunakan krim terlebih dahulu, kemudian tolak pencucuk dalam penutup melalui pengedap pada tiub. Sentiasa cuci tangan sebelum menggunakan Fuderm 2%w/w Cream.

- Berapa banyak harus digunakan

Tempoh rawatan akan ditentukan oleh doktor anda. Biasanya sapukan sedikit krim digunakan pada kulit terjangkiti 2 hingga 3 kali setiap hari. Gosokkan ubat perlahan-lahan pada kulit.

- Bila perlu diguna

Anda harus mengikuti dos yang disyorkan dan tidak boleh menggunakan lebih daripada dos yang ditetapkan.

- Berapa lama perlu diguna

Tempoh rawatan patut ditentukan oleh doktor anda. Rawatan biasanya 1 minggu, ataupun lebih lama. Ini bergantung kepada jenis jangkitan dan hasil rawatan. Berikan perhatian khusus jika anda menggunakan krim untuk masa yang lama atau dalam jumlah yang besar, kerana ia berpeluang lebih tinggi untuk mendapat kesan sampingan. Oleh itu, ikut tempoh rawatan yang dinasihat oleh doktor anda.

- Jika terlupa mengguna

Jika anda terlupa guna Fuderm 2%w/w Cream gunakannya apabila anda teringat.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda secara tidak sengaja mengguna krim terlalu banyak atau tertelan sedikit krim, ini tidak mungkin menyebabkan apa-apa kemudaratan. Jika kuantiti krim yang lebih besar secara tidak sengaja ditelan atau sekiranya anda bimbang, hubungi doktor, ahli farmasi atau jabatan A & E untuk nasihat.

Semasa mengguna Fuderm 2%w/w Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Semak dengan doktor anda jika gejala-gejala berterusan atau semakin teruk. Melainkan anda menggunakan krim untuk merawat tangan anda, selalu basuh tangan anda selepas menggunakan Fuderm 2%w/w Cream.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Sekiranya anda berhenti menggunakan Fuderm 2% w/w Cream terdahulu, jangkitan kulit mungkin berulang atau tidak sembuh. Jangan hentikan rawatan melainkan dinasihat oleh doktor atau ahli farmasi anda. Untuk kegunaan luaran sahaja. Elakkan bersentuhan dengan mata, hidung dan mulut. Tidak boleh dimakan.

Jangan gunakan Fuderm 2% w/w Cream untuk merawat keadaan lain melainkan jika doktor atau ahli farmasi memberitahu anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sekiranya anda secara tidak sengaja mengenakan sebarang ubat di mata anda, basuh dengan air sejuk dengan segera, kemudian bersihkan mata anda dengan pencuci mata secepat mungkin. Mata anda mungkin menyengat. Jika anda mula menghadapi masalah penglihatan atau mata anda terasa sakit, hubungi doktor anda segera.

Kesan Sampingan

Seperti ubat-ubat lain, Fuderm 2%w/w Cream boleh menyebabkan kesan sampingan tetapi tidak semestinya semua orang mengalaminya.

FUDERM 2%W/W CREAM

Fusidic Acid (2%w/w)

Fuderm 2%w/w Cream lazimnya diterima dengan baik dan tindak balas hipersensitif hanya berlaku dengan kekerapan yang sangat rendah.

Anda mesti mendapatkan bantuan perubatan segera jika anda mempunyai sebarang gejala berikut.

Anda mungkin mempunyai reaksi alergi:

- Kesukaran bernafas
- Muka atau kerongkong bengkak
- Kulit mengalami ruam yang teruk.

Kesan sampingan yang luar biasa

- Kerengsaan di tapak di mana krim ini disapu (termasuk kesakitan, rasa terbakar, kerengsaan, kepedihan dan kemerahan kulit)
- Gatal-gatal
- Ruam
- Ekzema

Kesan sampingan yang jarang berlaku

- Konjunktivitis
- Gatal-gatal
- Bengkak kulit
- Lepuh kulit

Jika anda mendapat apa-apa kesan sampingan, berbincang dengan doktor, ahli farmasi atau jururawat anda. Ini termasuk apa-apa kesan sampingan yang mungkin tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Fuderm 2%w/w Cream

- Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak
- Pastikan penutup tertutup rapat

Pelupusan

Jangan gunakan Fuderm 2%w/w Cream selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan atas bungkusan. Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanyakan ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat-ubatan tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi persekitaran.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Fuderm 2%w/w Cream adalah salap putih yang licin.

- Bahan-bahan

- Bahan-bahan aktif

Fusidic Acid 2%w/w

Setiap 1 g Fuderm 2%w/w Cream mengandungi Fusidic Acid 20mg dalam krim asas.

- Bahan-bahan tidak aktif

Bahan Pengawet: Chlorocresol 0.1% w/w, Monosodium Phosphate, Tuberose fragrance, Cetomacrogol Emulsifying Wax, White Soft Paraffin, Liquid Paraffin, Butylated Hydroxytoluene, N-Methylpyrrolidone, Isopropyl Myristate, Mono Disodium Phosphate, Purified Water.

- Nombor MAL:

MAL0000000AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

WINWA MEDICAL SDN. BHD.

1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,

Taman I.K.S. Bukit Minyak,

14000 Bukit Mertajam,

Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

14/02/2020

Nombor Siri:

NPRA(R2)19/44