

BENZ-C DOUBLE ACTION LOZENGE

Benzylamine HCl / Cetylpyridinium chloride (3mg / 1.33mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Benz-C Double Action Lozenge
2. Bagaimana Benz-C Double Action Lozenge berfungsi
3. Sebelum mengguna Benz-C Double Action Lozenge
4. Cara mengguna Benz-C Double Action Lozenge
5. Semasa mengguna Benz-C Double Action Lozenge
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Benz-C Double Action Lozenge
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Benz-C Double Action Lozenge

Benz-C Double Action Lozenge digunakan untuk melegakan keradangan dan kesakitan mulut, gusi dan ulser disebabkan gigi palsu. Cetylpyridinium Chloride mempunyai aktiviti antiseptik.

Bagaimana Benz-C Double Action Lozenge berfungsi

Benz-C Double Action Lozenge berfungsi dengan mengurangkan kesakitan, kemerahan dan bengkak.

Sebelum menggunakan Benz-C Double Action Lozenge

- Bila tidak boleh mengguna

Jangan mengguna produk ini jika anda alah kepada *Benzylamine HCl*, *Cetylpyridinium Chloride* atau bahan-bahan lain dalam produk ini.

Jangan mengguna ubat ini jika anda hamil atau merancang untuk hamil. Jika anda tidak pasti sama ada anda harus menggunakan ubat ini, berbincang dengan ahli farmasi atau doktor anda.

- Sebelum mula mengguna

Beritahu ahli farmasi anda jika anda mempunyai alahan kepada apa-apa ubat, makanan, pengawet atau pewarna lain. Beritahu ahli farmasi anda jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati.

Masih tidak diketahui sama ada *Benzylamine HCl* atau *Cetylpyridinium Chloride* akan meresap ke dalam air susu ibu.

Ahli farmasi atau doktor anda akan membincangkan potensi manfaat dan risiko menggunakan ubat ini jika anda menyusu.

- Jika mengguna ubat- ubatan lain

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda mengguna apa-apa ubat lain, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi atau herba dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan. Ahli farmasi atau doktor anda akan lebih mengetahui tentang maklumat mengenai ubat tersebut sama ada apa yang patut dielakkan semasa penggunaan.

Cara menggunakan Benz-C Double Action Lozenge

- Berapa banyak harus digunakan.

Untuk kegunaan oral sahaja.

Jangan mengunyah lozeng. 1 lozeng dihisap secara perlahan setiap 1 hingga 2 jam seperti yang diperlukan sehingga maksimum 12 lozeng sehari.

Tidak disyorkan untuk kanak-kanak di bawah umur 6 tahun.

Penggunaan *Benz-C Double Action Lozenge* harus dipertimbangkan pada pesakit yang mempunyai masalah ginjal atau hati.

- Bila perlu digunakan

Guna lozeng setiap 1 hingga 2 jam atau semasa perlu.

- Berapa lama perlu digunakan

Rawatan tanpa gangguan tidak patut melebihi 7 hari.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa menggunakan *Benz-C Double Action Lozenge* gunakannya apabila anda teringat. Jangan cuba gunakan dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat, Jika anda berfikir bahawa anda atau orang lain mungkin menggunakan atau menelan terlalu banyak *Benz-C Double Action Lozenge*, lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Semasa menggunakan Benz-C Double Action Lozenge

- Perkara yang perlu dilakukan

Ahli farmasi atau doktor anda akan menilai keadaan anda dan memutuskan sama ada anda perlu menggunakan ubat tersebut.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan ubat ini untuk keadaan lain kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika keadaan anda tidak bertambah baik, sila jumpa doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat lanjut.

Kesan-kesan Sampingan

Sesetengah kesan sampingan yang tidak diingini seperti rasa kebas atau pedih pada mulut, mulut kering dan dahaga.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat jika berlaku yang berikut:

- sesak nafas
- pernafasan bersiul atau kesukaran bernafas
- bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian badan yang lain
- ruam kulit, kulit gatal atau gatal pada sebahagian tubuh

Senarai di atas termasuk kesan-kesan sampingan yang sangat serius. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera atau masuk ke hospital.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Benz-C Double Action Lozenge

- Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya dan kelembapan.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

BENZ-C DOUBLE ACTION LOZENGE

Benzydamine HCl / Cetylpyridinium chloride (3mg / 1.33mg)

- Pelupusan

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat. Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat-ubatan tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Benz-C Double Action Lozenge adalah lozeng berwarna oren, bulat dan rata di kedua-dua muka dengan perisa buah-buahan. Ia juga lozeng tanpa gula.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Benzydamine HCl 3mg

Cetylpyridinium chloride 1.33mg

- Bahan tidak aktif

Isomalt, copovidone, microcrystalline cellulose, ammonium glycyrrhizinate, sucralose, colloidal silicon dioxide, sodium citrate dihydrate, precipitated silicon dioxide, menthol, orange flavour, aniseed oil, mixed fruit flavour powder, sunset yellow lake, magnesium stearate.

- Nombor MAL:

MAL21036019AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn Bhd
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

17/05/2023

Nombor Siri:

NPRA(R2)20/124