

HOCODIN LOZENGE

Dequalinium chloride (250mcg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hocodin Lozenge
2. Bagaimana Hocodin Lozenge berfungsi
3. Sebelum mengambil Hocodin Lozenge
4. Cara mengambil Hocodin Lozenge
5. Semasa mengambil Hocodin Lozenge
6. Kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hocodin Lozenge
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Hocodin Lozenge

Hocodin Lozenge digunakan untuk melegakan jangkitan ringan pada mulut dan kerongkong.

Bagaimana Hocodin Lozenge berfungsi

Hocodin Lozenge mengandungi bahan aktif dequalinium chloride yang mempunyai kesan antiseptik dan berfungsi dengan membunuh pelbagai jenis bakteria, kulat, dan virus.

Sebelum mengambil Hocodin Lozenge

– Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil Hocodin Lozenge sekiranya anda:

- mempunyai alahan terhadap dequalinium chloride atau mana-mana bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

– Sebelum mula mengambil

Mengandung dan menyusukan anak

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusukan bayi sebelum menggunakan sebarang ubat.

Beritahu doktor anda jika anda diketahui menghidap phenylketonuria (penyakit genetik yang jarang berlaku).

– Jika mengambil ubat- ubatan lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara mengambil Hocodin Lozenge

– Berapa banyak harus digunakan

Hisap 1 lozenge perlahan-lahan setiap 3 jam atau apabila perlu. Maksimum 8 lozenge sehari.

– Bila perlu diambil

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

– Berapa lama perlu diambil

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

– Jika terlupa mengambil

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

– Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau orang lain mungkin telah menggunakan terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Semasa mengambil Hocodin Lozenge

– Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Hocodin Lozenge.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

– Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Hocodin Lozenge kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

– Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan Hocodin Lozenge terhadap anda.

Kesan Sampingan

Secara amnya, Hocodin Lozenge tidak diketahui menyebabkan sebarang kesan sampingan.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or *Vaccines (AEFI)*].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Hocodin Lozenge

– Penyimpanan

- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya, kepanasan dan kelembapan.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

– Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

– Rupa dan warna produk

Lozenge bentuk bulat berwarna hijau, berperisa pudina dengan 'W' pada satu muka dan skor pada muka sebelah.

– Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Dequalinium chloride
- Bahan-bahan tidak aktif
Isomalt, ammonium glycyrrhizinate, aspartame, sodium citrate dihydrate, colloidal silicon dioxide, precipitated silicon dioxide, menthol, peppermint oil, aniseed oil, orange durarome, brilliant blue lake, quinoline yellow lake, magnesium stearate.

– Nombor MAL:

MAL11075007X

HOCODIN LOZENGE

Dequalinium chloride (250mcg)

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran

Produk

Winwa Medical Sdn. Bhd.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

05/12/2025

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)310725/00060