

FLEXIJJOINT 3-IN-1 JOINT CARE POWDER

Glucosamine HCl, Chondroitin Sulfate, Methylsulfonylmethane (1500mg, 1200mg, 900mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder
2. Bagaimana flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder berfungsi
3. Sebelum mengambil flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder
4. Cara mengambil flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder
5. Semasa mengambil flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder

flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder digunakan sebagai terapi tambahan untuk osteoarthritis.

Bagaimana flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder berfungsi

flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder mengandungi Glukosamin yang membentuk tisu rawan dalam badan dan memberi aktiviti perlincrean dengan meningkatkan pengeluaran bendalir sinovia. Kondroitin merupakan komponen penting dalam struktur rawan dan memberikan ketahanan terhadap mampatan. MSM dapat menghentikan proses peradangan dan sering diguna dalam melegakan kesakitan sendi arthritis.

Sebelum mengambil flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil produk ini jika anda alergi (hipersensitiviti) terhadap Glukosamin, Kondroitin dan MSM. Produk ini tidak sesuai untuk mereka yang alergi kepada kerang.

- Sebelum mula mengambil

Produk ini patut diambil di bawah penyeliaan perubatan bagi wanita yang mengandung dan menyusui. Pengambilan bagi trimester pertama kehamilan perlu dielakkan.

- Jika mengambil ubat- ubatan lain

Glukosamin mungkin mengurangkan keberkesanan agen antidiabetik seperti: Acarbose, Acetohexamide, Chlorpropamide, Glipizide, Glyburide, Metformin, Miglitol, Pioglitazone, Repaglinide, Rosiglitazone, Glimepiride, Tolbutamide dan Troglitazone.

Glukosamin mungkin juga mengurangkan keberkesanan agen antikanser seperti Doxorubicin, Etoposide dan Teniposide. Glukosamin meningkatkan kesan Warfarin sekiranya diambil bersama. Kitosan mungkin membentuk kompleks dengan Kondroitin Sulfat dan mengurangkan penyerapannya.

Cara mengambil flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa:

Ambil kandungan 1 sachet (larutkan dalam 250ml air) satu kali sehari sebelum makan atau ikut arahan profesional kesihatan.

- Bila perlu diambil

Boleh diambil sebelum makan.

- Berapa lama perlu diambil

Sila mengikuti nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa ambil flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder, ambilkannya apabila anda teringat. Jangan cuba beri dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tiada maklumat yang terlebih dos dilaporkan.

Semasa mengambil flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder

- Perkara yang perlu dilakukan

Glukosamin merawat penyebab osteoarthritis dan kesan terapi hanya boleh dilihat selepas 2 hingga 3 minggu. Oleh itu, adalah dinasihatkan untuk mengambil ubat tahan sakit atau anti-radang pada 2 hingga 3

minggu yang pertama semasa terapi bersama Glukosamin jika diperlukan. Rujukan doktor adalah diperlukan supaya meniadakan kehadiran keadaan sendi yang lain / penyakit yang mana rawatan alternatif perlu dipertimbangkan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Keselamatan dan keberkesanan belum ditentukan untuk kanak-kanak. Oleh itu, elakkannya daripada kanak-kanak.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Pesakit yang mengalami gangguan fungsi hati atau buah pinggang yang serius perlu diperhatikan di bawah pengawasan perubatan semasa mengambil produk ini.

Kesan Sampingan

“Peripheral oedema” (bengkak) dan takikardia (peningkatan denyutan jantung) telah dilaporkan pada pesakit-pesakit yang mengambil secara oral dalam ujian klinikal menyelidik osteoarthritis yang lebih meluas (hubungan sebab-akibat belum dibuktikan); mengantuk, sakit kepala, “insomnia” (kesukaran tidur) jarang diperhatikan semasa terapi (kurang daripada 1%). Mual, muntah, cirit-birit, dispepsia (gangguan pencernaan), sakit gastrik, sembelit, pedih hulu hati dan anoreksia (kurang berselera) jarang dinyatakan semasa pengambilan Glukosamin secara oral. Reaksi kulit seperti eritema (kemerahan pada kulit) dan “pruritus” (rasa gatal) telah dilaporkan dalam terapeutik Glukosamin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npa.moh.gov.my (Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

FLEXIJOINT 3-IN-1 JOINT CARE POWDER

Glucosamine HCl, Chondroitin Sulfate, Methylsulfonylmethane (1500mg, 1200mg, 900mg)

Cara Penyimpanan dan Pelupusan flexijoint 3-in-1 Joint Care Powder

- - Penyimpanan
- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya, kepanasan dan kelembapan.
- Jauhkan daripada kanak-kanak

• - Pelupusan

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Serbuk putih dengan perisa oren. Ia larut dalam air dan membentuk larutan lutsinar tanpa warna.

Bahan-bahan

Bahan-bahan aktif

Setiap sachet mengandungi Glukosamin 1500mg, Kondroitin 1200mg dan MSM 900mg.

Bahan-bahan tidak aktif

Isomalt, Oren Durarome, Serbuk Perisa Jus Oren, Asid Sitrik dan Sukralos.

- Nombor MAL:

MAL14095056X

Manufacturer and Product Registration Holder

Winwa Medical Sdn. Bhd.

1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

13/6/2018

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)XXXXXX/XXXXX