

WINDEXCO PE SYRUP

Dextromethorphan HBr / Phenylephrine HCl / Chlorpheniramine Maleate (10mg/5ml / 5mg/5ml / 2mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Windexco PE Syrup
2. Bagaimana Windexco PE Syrup berfungsi
3. Sebelum mengambil Windexco PE Syrup
4. Cara menggunakan Windexco PE Syrup
5. Semasa mengambil Windexco PE Syrup
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Windexco PE Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Windexco PE Syrup

Windexco PE Syrup digunakan untuk rawatan batuk dan selesema seperti batuk tidak produktif yang beriritasi, hidung berair dan hidung tersumbat. Ia juga dapat melegakan bersin, mata berasa gatal dan berair yang berkaitan dengan selesema, alergi danjangkitan pernafasan yang lain.

Bagaimana Windexco PE Syrup berfungsi

Windexco PE Syrup mengandungi 3 bahan aktif. Dextromethorphan adalah ubat antitusif (penahan batuk) kelas morphinan. Ia menghentikan batuk secara menekan refleks batuk pada sistem saraf pusat di otak. Phenylephrine bertindak sebagai dekongestan dengan kesan langsung ke atas reseptor α -adrenergic.

Chlorpheniramine adalah antagonis histamin reseptor H1 yang berfungsi untuk mengurangkan kesan-kesan diperantara oleh histamin.

Sebelum mengambil Windexco PE Syrup

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil produk ini sekiranya anda mempunyai tekanan darah tinggi yang teruk, aritma cepat ventrikel, periferik atau mesenterik trombosis vaskular. Jangan mengambil produk ini jika anda alergi (hipersensitiviti) terhadap Dextromethorphan HBr, Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate atau bahan-bahan lain yang dalam produk ini. Produk ini tidak sesuai untuk batuk berterusan atau kronik dan pesakit yang terima MAOI atau 2 minggu selepas menghentikannya. Ia tidak boleh digunakan pada bayi pramatang atau penuh bulan.

- Sebelum mula mengambil

Produk ini perlu digunakan dengan berhati-hati pada kanak-kanak atopik, pesakit yang diberi sedatif atau lemah, dan pesakit terhadap posisi berbaring. Perhatian perlu diambil pada pesakit dengan glaukoma sudut-tertutup, hipertrofi prostat, ulser saluran penghadaman atas, obstruksi aliran keluar gastrik atau sumbatan leher pundi.

Jika mengambil ubat-ubatan lain

Jangan mengambil produk ini jika anda mengambil mana-mana ubat-ubatan ini: Tricyclic antidepressants (TCAs), antipsychotics, anxiolytics and hypnotics, cimetidine, ciprofloxacin, domperidone, metoclopramide, mexiletine, CYP2D6 inhibitors, ritonavir, alcohol.

Cara mengambil Windexco PE Syrup

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak melebihi 12 tahun:

Ambil 10ml setiap 6 jam.

Kanak-kanak 6 hingga 12 tahun:

Ambil 5ml setiap 6 jam.

Kanak-kanak 2 hingga 5 tahun:

Ambil 2.5ml setiap 6 jam.

Jangan melebihi 4 dos dalam tempoh 24 jam.

Jangan mengambil lebih daripada cadangan dos kecuali dinasihatkan oleh doktor.

- Bila perlu diambil

Harus diambil dengan makanan.

- Berapa lama perlu diambil

Sila mengikuti nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa ambil Windexco PE Syrup, ambil secepat mungkin apabila anda teringat. Jangan cuba beri dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya terambil berlebihan, sila menghubungi Pusat Racun Negara (1800 888 099) atau doktor anda, ataupun pergi ke unit kecemasan hospital yang terdekat secepat mungkin.

Semasa mengambil Windexco PE Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

Sila merujuk kepada ahli farmasi / doktor jika simptom berlarutan / bertambah teruk.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Dilarang beri kepada kanak-kanak di bawah 2 tahun.
- Perhatian dan nasihat doktor atau ahli farmasi perlu diambil semasa beri kepada kanak-kanak 2 hingga 6 tahun.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Produk ini mungkin menyebabkan rasa mengantuk. Jangan memandu atau mengendalikan mesin. Elakkan minuman beralkohol.

Kesan Sampingan

Loya, masalah epigastric, anoreksia, muntah, cirit-birit, sembelit, gangguan GI lain, mengantuk dan pening, keresahan, kebingungan, ketakutan, kelemahan, sakit

prekordium, menggeletar, gangguan pernafasan, pucat (kulit), tindak balas pilomotor, rasa sedasi dan hipotensi mungkin berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Windexco PE Syrup

- Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Tutupkan penutup dengan ketat.
- Jauhkan daripada kanak-kanak

- Pelupusan

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Larutan sirap yang berwarna perang dan rasa sedap. Tanpa alkohol.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan-bahan aktif

Setiap	5ml	mengandungi
Dextromethorphan	HBr	10mg,
Phenylephrine	HCl	5mg,
Chlorpheniramine	Maleate	2mg.

- Bahan-bahan tidak aktif

Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Sodium Saccharin, Sucralose, Xanthan Gum, Sorbitol Powder, Liquid Glucose, Sodium Citrate, Menthol, Peppermint Oil, Aniseed Oil, Hydrogenated Castor Oil, Liquid Caramel, Purified Water.

- Nombor MAL:

MAL16015070AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Winwa Medical Sdn. Bhd.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

14/01/2021

Nombor Siri:

NPRA(R2/1)201015/533