Oroplus Gel

Lidocaine, Triamcinolone Acetonide, Chlorhexidine Hydrochloride (2.5%w/w, 0.1%w/w, 0.5%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Oroplus Gel
2. Bagaimana Oroplus Gel berfungsi
3. Sebelum mengambil Oroplus Gel
4. Cara mengambil Oroplus Gel
5. Semasa mengambil Oroplus Gel
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Oroplus Gel
8. Deskripsi Produk
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Oroplus Gel

Oroplus Gel adalah agen anestetik, antibakteria dan anti inflamasi yang digunakan pada jangkitan mulut atau lelasan. Ia menyembuh dan melegakan kesakitan dan ketidakselesaan luka-luka yang teruk dan kronik pada gusi, lelangit, geraham dan lidah.

Bagaimana Oroplus Gel berfungsi

Lidocaine adalah anestetik luaran yang berguna, ia cepat diserap melalui membran mukus untuk menghentikan kesakitan dan keradangan dalam masa beberapa minit.
Triamcinolone Acetonide adalah kortikosteroid yang berfungsi untuk mengurangkan kemerahan dan pembengkakan tisu yang rosak.
Chlorhexidine mempunyai spektrum aktiviti yang luas terhadap bakteria gram negatif dan gram positif.

Sebelum mengambil Oroplus Gel

- *Bila tidak boleh mengambil*

Jangan mengambil produk ini jika anda alergi (hipersensitiviti) terhadap Lidocaine Hydrochloride, Triamcinolone Acetonide, Chlorhexidine Hydrohloride atau bahan-bahan lain dalam produk ini.

- *Sebelum mula mengambil*

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda alah terhadap ubat-ubatan.

- *Jika mengambil ubat- ubatan lain*

Jangan guna ubat-ubatan lain atas bahagian luka tanpa keizinan doktor.
Lidocaine apabila digunakan dalam kuantiti yang banyak, berulang kali atau ditelan secara sistemik akan diserap dan berinteraksi dengan agen penyekat beta-adrenergik, cimetidine dan lain-lain amide tempatan agen anestetik-derivatif agen antiaritma.
Penggunaan agen enzim yang menggalakkan seperti phenytoin dalam jangka panjang boleh meningkatkan keperluan dos Lidocaine.

Cara mengambil Oroplus Gel

- *Berapa banyak harus digunakan*

Sapukan sedikit gel pada luka 3 hingga 4 kali sehari selepas makan dan pada waktu tidur.

- *Bila perlu diambil*

Anda perlu mengikut dos yang disyorkan dan tidak patut mengambil lebih daripada dos yang ditetapkan.

- *Berapa lama perlu diambil*

Sila mengikuti nasihat doktor atau ahli farmasi.

- *Jika terlupa mengambil*

Jika anda terlupa ambil Oroplus Gel ambilkannya apabila anda teringat. Jangan cuba beri dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Sekiranya anda termakan berlebihan, hubungi doktor atau hospital terdekat dengan segera untuk nasihat rawatan.

Semasa mengambil Oroplus Gel

Perkara yang perlu dilakukan

Periksa dengan doktor anda jika simptom berlarutan atau bertambah teruk.

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Jangan ambil ubat ini untuk keadaan lain kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Oroplus Gel mengandungi Chlorhexidine. Beritahu ahli pakar kesihatan anda jika anda mempunyai alahan yang diketahui untuk Chlorhexidine.
Hentikan penggunaan produk ini dan dapatkan bantuan perubatan segera jika anda mengalami ruam, gatal-gatal, bengkak, kesukaran bernafas, kepala terasa ringan atau denyutan jantung yang cepat.
Oroplus Gel harus digunakan dengan berhati-hati semasa rawatan pada kawasan jangkitan. Rawatan masih diperlukan apabila mukosa trauma teruk muncul kerana ia boleh meningkatkan penyerapan anestetik, sehingga meningkatkan risiko keracunan sistemik.
Herpes simplex di kawasan rawatan boleh berpindah ke kawasan lain, termasuk mata.
Oroplus Gel harus digunakan berhati-hati pada pesakit dengan pemulihan gigi anterior (pengisian gigi depan) dan periodontitis.

Kesan Sampingan

Gangguan sistem imun
Kekerapan tidak diketahui: Hipersensitiviti termasuk kejutan anafilaksis.
Kesan sampingan termasuk ruam kulit, kemerahan, gatal-gatal, atau gatal-gatal, pembengkakan besar seperti sarang pada kulit atau di mulut atau tekak, rasa terbakar, menyengat, bengkak, atau kelembutan.
Gangguan rasa sementara dan pedas berdesing lidah mungkin berlaku pada penggunaan permulaan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.moh.gov.my (Public Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Oroplus Gel

- *Penyimpanan*

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya dan kelembapan.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

- *Pelupusan*

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Deskripsi Produk

- *Rupa dan warna produk*

Oroplus Gel adalah gel putih ke luar putih dengan perisa menthol.

- *Bahan-bahan*

Bahan-bahan aktif

Lidocaine HCl 2.5%w/w, Triamcinolone Acetonide 0.1%w/w dan Chlorhexidine HCl 0.5w/w.

Bahan-bahan tidak aktif

Sodium Saccharin, Sucralose, Poloxamer 407, Carbomer, Propylene Glycol, N-Methyl-2-Pyrrolidone, Aniseed Oil, Menthol, 1M NaOH Solution dan Purified Water.

- Nombor MAL:

MAL00000000AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

WINWA MEDICAL SDN. BHD.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

16/06/2023

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)XXXXXX/XXXXX