

ORALIS PAIN RELIEF GEL

Lidocaine Hydrochloride 0.33%w/w, Cetylpyridinium Chloride 0.1%w/w

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Oralis Pain Relief Gel
2. Bagaimana Oralis Pain Relief Gel berfungsi
3. Sebelum mengambil Oralis Pain Relief Gel
4. Cara mengambil Oralis Pain Relief Gel
5. Semasa mengambil Oralis Pain Relief Gel
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Oralis Pain Relief Gel
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Oralis Pain Relief Gel

Oralis Pain Relief Gel melegakan kesakitan gusi.

Bagaimana Oralis Pain Relief Gel berfungsi

Lidocaine HCl ialah anestetik tempatan yang bekerja dengan menghentikan rasa sakit. *Cetylpyridinium chloride* adalah antiseptik yang mempunyai aktiviti mematikan bakteria.

Sebelum mengambil Oralis Pain Relief Gel

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil produk ini jika anda hipersensitiviti terhadap Lidocaine Hydrochloride, Cetylpyridinium Chloride atau bahan-bahan lain dalam produk ini.

- Sebelum mula mengambil

Biar ahli farmasi atau doktor anda tahu sebarang alahan terhadap ubat-ubatan.

- Jika mengambil ubat- ubatan lain

Jangan guna ubat-ubatan lain atas bahagian luka tanpa keizinan doktor.

Cara mengambil Oralis Pain Relief Gel

- Berapa banyak harus digunakan

Letakkan Oralis Pain Relief Gel yang berkuantiti kecil pada pad kapas atau hujung jari yang bersih dan gosok perlahan-lahan pada gusi. Ulangi selepas 20 minits jika perlu. Gunakan apabila perlu dalam tempoh pertumbuhan gigi..

- Bila perlu diambil

Anda perlu mengikut dos yang disyorkan dan tidak patut mengambil lebih daripada dos yang ditetapkan.

- Berapa lama perlu diambil

Sila mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa ambil Oralis Pain Relief Gel ambilkannya apabila anda teringat. Jangan cuba beri dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda termakan berlebihan, hubungi doktor atau hospital terdekat dengan segera untuk nasihat rawatan.

Semasa mengambil Oralis Pain Relief Gel

- Perkara yang perlu dilakukan

Periksa dengan doktor anda jika simptom berlarutan atau bertambah teruk.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat ini untuk keadaan lain kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan meninggalkan ubat atas counter, meja kecil atau meja di mana kanak-kanak boleh mencapai.

Kesan Sampingan

Tiada maklumat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumer → Reporting).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Oralis Pain Relief Gel

- Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya dan kelembapan.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Oralis Pain Relief Gel adalah gel lutsinar tanpa warna dengan perisa oren.

- Bahan-bahan

Bahan-bahan aktif
Lidocaine HCl 0.33%w/w, Cetylpyridinium Chloride 0.1%w/w.

Bahan-bahan tidak aktif

Poloxamer 407, Carbomer, Sucralose, Propylene Glycol, Orange Flavour, 1M NaOH Solution, Purified Water.

- Nombor MAL:

MAL00000000AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

WINWA MEDICAL SDN. BHD.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

7 July 2017