

Urilyte Syrup

Potassium Citrate 550mg/5ml, Sodium Citrate 550mg/5ml, Citric Acid Anhydrous 333.5mg/5ml

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Urilyte Syrup
2. Bagaimana Urilyte Syrup berfungsi
3. Sebelum mengambil Urilyte Syrup
4. Cara mengambil Urilyte Syrup
5. Semasa mengambil Urilyte Syrup
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Urilyte Syrup
8. Deskripsi Produk
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Urilyte Syrup

Rawatan asidosis metabolik kronik, terutama apabila disebabkan oleh asidosis tiub renal di mana penyelenggaraan jangka panjang air kencing alkali adalah wajar, seperti dalam rawatan pesakit dengan asid urik dan batu ginjal daripada saluran kencing dan sempena pembuangan asid urik melalui kencing dalam terapi gout untuk mengelakkan asid urik nefropati.

Bagaimana Urilyte Syrup berfungsi

Kalium Sitrat dan Natrium Sitrat diserap dan dimetabolismakan kepada Kalium Bikarbonat dan Sodium Bikarbonat, dengan itu bertindak sebagai sistemik alkalisier.

Sebelum mengambil Urilyte Syrup

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil produk ini jika anda alah (hipersensitiviti) kepada Kalium Sitrat, Natrium Sitrat, Asid Sitrik atau bahan-bahan lain dalam produk ini.

- Sebelum mula mengambil

Tidak sesuai untuk pesakit yang mempunyai penyakit ginjal, kerosakan miokardium teruk dan penyakit Addison.

- Jika mengambil ubat- ubatan lain

Pengambilan serentak dengan ubat-ubatan mengandungi kalium, diuretik penjimatan kalium atau ubat-ubatan yang meningkatkan aras kalium (seperti perencat ACE, Glikosida jantung) boleh menyebabkan ketoksikan. Produk ini akan meningkatkan ekskresi ginjal atas ubat berasid seperti salisilat dan barbiturat dan memanjangkan separuh hayat ubat-ubatan asas.

Cara mengambil Urilyte Syrup

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak melebihi 12 tahun:

3 hingga 6 sudu teh (15 hingga 30ml) dan cairkannya dengan air (200ml), 4 kali sehari selepas makan atau mengikut arahan.

Kanak-kanak 6 hingga 12 tahun:

1 hingga 3 sudu teh (5 hingga 15ml) dan cairkannya dengan air (100ml), 4 kali sehari selepas makan atau mengikut arahan.

- Bila perlu diambil

Anda patut mengambil selepas makan atau mengikut regimen dos yang disyorkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan Urilyte Syrup sehingga simptom anda hilang.

- Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa ambil Urilyte Syrup, ambil secepat mungkin apabila anda teringat. Jangan cuba beri dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Pengambilan berlebihan boleh menyebabkan cirit-birit, loya dan muntah-muntah, hypernoia, sawan, hyperkalemia dan alkalosis.

Sekiranya terambil berlebihan, sila menghubungi Pusat Racun Negara (1800 888 099) atau doktor anda, ataupun pergi ke unit kecemasan hospital yang terdekat secepat mungkin.

Semasa mengambil Urilyte Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

Sila merujuk kepada ahli farmasi / doktor jika simptom berlarutan / bertambah teruk.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil Urilyte syrup untuk merawat penyakit lain melainkan doktor atau ahli farmasi anda menasihati anda agar berbuat demikian.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Urilyte Syrup memberi kelegaan simptomatik sahaja dan bukan anti-bakteria.

Kesan Sampingan

Urilyte sirap jarang akan menyebabkan kesan sampingan yang tidak menyenangkan. Walau bagaimanapun, perhatian perlu diambil pada pesakit yang mempunyai masalah buah pinggang untuk mengelakkan hyperkalemia daripada alkalosis, terutama yang kehadiran hypokalsemia.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web nppra.moh.gov.my (Public Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Urilyte Syrup

- Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Tutupkan penutup dengan ketat.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

- Pelupusan

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat. Ubat-ubatan tidak seharusnya dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat-ubatan yang tidak dikehendaki.

Deskripsi Produk

- Rupa dan warna produk

Larutan legap yang berwarna putih pudar ke kuning dan berperisa oren. Tanpa alkohol.

- Bahan-bahan

- Bahan-bahan aktif

Setiap 5ml mengandungi Kalium Sitrat 550mg. Natrium Sitrat 550mg dan Asid Sitrik 333.5mg.

- Bahan-bahan tidak aktif

Metil Hidroksibenzoat, Sukralos, Sukrosa, Gum Xanthan, Perisa Oren, Air Tulen.

- Nombor MAL:

MAL No.: 17015017X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

WINWA MEDICAL SDN. BHD.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

6 September 2017