MENTOPIN ACETYLCYSTEINE 600 EFFERVESCENT TABLET

Acetylcysteine (600mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Mentopin
2. Bagaimana Mentopin berfungsi
3. Sebelum menggunakan Mentopin
4. Cara menggunakan Mentopin
5. Semasa menggunakan Mentopin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Mentopin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Mentopin

Mentopin digunakan untuk mengubati masalah saluran pernafasan yang disebabkan hipersekresi yang tebal dan likat: bronkitis akut, bronkitis kronik dan eksaserbasinya, emfisema peparu, mukoviscidosis dan bronchiectasis.

Bagaimana Mentopin berfungsi

Ubat ini berfungsi dengan cara mencairkan mukus. Ini memudahkan mukus terkeluar apabila batuk.

Sebelum menggunakan Mentopin

- *Bila tidak boleh mengambil*

Jangan mengambil Mentopin tablet jika anda:

- alergik (hipersensitif) terhadap acetylcysteine atau mana-mana bahan kandungan tablet Mentopin yang lain *(sila rujuk senarai bahan kandungan)*

Jika anda mengalami salah satu keadaan tersebut, jangan ambil ubat ini dan maklumkan doktor.

- *Sebelum mula mengambil*

Maklumkan doktor anda jika anda mempunyai mana-mana masalah berikut:

- Penyakit asma
- Gastrik ulser

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil atau baru-baru ini telah mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang diperolehi tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Mentopin

- *Berapa banyak harus diambil*

Dos dewasa dan dari umur 14 ke atas:

- 600mg sekali sehari

- *Bila perlu diambil*

Adalah penting untuk anda mengambil Mentopin seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Larutkan kandungan tablet dalam segelas air dan minum serta-merta.

- *Berapa lama perlu diambil*

Anda harus mengambil Mentopin tablet selagi ianya disarankan oleh doktor anda.

- *Jika terlupa mengambil*

Jika anda terlupa untuk mengambil satu dos, jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa. Ambil tablet yang seterusnya pada masa yang biasa. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika tidak pasti.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Jika anda secara tidak sengaja telah mengambil dos berlebihan Mentopin, hubungi doktor atau hospital dengan segera untuk mendapatkan nasihat. Tunjukkan mereka pek tablet anda. Rawatan perubatan mungkin diperlukan.

Semasa menggunakan Mentopin

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Ikut arahan pengambilan Mentopin seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Tanya doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai sebarang keraguan.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti mengambil Mentopin kecuali disuruh berbuat demikian oleh doktor anda.
Jangan menggunakan Mentopin untuk merawat sebarang keadaan lain melainkan jika doktor memberitahu anda untuk berbuat demikian.
Jangan memberi atau mengesyorkan Mentopin kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama dengan anda.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Memandu dan menggunakan mesin

Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.

Kesan sampingan

Seperti ubat lain,
Mentopin boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengalami mana-mana gejala berikut selepas mengambil ubat ini kerana ia boleh menjadi serius:
• Anda ada reaksi alahan. Tanda-tanda mungkin termasuk ruam kulit.
• Anda ada loya, sakit kepala, ketidakselesaan perut atau cirit-birit.
• Darah dalam muntah atau najis hitam.

Tablet Mentopin Acetylcysteine 600 Effervescent boleh menyebabkan alergi teruk dan reaksi kulit yang serius. Berhenti menggunakan Mentopin Acetylcysteine 600 Effervescent Tablet dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera sekiranya anda mengalami gejala berikut:

• Alergi yang teruk: kesukaran bernafas, pening kepala, pembengkakan kulit atau ruam.

• Reaksi kulit yang teruk: kemerahan kulit, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau mata kegatalan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mendapati apa-apa lagi yang membuat anda merasa kurang sihat. Kesan sampingan yang lain tidak disenaraikan di atas boleh berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada
Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers→ Reporting*)

Cara penyimpanan dan pelupusan Mentopin

- *Penyimpanan*

Simpan di bawah 30°C, jauh daripada cahaya matahari. Simpan di tempat yang dingin serta kering. Jauhkan daripada kanak-kanak.

- *Pelupusan*

Jika doktor memberitahu anda untuk berhenti mengambil Mentopin tablet, ataupun tablet anda telah melepasi tarikh luput, tanya ahli farmasi bagaimana menguruskan ubat tersebut. Jangan membuang baki ubat atau ubat yang luput tarikh ke dalam tong sampah.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna ubat*

Mentopin 600mg: Tablet putih bulat, dengan permukaan licin. Garis di satu belah.

- *Bahan-bahan kandungan*

  - *Bahan aktif* : Acetylcysteine.

  - *Bahan tidak aktif:*

    Citric acid, sodium hydrogen carbonate, sodium carbonate, mannitol, lactose, flavour, sodium cyclamate, saccharin sodium, sodium citrate, ascorbic acid (untuk Mentopin 600mg sahaja)

- *Nombor MAL*

Mentopin 600mg: MAL16125038XZ

Pengilang

Hermes Pharma GmbH Hans-Urmiller-Ring 52, 82515 Wolfratshausen, Germany

Pemegang Pendaftaran Produk

Medicell Pharmaceutical (Malaysia) Sdn Bhd (898390-M)
Suite 16-03, Menara AmFIRST,
1, Jalan 19/3,
46300 Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP
27/07/2022

Nombor Siri
NPRA(R2/1)210114/601