

NORFOX TABLET

Norfloxacin (400mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Norfox
2. Bagaimana Norfox berfungsi
3. Sebelum mengambil Norfox
4. Cara menggunakan Norfox
5. Semasa menggunakan Norfox
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Norfox
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Norfox

Norfox mengandungi bahan aktif norfloxacin. Ia digunakan untuk rawatan saluran kencing dan jangkitan gastro-usus, jangkitan seksual (gonorrhea) dan keradangan prostat

Bagaimana Norfox berfungsi

Norfox adalah antibiotik quinolone yang membunuh bakteria yang merupakan punca jangkitan

Sebelum mengambil Norfox

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Norfox jika anda:

- seorang kanak-kanak yang masih membesar, perempuan yang hamil atau menyusui
- alah kepada norfloxacin dan / atau mana-mana antibiotik yang termasuk dalam kumpulan quinolone.
- pernah mengalami masalah dengan tendon anda selepas mengambil antibiotik quinolone (e.g. Ofloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin, moxifloxacin, dan asid nalidixic)

Sekiranya anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil Norfox.

- Sebelum mula mengambil Norfox

Beritahu doktor jika anda mengalami:

- kerosakan ginjal dan/atau hati
- masalah kerosakan sistem saraf pusat
- sawan atau apa-apa keadaan lain yang bakal menyebabkannya
- Mempunyai masalah kesihatan yang menyebabkan otot lemah dan lemah, dipanggil *myasthenia gravis*

Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda jika anda telah didiagnosis dengan pembesaran atau “bonjol” dari saluran darah besar (aneurisme aorta atau aneurisme saluran besar periferi).

Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda jika anda telah mengalami diseksi aorta sebelumnya (robekan dalam dinding aorta).

Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda jika anda mempunyai sejarah keluarga yang menghidap aneurisme aorta atau diseksi aorta atau faktor risiko lain atau keadaan mudah terpengaruh (contohnya gangguan tisu penghubung seperti sindrom Marfan, atau sindrom Ehlers-Danlos vaskular, atau gangguan vaskular seperti arteritis Takayasu, arteritis sel gergasi, penyakit Behcet, tekanan darah tinggi, atau aterosklerosis yang diketahui).

Anda tidak harus mengambil ubat antibakteria fluoroquinolone, termasuk Norfox, jika anda mengalami sebarang reaksi buruk pada masa lalu apabila mengambil fluoroquinolone (lihat bahagian Perkara yang harus diambil perhatian dan Kesan Sampingan). Apabila berlaku keadaan ini, anda perlu memaklumkan kepada pembekal khidmat kesihatan anda secepat mungkin.

- Pengambilan ubatan lain

Sebelum anda mengambil Norfox, beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda baru-baru ini mengambil, sedang mengambil atau berhasrat untuk mengambil sebarang ubat dan suplemen lain yang mungkin berinteraksi dengan Norfox, seperti:

- *theophylline* (untuk mengubati

penyakit paru-paru)

- multivitamin dan garam mineral
- *antacid* yang mengandungi aluminium atau magnesium
- agen anti-koagulasi (e.g. warfarin)

Mengambil susu atau produk tenusu serentak dengan Norfox harus dielakkan kerana penyerapan ubat ini dapat dikurangkan.

Cara mengambil Norfox

- Berapa banyak harus diambil

Dos biasa ialah 1 tablet dua kali sehari, untuk ditelan. Dos mungkin berbeza, bergantung kepada jenis jangkitan. Pelarasan dos diperlukan bagi pesakit yang mengalami kerosakan ginjal.

Jangan mengambil Norfox tanpa berunding dengan doktor anda.

- Bila perlu diambil

Makanan boleh mengurangkan kadar dan / atau tahap penyerapan Norfox. Untuk memastikan keberkesanan yang optimum, Norfox perlu diambil 1 jam sebelum atau 2 jam selepas makan.

- Berapa lama perlu diambil

Tempoh rawatan yang disyorkan bergantung kepada jenis jangkitan yang anda ada. Sila merujuk kepada doktor anda untuk nasihat lanjut.

Sentiasa habiskan jangkamasa rawatan antibiotik seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa mengambil

Ambil dos terlepas sebaik sahaja anda ingat. Abaikan dos yang terlepas jika sudah hampir masa untuk dos yang dijadualkan seterusnya. Jangan ambil tablet tambahan untuk menggantikan dos yang terlepas

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil terlalu banyak Norfox, hubungi doktor atau ahli farmasi anda atau dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

NORFOX TABLET

Norfloxacin (400mg)

Semasa mengambil Norfox

- Perkara yang perlu dilakukan

Pastikan pengambilan cecair yang mencukupi semasa rawatan Norfloxacin untuk mengelakkan risiko mengalami kristal di dalam air kencing.

Norfox boleh menyebabkan kulit anda menjadi lebih sensitif kepada cahaya matahari daripada biasa. Lindungi kulit anda dengan menggunakan pelindung matahari terutamanya jika anda terdedah kepada cahaya matahari yang kuat untuk tempoh masa yang berpanjangan.

Ambil ubat anda sepertimana yang telah diberitahu oleh doktor anda. Beritahu pengamal perubatan anda tentang semua ubat yang anda ambil.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan terlupa mengambil dos antibiotik kerana ini boleh menyebabkan ubat anda tidak berkesan.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berikan Norfox kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau masalah yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Kehamilan dan penyusuan

Keselamatan norfloxacin pada ibu hamil dan penyusuan adalah tidak jelas. Ubat ini hanya perlu diambil jika faedahnya melebihi risiko. Rujuk doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin menyebabkan anda pening. Jangan mengendalikan jentera atau memandu semasa

mengambil ubat ini

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda tiba-tiba merasa sakit yang teruk di bahagian perut, dada atau belakang, pergi ke jabatan kecemasan dengan segera.

Kesan sampingan yang berpanjangan, melumpuhkan dan berpotensi tidak boleh dipulihkan

Ubat antibakteria Fluoroquinolone, termasuk Norfox, telah dikaitkan dengan kesan sampingan yang sangat jarang tetapi serius, sesetengahnya memberi kesan berpanjangan (berbulan-bulan atau bertahun-tahun), melumpuhkan dan berpotensi tidak dapat dipulihkan.

Berhenti mengambil antibiotik fluoroquinolone anda dan hubungi pembekal khidmat kesihatan dengan segera jika anda mempunyai tanda-tanda kesan sampingan berikut:

- Tendon sakit atau bengkak, sering bermula di pergelangan kaki atau betis. Jika keadaan ini berlaku, rehatkan bahagian yang menyakitkan sehingga anda berjumpa dengan pembekal khidmat kesihatan anda.
- Sakit di sendi atau bengkak di bahu, lengan, atau kaki anda.
- Kesakitan atau sensasi yang tidak normal (seperti sensasi pin dan jarum, kesemutan, gatal, kebas, atau pembakaran), kelemahan badan anda, terutamanya di kaki dan lengan, atau kesukaran berjalan.
- Keletihan yang serius, mood tertekan, perasaan cemas, masalah dengan ingatan anda, atau masalah tidur.
- Perubahan penglihatan, rasa, bau atau pendengaran anda.

Maklum kepada pembekal khidmat kesihatan anda jika anda mempunyai salah satu daripada kesan di atas semasa atau dengan segera apabila mengambil fluoroquinolone- ini bermakna anda harus mengelakkannya pada masa hadapan. Anda dan pembekal khidmat kesihatan akan memutuskan sama ada meneruskan rawatan dengan antibiotik dari kelas lain.

Tendinitis dan tendon pecah

Sakit dan pembengkakan pada sendi dan keradangan atau tendon pecah mungkin jarang berlaku. Risiko anda

akan meningkat jika anda sudah tua (melebihi 60 tahun), telah menerima pemindahan organ, mengalami masalah buah pinggang atau jika anda sedang dirawat dengan kortikosteroid. Keradangan dan tendon pecah boleh terjadi dalam rawatan tempoh 48 jam pertama dan juga beberapa bulan selepas berhenti rawatan Norfox. Pada tanda pertama kesakitan atau keradangan tendon (contohnya pada pergelangan kaki, pergelangan tangan, siku, bahu, atau lutut anda), berhenti mengambil Norfox, hubungi pembekal khidmat kesihatan anda dan rehatkan bahagian sakit. Elakkan senaman yang tidak diperlukan kerana ini mungkin meningkatkan risiko tendon pecah.

Neuropati periferai

Anda mungkin jarang mengalami tanda kerosakan saraf (neuropati) seperti kesakitan, pembakaran, kesemutan, kebas dan/atau kelemahan terutamanya pada tapak kaki dan kaki, atau tangan dan lengan. Sekiranya ini berlaku, berhenti mengambil Norfox dan maklumkan kepada pembekal khidmat kesihatan anda dengan segera untuk mengelakkan perkembangan keadaan yang berpotensi tidak dapat dipulihkan.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan yang biasa termasuk loya, muntah, cirit-birit, ruam, pedih ulu hati, pening, sakit kepala dan kejang perut.

Fluoroquinolones telah dilaporkan menyebabkan kesan sampingan yang serius yang melibatkan tendon, otot, sendi, dan saraf bagi sesetengah pesakit, kesan sampingan ini menyebabkan kecacatan yang berpanjangan atau kekal (lihat bahagian sebelum anda mula mengambil dan perkara yang harus diambil perhatian).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan Pelupusan Norfox

NORFOX TABLET

Norfloxacin (400mg)

Penyimpanan

Jauhi dari kanak-kanak. Simpan pada suhu bilik kurang daripada 30°C dan lindungi daripada cahaya.

Pelupusan

Jangan buang ubat-ubatan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat yang tidak digunakan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Tarikh kemaskini RiMUP

14/1/2022

Nombor siri:

NPRA(R4/1)280219/00059

MYP019RM (01)

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Norfox adalah tablet putih yang panjang, biconvex dan bersalut filem yang dicetak dengan 'N/X' dan '400' pada setiap sisi.

- Bahan-bahan kandungan

- Setiap kapsul mengandungi 400 mg norfloxacin sebagai bahan aktif.
- Bahan bukan aktif termasuk *magnesium stearate*, *microcrystalline cellulose*, *talcum*, *lactose* dan *sodium starch glycolate*

- Nombor MAL

MAL 19930497AZ

Pengilang

The United Drug (1996) Co., Ltd.
208 Romklao Road, Minburi,
Bangkok 10510, Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

Milrin Pharmaceutical Co. (M)
S/B.
125-L, 5th Floor, Wisma Getah,
Macalister Road, 10400 Penang,
Malaysia.