

COXAN TABLET 500MG

Paracetamol 500mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Coxan
2. Bagaimana Coxan berfungsi
3. Sebelum menggunakan Coxan
4. Cara menggunakan Coxan
5. Semasa menggunakan Coxan
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Coxan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

1. Apakah kegunaan Coxan

Coxan digunakan untuk melegakan demam dan kesakitan pada kalangan orang dewasa dan kanak-kanak.

2. Bagaimana Coxan berfungsi

Coxan bertindak untuk melegakan demam. Coxan juga berfungsi untuk menghentikan mesej kesakitan disampaikan ke otak.

3. Sebelum menggunakan Coxan

- Bila tidak boleh menggunakan

Anda tidak harus mengambil Coxan jika anda alah kepada parasetamol atau mana-mana bahan kandungan dalam ubat ini. Simptom tindak balas alahan mungkin termasuk:

- Sesak nafas
- Berdehit atau kesukaran bernafas
- Bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian badan yang lain
- Ruam, gatal atau gatal pada kulit

Jangan mengambil Coxan jika anda mempunyai masalah hati atau buah pinggang.

- Sebelum mula menggunakan Coxan

Anda mesti memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai keadaan yang berikut:

- Anda alah kepada mana-mana bahan kandungan ubat ini
- Anda alah kepada aspirin atau ubat NSAID lain
- Anda mempunyai masalah hati atau buah pinggang
- Kesukaran bernafas seperti bronchitis, asma yang tidak stabil atau emphysema
- Anda minum alkohol yang berkuantiti banyak

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Beberapa ubat-ubat dan Coxan mungkin mengganggu antara satu sama lain, ia termasuk:

- Alkohol, induksi enzim hepatic, ubat-ubatan hepatotik
- Ubat-ubatan yang diguna untuk menipis darah, contohnya warfarin
- Ubat-ubatan NSAID

4. Cara menggunakan Coxan

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas:

1-2 tablet, tiga hingga empat kali sehari. Tidak melebihi 8 tablet dalam 24 jam kecuali diarahkan oleh doktor.

Kanak-kanak berusia 6-12 tahun:

½ - 1 tablet tiga hingga empat kali sehari.

Kanak-kanak berusia bawah 6 tahun: Tidak disyorkan

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Dewasa dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas:

Ambil ubat ini tidak lebih daripada beberapa hari kecuali diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

Kanak-kanak berusia 6-12 tahun:

Jangan mengambil lebih dari 48 jam kecuali diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa.

COXAN TABLET 500MG

Paracetamol 500mg

Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Simptom pengambilan yang berlebihan mungkin muncul tidak lama selepas pengambilan dan berterusan selama 24 jam. Ini termasuk cirit-birit, hilang selera makan, loya atau muntah-muntah, kekejangan perut atau sakit dan berpeluh luar biasa. Simptom kerosakan hati mungkin berlaku dalam masa 2-4 hari selepas pengambilan.

5. Semasa menggunakan Coxan

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil Coxan seperti yang diarahkan. Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Coxan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan kecuali doktor atau ahli farmasi anda memberitahu anda.

Jangan mengambil Coxan dengan ubat lain yang mengandungi parasetamol pada masa yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Hanya minum kuantiti kecil alkohol semasa mengambil Coxan. Minum alkohol yang berkuantiti banyak semasa mengambil Coxan akan meningkatkan risiko kesan sampingan hati.

6. Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Coxan akan menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan termasuk:

- Loya dan muntah
- Sakit perut
- Sneak
- Berpeluh
- Ruam
- Kulit kemerahan dan pedih dengan lepuh dan lapisan kulit yang boleh dikupas yang mungkin disertai dengan demam dan/atau kesejukan

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web <http://nptra.moh.gov.my/> (Report on Adverse Event).

7. Cara penyimpanan dan pelupusan Coxan

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang sejuk, kering di bawah suhu 30 °C. Lindungi daripada cahaya.

Jauhkan daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

8. Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Berwarna putih, bulat, permukaan rata, tepi serong, tablet tidak bersalut yang ditanda huruf 'M' pada separuh bahagian atas dan huruf 'PL' pada separuh bahagian bawah, sisi belah bertanda 'PARACETAMOL'.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Paracetamol 500mg

- Bahan tidak aktif

Cornstarch, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium Stearate

- Nombor MAL

MAL19991335XCZ

9. Pengilang

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1,
Taman Perindustrian Bukit Tengah,
Bukit Mertajam, 14000 Penang.

Pemegang Pendaftaran Produk

Milrin Pharmaceutical Co. (M) Sdn.
Bhd.
125L, 5th Floor, Wisma Getah,
Macalister Road, 10400 Penang,
Malaysia.
Tel: 04-2286042, 2286741, 2288644
Fax: 04-2280757

10. Tarikh kemaskini RiMUP

30/03/2020

MYX004RM(00)