

# DALACIN<sup>®</sup> C CAPSULES

Clindamycin hydrochloride (300 mg)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dalacin C
2. Bagaimana Dalacin C berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dalacin C
4. Cara menggunakan Dalacin C
5. Semasa menggunakan Dalacin C
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dalacin C
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

## Apakah kegunaan Dalacin C

Dalacin C mengandungi clindamycin hydrochloride yang merupakan sejenis antibiotik yang digunakan dalam rawatan jangkitan bakteria yang serius.

Penggunaannya perlu disimpan untuk kegunaan bagi pesakit yang alah kepada penicillin atau pada penilaian doktor, rawatan dengan penicillin untuk pesakit itu adalah tidak sesuai. Ia harus digunakan hanya apabila antibiotik kurang toksik lain tidak berkesan.

## Bagaimana Dalacin C berfungsi

Dalacin C berfungsi dengan membunuh atau menghentikan pertumbuhan bakteria yang menyebabkan jangkitan anda.

## Sebelum menggunakan Dalacin C

### - Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Dalacin C jika anda alah (*hypersensitive*) kepada clindamycin, lincomycin atau mana-mana ramuan lain dalam ubat ini.

### *Hamil dan menyusukan anak*

Sekiranya anda hamil atau berpendapat anda mungkin hamil, anda seharusnya menghubungi doktor anda sebelum mengambil Dalacin C. Oleh sebab clindamycin meresap melalui plasenta, kapsul Dalacin C boleh digunakan semasa kehamilan hanya jika betul-betul diperlukan.

Beritahu doktor anda jika anda akan menyusukan anak semasa mengambil Dalacin C. Penyusuan anak tidak digalakkan semasa mengambil Dalacin C kerana ubat ini boleh meresap ke dalam susu ibu. Dalacin C berpotensi menyebabkan kesan sampingan serius pada bayi yang menyusu, seperti cirit-birit, darah dalam najis atau ruam. Jika Dalacin C diperlukan, doktor anda mungkin mencadangkan ubat lain. Sebelum mengambil ubat ini, sila berbincang dengan doktor anda mengenai manfaat penyusuan susu ibu terhadap kesihatan dan juga kesan sampingan Dalacin C yang berpotensi berlaku pada bayi yang sedang menyusu atau disebabkan keadaan kesihatan ibu yang sedia ada.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil sebarang ubat.

### - Sebelum mula menggunakan Dalacin C

Beritahu doktor anda jika anda mengalami sebarang keadaan berikut untuk membantu beliau memutuskan sama ada Dalacin C sesuai untuk anda:

- anda mengalami cirit-birit atau lazimnya mengalami cirit-birit apabila anda mengambil antibiotik atau pernah mengalami masalah dengan perut atau usus anda. Jika anda mengalami cirit-birit berdarah atau yang berpanjangan atau yang teruk semasa atau selepas menggunakan Dalacin C, beritahu doktor anda dengan segera kerana rawatan mungkin perlu dihentikan buat seketika. Ini mungkin tanda keradangan usus (*pseudomembranous colitis*) yang boleh berlaku selepas rawatan dengan antibiotik.
- anda mengalami masalah dengan buah pinggang atau hati anda.
- anda mengalami kecederaan buah pinggang akut

- Jika anda mengalami tindak balas kulit yang teruk atau alahan kepada Dalacin C, berhenti mengambil ubat dan hubungi doktor anda dengan segera.

### - Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan. Seseengah ubat boleh mempengaruhi cara Dalacin C berfungsi, atau Dalacin C boleh mengurangkan keberkesanan ubat lain yang diambil pada masa yang sama. Ini termasuk:

- pengendur otot yang digunakan semasa pembedahan
- rifampicin, ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria

## Cara menggunakan Dalacin C

### - Berapa banyak harus digunakan

Untuk mengelakkan kemungkinan iritasi perut dan tekak, kapsul Dalacin C harus diambil dengan segelas penuh air dan sekurang-kurangnya 30 minit sebelum berbaring.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, tanya doktor atau ahli farmasi untuk mendapatkan bantuan.

## Orang dewasa dan warga tua

Dos harian Dalacin C yang disyorkan adalah antara 600 dan 1800 mg dibahagikan kepada 2, 3 atau 4 dos yang sama bergantung pada keterukan jangkitan anda seperti yang ditentukan oleh doktor anda.

## Kanak-kanak (berumur lebih 1 bulan)

Dos yang disyorkan untuk kanak-kanak yang mengalami jangkitan serius adalah antara 8 dan 16 mg bagi setiap kg berat badan sehari dalam 3 atau 4 dos yang sama. Dalam jangkitan yang lebih teruk, dos yang disyorkan adalah antara 16 hingga 20 mg bagi setiap kg berat badan sehari dalam 3 atau 4 dos yang sama.

# DALACIN<sup>®</sup> C CAPSULES

Clindamycin hydrochloride (300 mg)

Kapsul Dalacin C tidak sesuai untuk kanak-kanak yang belum boleh menelan ubat sepenuhnya.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Dalacin C sepanjang tempoh masa yang doktor anda syorkan.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu untuk mengambil dos seterusnya dan abaikan dos yang terlepas. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda fikir anda atau orang lain mungkin terambil ubat ini secara berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

**Semasa menggunakan Dalacin C**

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Dalacin C.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

Untuk mengelakkan risiko iritasi perut dan tekak, pastikan anda mematuhi cara

pemberian ubat ini (lihat *Cara menggunakan Dalacin C*).

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan berkongsi Dalacin C dengan orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom-simptom atau keadaan yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

*Memandu dan menggunakan jentera*

Kesan Dalacin C terhadap keupayaan untuk memandu atau mengendalikan jentera masih belum dinilai.

**Kesan-kesan sampingan**

Seperti ubat-ubatan lain, Dalacin C boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan berikut selepas mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan lazim (menjejaskan  $\geq 1/100$  hingga  $<1/10$  orang):

- keradangan usus besar (*pseudomembranous colitis*),
- peningkatan bilangan eosinofil dalam darah
- keradangan vena disebabkan darah beku
- cirit-birit
- ruam- yang bercirikan kawasan kemerahan yang rata pada kulit yang dilitupi oleh benjolan kecil
- ujian fungsi hati yang tidak normal

Jika anda mengalami cirit-birit yang berpanjangan atau yang teruk (berair atau berdarah) dengan atau tanpa sakit abdomen, loya, demam atau muntah, anda mungkin mengalami *colitis Clostridioides difficile* (keradangan usus).

Jika ini berlaku, berhenti mengambil Dalacin C dan hubungi doktor anda dengan segera.

Jika anda mengalami tanda-tanda tindak balas alahan yang teruk atau tindak balas kulit yang teruk seperti kulit melepuh atau mengelupas, rawatan dengan Dalacin C harus dihentikan dan terapi yang sesuai perlu dimulakan. Ia mungkin disebabkan oleh penyakit yang mengancam nyawa seperti *drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS)*, *Stevens-Johnson syndrome (SJS)*, *toxic epidermal necrolysis (TEN)*, dan *acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP)*.

Jika pengeluaran air kencing anda berkurangan, atau berlaku pengumpulan cecair badan yang menyebabkan bengkak pada betis, pergelangan kaki atau kaki anda, atau anda mengalami sesak nafas, atau loya, anda mesti menghubungi doktor anda dengan segera.

Anda mungkin mengalami keradangan/ulser pada saluran tekak hingga ke perut jika anda mengambil ubat ini dalam posisi berbaring dan/atau dengan jumlah air yang sedikit.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

**Cara penyimpanan dan pelupusan Dalacin C**

- Penyimpanan

Jauhkan daripada jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Simpan pada suhu di bawah 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan

# DALACIN<sup>®</sup> C CAPSULES

Clindamycin hydrochloride (300 mg)

---

lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

## Maklumat lanjut

### - Rupa dan warna produk

Kapsul clindamycin HCl 300 mg ialah kapsul gelatin keras putih yang berisi serbuk putih dan bertanda “Clin 300” dan “Pfizer”.

Didapati dalam pek blister yang mengandungi 16 dan 100 kapsul.

### - Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Clindamycin hydrochloride

- Bahan tidak aktif

Maize starch, talc, magnesium stearate dan lactose monohydrate.

### - Nombor MAL:

Kapsul Dalacin C 300 mg  
MAL19985498ACZ

## Pengilang

Fareva Amboise

Pocé-sur-Cisse, Perancis

## Pemegang Pendaftaran Produk

Pfizer (Malaysia) Sdn. Bhd.

Level 10 & 11

Wisma Averis, Tower 2

Avenue 5, Bangsar South

No. 8, Jalan Kerinchi

59200 Kuala Lumpur, Malaysia

## Tarikh kemaskini RiMUP

16/01/2025

## Nombor Siri

NPRA (R1/3) 04012024/008

**PLD-DALACIN C 300-0125**