PAXLOVID FILM COATED TABLET

Nirmatrelvir 150 mg and Ritonavir 100 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Paxlovid
2. Bagaimana Paxlovid berfungsi
3. Sebelum menggunakan Paxlovid
4. Cara menggunakan Paxlovid
5. Semasa menggunakan Paxlovid
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Paxlovid
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Paxlovid

Paxlovid ialah sejenis ubat antivirus yang digunakan untuk merawat penyakit COVID-19 tahap ringan hingga sederhana.

COVID-19 berpunca daripada jangkitan virus. Paxlovid digunakan pada orang dewasa berumur 18 tahun ke atas yang tidak memerlukan bantuan oksigen tambahan, serta berisiko lebih tinggi untuk jangkitannya berkembang menjadi COVID-19 yang teruk hingga menyebabkan kemasukan ke hospital atau kematian.

Anda mesti merujuk kepada doktor sekiranya keadaan anda tidak bertambah baik atau anda berasa semakin teruk semasa menerima rawatan Paxlovid.

Bagaimana Paxlovid berfungsi

Paxlovid menghentikan pembiakan virus dalam sel, seterusnya menghentikan pembiakan virus di seluruh badan. Ini dapat membantu badan anda melawan jangkitan virus tersebut dan membolehkan kesihatan anda bertambah baik dengan lebih cepat.

Ubat ini mengandungi bahan aktif *nirmatrelvir* dan *ritonavir* dalam dua tablet yang berlainan. *Nirmatrelvir* bertindak aktif melawan virus yang menyebabkan COVID-19. *Ritonavir* berperanan memanjangkan kesan terapeutik *nirmatrelvir*.

Sebelum menggunakan Paxlovid

- Bila tidak boleh menggunakan

- jika anda alah kepada *nirmatrelvir, ritonavir* atau mana-mana bahan kandungan lain dalam ubat ini.
- jika anda menghidap penyakit hati yang teruk
- jika anda sedang mengambil mana-mana ubat berikut. Pengambilan Paxlovid dengan ubat-ubatan ini boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius atau mengancam nyawa atau mempengaruhi mekanisme tindakan Paxlovid:
  - *alfuzosin* (digunakan untuk merawat gejala pembengkakan prostat)
  - *ranolazine* (digunakan untuk merawat sakit dada kronik [*angina*])
  - *neratinib, venetoclax, enzalutamide* (digunakan untuk merawat kanser)
  - *amiodarone, bepridil, dronedarone, encainide, flecainide, propafenone, quinidine* (digunakan untuk merawat penyakit jantung dan menangani degupan jantung yang tidak teratur)
  - *fusidic acid* (digunakan untuk merawat jangkitan bakteria)
  - *colchicine* (digunakan untuk merawat *gout*)
  - *astemizole, terfenadine* (digunakan untuk merawat alahan)
  - *lurasidone, pimozide* (digunakan untuk merawat *schizophrenia*)
  - *quetiapine* (digunakan untuk merawat *schizophrenia*, kecelaruan *bipolar*, kemurungan teruk dan pemikiran atau perasaan yang tidak normal)
  - *silodosin* (digunakan untuk merawat pembengkakan prostat *benign*)
  - *eplerenone, ivabradine* (digunakan untuk merawat kegagalan jantung, iaitu keadaan yang berlaku apabila jantung tidak dapat mengepam darah yang mencukupi ke bahagian badan yang lain)
  - *eletriptan, ubrogepant* (digunakan untuk merawat sakit kepala migrain)
  - *dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, methylergonovine* (digunakan untuk menghentikan pendarahan berlebihan yang mungkin berlaku selepas bersalin atau pengguguran kandungan)
  - *cisapride* (digunakan untuk melegakan masalah perut yang tertentu)
  - *voclosporin* (digunakan untuk mengurangkan tindak balas imun tertentu)
  - *lovastatin, simvastatin, lomitapide* (digunakan untuk merendahkan paras kolesterol darah)
  - *finerenone* (digunakan untuk merawat penyakit buah pinggang kronik)
  - *naloxegol* (digunakan untuk merawat sembelit pada pesakit yang menerima ubat penahan sakit jenis *opioid*)
  - *avanafil, vardenafil* (digunakan untuk merawat *erectile dysfunction* [juga dikenali sebagai mati pucuk])
  - *sildenafil (Revatio®)* digunakan untuk merawat *pulmonary arterial hypertension* (tekanan darah tinggi dalam arteri paru-paru)
  - *triazolam, midazolam* yang diambil melalui mulut (digunakan untuk melegakan keresahan dan/atau masalah tidur)
  - *flibanserin* (digunakan untuk

PAXLOVID FILM COATED TABLET

Nirmatrelvir 150 mg and Ritonavir 100 mg

merawat keinginan seksual yang rendah dalam kalangan wanita belum menopaus)
- *tolvaptan* (digunakan untuk merawat sista dalam buah pinggang)
- *carbamazepine, phenobarbital, primidone, phenytoin* (digunakan untuk mencegah dan mengawal sawan)
- *rifampicin, rifapentine* (digunakan untuk merawat penyakit batuk kering)
- *lumacaftor/ivacaftor* (digunakan untuk merawat *cystic fibrosis*)
- *St. John's Wort* (*Hypericum perforatum*) (ubat herba yang digunakan untuk menangani kemurungan dan keresahan)

Jangan berikan ubat ini kepada kanak-kanak dan remaja bawah umur 18 tahun kerana ubat ini masih belum dikaji terhadap kanak-kanak dan remaja.

- <u>*Sebelum mula menggunakan Paxlovid*</u>

  Beritahu doktor anda sekiranya anda sedang menghidap atau pernah menghidap penyakit hati atau buah pinggang. Jika anda menghidap penyakit buah pinggang tahap sederhana, anda memerlukan dos Paxlovid yang lebih rendah. Jangan ambil Paxlovid sekiranya anda menghidap penyakit hati atau penyakit buah pinggang yang teruk.

  Jika anda telah diberitahu oleh doktor anda bahawa anda tidak tahan (*intolerance*) terhadap sesetengah jenis gula, sila hubungi doktor anda sebelum mengambil produk perubatan ini.

  Tiada maklumat yang mencukupi untuk memastikan bahawa Paxlovid selamat digunakan semasa hamil, malah tidak diketahui sama ada ubat ini akan membahayakan bayi anda semasa anda hamil. Jika anda hamil, anda tidak disyorkan untuk menggunakan ubat ini, melainkan keadaan klinikal anda memerlukan rawatan ini.

  Jika anda hamil, mengesyaki anda hamil atau merancang untuk hamil, sila minta nasihat doktor anda sebelum mengambil ubat ini. Jika anda berpotensi hamil, anda disyorkan agar menahan diri daripada melakukan aktiviti seks, atau anda hendaklah menggunakan kontraseptif penghalang yang berkesan semasa mengambil ubat ini dan sehingga selesai satu kitaran haid penuh selepas anda menghentikan rawatan.
  Sila beritahu doktor anda sekiranya anda mengambil pil kontraseptif oral kerana anda mungkin perlu melaksanakan langkah berjaga-jaga tambahan untuk mencegah kehamilan, contohnya menggunakan kondom.

  Jika anda sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusukan anak, sila maklumkan perkara tersebut kepada pembekal penjagaan kesihatan anda sebelum anda mengambil ubat ini. Paxlovid menyerap dalam jumlah yang sedikit ke dalam susu ibu. Anda tidak boleh menyusukan bayi anda ketika mengambil ubat ini dan dalam tempoh 48 jam selepas melengkapkan rawatan sebagai langkah berjaga-jaga.

  Tindak balas alahan
  Tindak balas alahan yang teruk (dikenali sebagai '*anaphylaxis*') termasuk tindak balas kulit yang serius (yang diketahui sebagai '*toxic epidermal necrolysis*' dan 'sindrom *Stevens Johnson*') boleh berlaku pada orang yang mengambil ubat ini, walaupun hanya selepas 1 dos. Hentikan pengambilan ubat ini dan hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengalami sebarang gejala tindak balas alahan berikut:
  - kesukaran menelan atau bernafas
  - bengkak pada lidah, mulut dan muka
  - rasa tercekik dalam tekak
  - suara serak
  - kemerahan dan kesakitan kulit
  - kulit melepuh dan mengelupas
  - lepuh atau luka di mulut atau bibir

  Risiko berlakunya kerintangan HIV-1
  Rawatan Paxlovid boleh mengurangkan keberkesanan ubat-ubat yang digunakan untuk merawat HIV.

- <u>*Jika mengambil ubat-ubat lain*</u>

  Terdapat ubat lain yang mungkin tidak boleh diambil bersama-sama dengan Paxlovid. Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil, baru-baru ini pernah mengambil atau mungkin mengambil apa-apa ubat lain, termasuk ubat preskripsi dan ubat tanpa preskripsi, vitamin dan suplemen herba.

  Secara khususnya, anda hendaklah memaklumkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya anda sedang mengambil mana-mana ubat berikut:
  - Ubat-ubat di atas yang boleh menyebabkan kesan sampingan serius atau mengancam nyawa atau menjejaskan mekanisme tindakan Paxlovid (sila rujuk bahagian *Bila tidak boleh menggunakan)*
  - ubat yang digunakan untuk merawat gejala pembengkakan prostat, contohnya *tamsulosin*
  - ubat yang digunakan untuk merawat masalah kurang daya tumpuan, contohnya derivatif *amphetamine*

PAXLOVID FILM COATED TABLET

Nirmatrelvir 150 mg and Ritonavir 100 mg

seperti *methylphenidate* dan *dexamfetamine*
- ubat yang digunakan untuk merawat kesakitan yang teruk, contohnya *morphine, fentanyl, hydrocodone, oxycodone, meperidine, methadone, buprenorphine, norbuprenorphine* dan ubat lain yang serupa dengan *morphine*
- ubat yang digunakan untuk merawat dan menangani degupan jantung yang tidak teratur, contohnya *digoxin* dan *disopyramide*
- ubat yang digunakan untuk merawat asma dan masalah lain berkaitan paru-paru seperti *chronic obstructive pulmonary disease* (COPD), contohnya *salmeterol* dan *theophylline*
- ubat yang digunakan untuk merawat kanser, contohnya *afatinib, abemaciclib, apalutamide, ceritinib, dasatinib, nilotinib, vincristine, vinblastine, encorafenib, fostamatinib, ibrutinib, ivosidenib*
- ubat yang digunakan untuk mencairkan darah (*anticoagulant*), contohnya *warfarin, rivaroxaban, vorapaxar, apixaban* dan *dabigatran*
- ubat yang digunakan untuk merawat sawan, contohnya *divalproex* dan *lamotrigine*
- ubat yang digunakan untuk merawat kemurungan, contohnya *amitriptyline, fluoxetine, imipramine, nortriptyline, paroxetine, sertraline* dan *desipramine, trazodone*
- ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan kulat (antikulat), contohnya *itraconazole, ketoconazole* dan *voriconazole*
- ubat antialahan (contohnya *fexofenadine* dan *loratadine*)
- ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan HIV, contohnya *atazanavir, darunavir, efavirenz, maraviroc* dan *zidovudine*
- ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria seperti antibiotik dan antimikobakteria, contohnya *atovaquone, clarithromycin, delamanid, erythromycin, sulfamethoxazole/trimethoprim, bedaquiline, rifabutin,* dan *rifapentine*
- ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan parasit (antiparasit), contohnya *albendazole*
- ubat yang digunakan untuk merawat gangguan mental atau mood, contohnya *clozapine, haloperidol, risperidone* dan *thioridazine*
- ubat yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi (*hypertension*), contohnya *amlodipine, diltiazem, nifedipine, verapamil* dan *aliskiren*
- ubat yang digunakan untuk merawat masalah jantung dan/atau salur darah, contohnya *ticagrelor, vorapaxar, clopidogrel, cilostazol* dan *mavacamten*.
- *kortikosteroid* yang digunakan untuk merawat keradangan, contohnya *betamethasone, budesonide, ciclesonide, dexamethasone, fluticasone, methylprednisolone, mometasone, prednisolone* dan *triamcinolone*
- ubat yang digunakan untuk merawat *cystic fibrosis*, contohnya *ivacaftor, elexacaftor/tezacaftor/ivacaftatau tezacaftor/ivacaftor*
- ubat yang digunakan untuk merawat *diabetes*, contohnya *saxagliptin*
- ubat antivirus yang digunakan untuk merawat jangkitan virus hepatitis C, contohnya *glecaprevir/pibrentasvir*
- kontraseptif oral atau pelekat yang mengandungi *ethinylestradiol* untuk mencegah kehamilan: kaedah penghalang atau kaedah kontraseptif bukan hormon perlu digunakan sepanjang 5 hari rawatan Paxlovid dan sehingga satu kitaran haid selepas rawatan Paxlovid dihentikan
- ubat yang digunakan untuk menindas sistem imun anda, contohnya *cyclosporine, tacrolimus, everolimus* dan *sirolimus*.
- ubat yang digunakan untuk merawat keradangan *artritis*, contohnya *tofacitinib* dan *upadacitinib*
- ubat yang digunakan untuk mengurangkan tahap kolesterol dalam darah, contohnya *atorvastatin, fluvastatin, pravastatin* dan *rosuvastatin*
- ubat yang digunakan untuk merawat sakit kepala migrain, contohnya *rimegepant*
- ubat untuk merawat pundi kencing yang terlalu aktif, contohnya *darifenacin*
- ubat yang digunakan untuk merawat gangguan mental, contohnya *suvorexant, aripiprazole, brexpiprazole, cariprazine, iloperidone, lumateperone* dan *pimavanserin*
- ubat yang digunakan untuk merawat *erectile dysfunction* (juga dikenali sebagai mati pucuk), contohnya *sildenafil* dan *tadalafil*
- ubat yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi di dalam pembuluh darah ke paru-paru, contohnya *tadalafil*

PAXLOVID FILM COATED TABLET

Nirmatrelvir 150 mg and Ritonavir 100 mg

(Adcirca®), bosentan dan *riociguat*
- ubat yang digunakan sebagai sedatif, hipnotik dan ubat tidur, contohnya *alprazolam, buspirone, clonazepam, clorazepate, diazepam, estazolam, flurazepam* dan *zolpidem*
- ubat yang digunakan untuk berhenti merokok (contohnya *bupropion*)
- *midazolam* yang diberikan melalui suntikan (digunakan untuk sedasi [pesakit dalam keadaan jaga tetapi berasa sangat tenang atau mengantuk semasa menjalani ujian atau prosedur perubatan] atau anestesia)
- *levothyroxine* (digunakan untuk merawat kelenjar tiroid kurang aktif [*hypothyroidism*])

Cara menggunakan Paxlovid

- *Berapa banyak harus digunakan*

Ambil ubat ini mengikut arahan doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda tidak pasti.

Paxlovid terdiri daripada 2 jenis ubat: *nirmatrelvir* dan *ritonavir*. Dos yang disyorkan ialah 2 tablet *nirmatrelvir* bersama 1 tablet *ritonavir* melalui mulut dua kali sehari (pagi dan malam). Kepingan blister untuk setiap hari rawatan diasingkan kepada dua bahagian dengan warna berlainan untuk menunjukkan tablet yang perlu diambil pada masa tertentu – satu permukaan adalah untuk dos pagi (AM) manakala sebelah lagi adalah untuk dos malam (PM).

Untuk setiap dos, ambil kesemua 3 tablet secara serentak.

- *Bila perlu digunakan*

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Paxlovid boleh diambil bersama makanan atau dengan perut kosong.

Telan keseluruhan tablet. Jangan kunyah, potong atau hancurkan tablet.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Satu kitaran rawatan mengambil masa 5 hari.

Penting bagi anda untuk mengambil Paxlovid sepertimana yang ditetapkan, melainkan doktor anda meminta anda menghentikan rawatan anda.

Walaupun anda berasa lebih sihat, jangan berhenti mengambil ubat ini tanpa berbincang dengan pembekal penjagaan kesihatan anda.

Jika anda mempunyai pertanyaan lanjut mengenai penggunaan ubat ini, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- *Jika terlupa menggunakan*

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda mengenai perkara yang perlu anda lakukan sekiranya anda terlupa menggunakannya.

Jika anda terlupa mengambil dos ubat ini, ambil dos itu sebaik sahaja anda teringat. Jika lebih 8 jam sudah berlalu sejak anda terlepas dos, jangan ambil dos yang terlepas itu dan abaikan dos yang tertinggal dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- *Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat sekiranya anda atau sesiapa sahaja mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Jika anda telah mengambil terlalu banyak ubat ini, anda disyorkan supaya menjalani pemantauan untuk mengesan sebarang tanda dan gejala kesan sampingan.

Semasa menggunakan Paxlovid

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Ambil ubat ini mengikut arahan doktor anda dengan teliti.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Paxlovid.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan ambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Paxlovid dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Memandu atau menggunakan jentera

PAXLOVID FILM COATED TABLET

Nirmatrelvir 150 mg and Ritonavir 100 mg

Paxlovid belum diuji secara khusus untuk mengetahui kesannya terhadap keupayaan memandu kereta atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan
Seperti ubat-ubatan lain, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Tidak ramai orang yang telah mengambil Paxlovid. Kesan sampingan yang serius dan tidak dijangka mungkin akan berlaku. Paxlovid masih lagi dikaji, jadi tidak semua risiko yang berkemungkinan berlaku diketahui buat masa ini.

Kesan sampingan yang biasa:
mungkin menjejaskan hingga 1 dalam setiap 10 orang

- Cirit-birit
- Loya
- Deria rasa berubah (contohnya rasa pahit berlogam)
- Sakit kepala

***Kesan sampingan yang tidak biasa*:**
mungkin menjejaskan hingga 1 dalam setiap 100 orang

- Tindak balas alahan (seperti geligata, kesukaran menelan atau bernafas, bengkak pada mulut, bibir atau muka, rasa tercekik dalam tekak, suara serak atau ruam kulit)
- Sakit abdomen
- Muntah
- Tekanan darah tinggi

***Kesan sampingan yang jarang berlaku*:** mungkin menjejaskan hingga 1 dalam setiap 1,000 orang

- Tindak balas alahan yang teruk iaitu '*anaphylaxis*' (seperti bengkak lidah, mulut dan muka, kesukaran menelan atau bernafas, rasa tercekik dalam tekak atau suara serak)
- Tindak balas kulit yang serius yang dikenali sebagai "*toxic epidermal necrolysis*" dan "*Stevens-Johnson syndrome*" (seperti kemerahan dan kesakitan kulit, kulit melepuh dan mengelupas, lepuh atau luka di mulut atau bibir)
- Secara amnya berasa tidak sihat

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi semakin serius, atau jika anda mendapati sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila maklumkan kepada doktor anda atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my *[Consumers →Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]*.

Cara penyimpanan dan pelupusan Paxlovid

- *Penyimpanan*

Jauhkan ubat ini daripada jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.
Simpan pada suhu bawah 25°C.
Jangan simpan di dalam peti sejuk atau peti sejuk beku.

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada kotak atau kad blister selepas perkataan 'EXP'. Tarikh luput merujuk pada hari terakhir bagi bulan itu.

- *Pelupusan*

Ubat-ubatan tidak seharusnya dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda tentang cara melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna produk*

Tablet bersalut filem *nirmatrelvir* 150 mg berwarna merah jambu, berbentuk bujur dan dicetak tenggelam dengan perkataan 'PFE' pada satu permukaan dan '3CL' pada permukaan yang satu lagi.

Tablet bersalut filem *Ritonavir* 100 mg berwarna putih hingga putih pudar, berbentuk kapsul dan dicetak tenggelam dengan huruf 'H' pada satu permukaan dan 'R9' pada permukaan yang satu lagi.

Tablet Paxlovid tersedia dalam kad blister yang mengandungi 5 dos harian dengan sejumlah 30 tablet dalam satu kotak.

Setiap kad blister mengandungi 4 tablet *nirmatrelvir* (150 mg setiap satu) dan 2 tablet *ritonavir* (100 mg setiap satu) dengan petunjuk mengenai tablet yang perlu diambil pada waktu pagi dan malam.

*Bukan semua saiz bungkusan dipasarkan.

- *Bahan-bahan kandungan*

  - Bahan aktif
    Bahan aktif untuk tablet bersalut filem Paxlovid ialah *nirmatrelvir* dan *ritonavir*.
    - Setiap tablet bersalut filem *nirmatrelvir* berwarna merah jambu mengandungi 150 mg *nirmatrelvir*.
    - Setiap tablet bersalut filem *ritonavir* berwarna putih mengandungi 100 mg *ritonavir*.

  - Bahan tidak aktif
    - *Nirmatrelvir*

      Teras tablet:
      - *Microcrystalline cellulose*
      - *Lactose monohydrate*
      - *Croscarmellose sodium*
      - *Colloidal silicon dioxide*

PAXLOVID FILM COATED TABLET

Nirmatrelvir 150 mg and Ritonavir 100 mg

- *Sodium stearyl fumarate*

Salutan filem:
- *Hypromellose (E464)*
- *Titanium dioxide (E171)*
- *Macrogol (E1521)*
- *Iron oxide red (E172)*

- *Ritonavir*

Teras tablet:
- *Copovidone*
- *Sorbitan laurate*
- *Silica colloidal anhydrous (E551)*
- *Calcium hydrogen phosphate anhydrous*
- *Sodium stearyl fumarate*

Salutan filem:
- *Hypromellose (E464)*
- *Titanium dioxide (E171)*
- *Macrogol (E1521)*
- *Hydroxypropyl cellulose (E463)*
- *Talc (E553b)*
- *Silica, colloidal anhydrous (E551)*
- *Polysorbate 80 (E433)*

- *Nombor MAL:*

Paxlovid (tablet bersalut filem *nirmatrelvir* 150 mg dan tablet bersalut filem *ritonavir* 100 mg)
MAL22036001ACRZ (Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH)
MAL22036002ACRSZ (Pfizer Ireland Pharmaceuticals)

Pengilang
Nirmatrelvir:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Mooswaldallee 1
79108 Freiburg Im Breisgau
Germany

Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Unlimited Company
Little Connell
Newbridge,
Co. Kildare, W12 HX57
Ireland (IRL)

Ritonavir:

M/s. Hetero Labs Limited, Unit-III,
22-110,
Industrial Development Area,
Jeedimetla,
Hyderabad-500055, Telangana, India

Pemegang Pendaftaran Produk
Pfizer (Malaysia) Sdn Bhd
Level 10 & 11
Wisma Averis, Tower 2
Avenue 5, Bangsar South
No. 8, Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh Kemaskini RiMUP
09/07/2026

Nombor Siri
NPRA (R1/3) 30092024/184

PLD-PAXLOVID-0726