

STAQUIS TOPICAL OINTMENT 2%

Crisaborole (20 mg/gm)

NPRA (R1) 23/035

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Staquis Topical Ointment 2%
2. Bagaimana Staquis Topical Ointment 2% berfungsi
3. Sebelum menggunakan Staquis Topical Ointment 2%
4. Cara menggunakan Staquis Topical Ointment 2%
5. Semasa menggunakan Staquis Topical Ointment 2%
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Staquis Topical Ointment 2%
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Staquis Topical Ointment 2%

Staquis Topical Ointment 2% digunakan pada kulit untuk mengawal simptom *atopic dermatitis* tahap ringan hingga sederhana pada orang dewasa dan kanak-kanak berumur 3 bulan ke atas.

Bagaimana Staquis Topical Ointment 2% berfungsi

STAQUIS Topical Ointment 2% mengandungi ramuan aktif crisaborole. Crisaborole dipercayai bertindak dengan mengurangkan keradangan dan mempengaruhi beberapa fungsi sistem imun.

Sebelum menggunakan Staquis Topical Ointment 2%

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Staquis Topical Ointment 2%

- jika anda alah kepada crisaborole atau mana-mana bahan kandungan lain dalam ubat ini.

Hamil dan menyusukan anak

Kesan ubat ini pada wanita hamil adalah tidak diketahui. Oleh itu, jangan gunakan Staquis Topical Ointment 2% semasa hamil melainkan anda telah bertanya kepada doktor

anda dan beliau mengesahkan bahawa anda boleh menggunakannya.

Tidak diketahui sama ada Staquis Topical Ointment 2% boleh meresap masuk ke dalam susu ibu setelah ubat ini disapu pada kulit. Kesan ubat ini pada bayi yang menyusu adalah tidak diketahui. Oleh itu, jangan gunakan Staquis Topical Ointment 2% tanpa bertanya kepada doktor anda sekiranya anda sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusukan anak.

- Sebelum mula menggunakan Staquis Topical Ointment 2%

Sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Staquis Topical Ointment 2%.

Staquis Topical Ointment 2% tidak boleh digunakan di dalam mata, mulut atau vagina. Oleh itu, sila berhati-hati agar salap ini tidak terkena pada bahagian badan tersebut.

Hentikan penggunaan Staquis Topical Ointment 2% dan dapatkan rawatan perubatan dengan segera sekiranya anda mengalami tindak balas alahan selepas menggunakan ubat ini. Simptom alahan termasuklah kegatalan, bengkak dan kemerahan kulit yang teruk.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Staquis Topical Ointment 2%

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Arahan tersebut mungkin berbeza daripada maklumat dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi untuk bantuan.

Sapu nipis Staquis Topical Ointment 2% dua kali sehari pada bahagian terabit. Basuh tangan anda selepas menggunakan ubat ini, kecuali tangan anda yang sedang dirawat.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda .

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Staquis Topical Ointment 2% untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda mengenai perkara yang perlu anda lakukan sekiranya anda terlupa menggunakannya.

Jika anda terlupa menyapu salap ini pada masa yang dijadualkan, lakukan dengan secepat mungkin apabila anda teringat. Selepas itu, teruskan pengambilan dos mengikut jadual biasa.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda telah menyapu terlalu banyak Staquis Topical Ointment 2%, lap kulit anda untuk membuang salap yang berlebihan itu.

Semasa menggunakan Staquis Topical Ointment 2%

- Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Staquis Topical Ointment 2%.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

STAQUIS TOPICAL OINTMENT 2%

Crisaborole (20 mg/gm)

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Staquis Topical Ointment 2% dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Staquis Topical Ointment 2% mungkin tidak akan memberi kesan terhadap keupayaan anda untuk memandu dan menggunakan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Staquis Topical Ointment 2% boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

- Tindak balas kulit di tempat ubat ini disapu, seperti kesakitan (rasa terbakar atau pedih)
- Geligata (bintat-bintat gatal, timbul, merah atau sama warna dengan kulit yang berlaku pada permukaan kulit)
- Tindak balas alahan kulit dengan simptom seperti kegatalan, bengkak, dan kemerahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan

Staquis Topical Ointment 2%

- Penyimpanan

Jauhkan daripada capaian dan pandangan kanak-kanak.

Simpan pada suhu bawah 30°C.

Pastikan tiub ditutup dengan ketat.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak seharusnya dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Staquis Topical Ointment 2% ialah salap berwarna putih hingga putih pudar yang mengandungi 2% crisaborole dan disediakan dalam tiub berlaminat 2.5 g, 60 g dan 100 g.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Crisaborole

- Bahan tidak aktif
white petrolatum, propylene glycol, mono- dan di-glycerides, paraffin, butylated hydroxytoluene dan edetate calcium disodium.

- Nombor MAL:

MAL *****AZ

Pengilang

Pharmacia and Upjohn Company LLC
7000 Portage Road
Kalamazoo
Michigan (MI) 49001
Amerika Syarikat (USA)

Pemegang Pendaftaran Produk

Pfizer (Malaysia) Sdn. Bhd.,
Level 10 & 11, Wisma Averis, Tower 2,
Avenue 5, Bangsar South, No. 8 Jalan,
Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

- 01/12/2023

Nombor Siri

NPRA (R1) 23/035

PLD-STAQUIS -1223