

CHLORITON FORTE SYRUP

Chlorpheniramine maleate (4mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Chloriton Forte Syrup
2. Bagaimana Chloriton Forte Syrup berfungsi
3. Sebelum menggunakan Chloriton Forte Syrup
4. Cara menggunakan Chloriton Forte Syrup
5. Semasa menggunakan Chloriton Forte Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Chloriton Forte Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Chloriton Forte Syrup

Chloriton Forte Syrup digunakan untuk merawat gejala alahan.

Bagaimana Chloriton Forte Syrup berfungsi

Chloriton Forte Syrup mengandungi chlorpheniramine maleate, yang bertindak dengan menyekat pengeluaran histamin(suatu bahan kimia semulajadi dalam badan) yang menyebabkan reaksi alahan.

Sebelum menggunakan Chloriton Forte Syrup

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ubat ini jika anda:

- mempunyai alahan terhadap chlorpheniramine maleate atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut produk).

Mengandung dan menyusukan anak

- Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.
- Jangan ambil Chloriton Forte Syrup jika anda sedang menyusukan anak.
- Anda harus berhenti menyusukan anak anda jika anda perlu mengambil ubat ini.

- Sebelum mula menggunakan Chloriton Forte Syrup

- Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Chloriton Forte Syrup jika:
 - anda mempunyai masalah membuang air kecil seperti halangan saluran pundi kencing, pembesaran kelenjar prostat, kencing tidak lawas dan sebagainya.
 - anda mempunyai glaukoma (peningkatan tekanan dalam mata)
 - anda mempunyai asma
 - anda mempunyai tiroid yang terlalu aktif
 - anda mempunyai penyakit jantung
 - anda mempunyai tekanan darah tinggi
 - anda mempunyai ulser perut atau halangan usus
 - anda mengalami masalah buah pinggang atau fungsi hati.

Jangan berikan kepada kanak-kanak di bawah 6 tahun tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil:

- alkohol
- ubat yang boleh bertindak pada fungsi saraf seperti maprotiline
- tricyclic antidepressant (untuk masalah kemurungan)
- perencat Monoamine Oxidase (MAO) (contohnya furazolidone dan procarbazine)
- ubat-ubatan yang boleh menyebabkan masalah pendengaran
- ubat yang boleh menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif terhadap cahaya.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan

Cara menggunakan Chloriton Forte Syrup

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: Ambil 5ml (1 sudu teh)
Kanak-kanak berumur 6 - 12 tahun:
Beri 2.5ml (1/2 sudu teh)

- Bila perlu digunakan

- Guna 3 hingga 4 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor
- Orang tua atau warga emas, mungkin lebih sensitif terhadap dos orang dewasa. Ambil ubat dengan makanan, air atau susu untuk mengurangkan kerengsaan gastrik.

- Berapa lama perlu digunakan

- Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.
- Penggunaan ubat ini secara berpanjangan boleh menyebabkan masalah pergigian.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Jika anda secara tidak sengaja mengambil ubat secara berlebihan, hubungi doktor anda, atau hospital yang berdekatan dengan segera. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Penggunaan ubat ini secara berlebihan boleh menyebabkan :

- anda rasa tidak stabil
- rasa mengantuk yang teruk
- kekeringan mulut, hidung atau tekak yang teruk
- kemerahan muka
- sesak nafas atau masalah pernafasan
- degupan jantung yang cepat atau tidak teratur
- khayalan
- sawan
- sukar tidur

CHLORITON FORTE SYRUP

Chlorpheniramine maleate (4mg/5ml)

- pitam
- mengantuk

Semasa menggunakan Chloriton Forte Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda seperti yang diberitahu oleh doktor anda.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Chloriton Forte Syrup.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berikan kepada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun.
- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi Chloriton Forte Syrup kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

- Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, mengantuk, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.
- Maklumkan kepada doktor anda dengan segera jika anda mengalami sebarang masalah pencernaan.
- Elakkan pengambilan alkohol semasa mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Chloramine Forte Syrup juga mungkin mempunyai beberapa kesan sampingan yang tidak diingini walaupun tidak semua orang mendapatnya.

- sistem Saraf Pusat: Rasa mengantuk, pening, gangguan koordinasi, keletihan, kekeliruan, kegelisahan, keterujaan, gementar, mudah marah, kesukaran tidur, sawan, khayalan, rasa berputar, bunyi deringan dalam telinga, anak mata mengembang dan keradangan dalam telinga
- jantung dan saluran darah: perubahan tekanan darah, sakit kepala, jantung berdebar dan denyutan jantung tidak teratur.
- penglihatan kabur
- kesukaran atau sakit semasa membuang air kecil
- perubahan jumlah sel darah
- loya, muntah dan sakit perut
- sesak dada, semput
- gegata, ruam dan hipersensitif kepada cahaya.
- kekeringan mulut, hidung dan tekak, rasa sejuk dan reaksi alahan yang teruk
- bengkak di sekeliling mata, bibir dan muka. Pada orang tua, gejala seperti pening, mengantuk yang melampau, kekeliruan, tekanan darah rendah, mulut kering kencing tidak lawas dan terlebih teruja mungkin berlaku. Hentikan ubat jika kesan sampingan seperti mulut kering dan kencing tidak lawas berlaku atau berterusan menjadi teruk

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Chloriton Forte Syrup

- Penyimpanan

Jauhkan semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C di tempat kering yang jauh daripada cahaya

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap jernih berwarna merah dengan rasa manis dan berbau buah

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Chlorpheniramine maleate

- Bahan tidak aktif

Tutti fruity, propylene glycol, carmoisine, liquid glucose, sugar, citric acid, purified water, methyl paraben, propyl paraben

- Nombor MAL:

MAL19880021ACZ

Pengilang

TERAPUTICS SDN. BHD. (590500-W)
Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang,
Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

ZONTRON PHARMACEUTICALS
SDN. BHD. (445695-T)
Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

21/10/2022

Nombor Siri

NPRA(R/1)130922/00070