

COREDIN PAEDIATRIC LINCTUS

Diphenhydramine Hydrochloride / Ammonium Chloride ((7mg/67.5mg bagi setiap 5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Coredin Paediatric Linctus
2. Bagaimana Coredin Paediatric Linctus berfungsi
3. Sebelum menggunakan Coredin Paediatric Linctus
4. Cara menggunakan Coredin Paediatric Linctus
5. Semasa menggunakan Coredin Paediatric Linctus
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Coredin Paediatric Linctus
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Coredin Paediatric Linctus

Coredin Paediatric Linctus digunakan untuk rawatan batuk dan kesukaran untuk bernafas yang disebabkan oleh selsema dan reaksi alergi.

Bagaimana Coredin Paediatric Linctus berfungsi

Coredin Paediatric Linctus mengandungi diphenhydramine hydrochloride dan ammonium hydrochloride. Diphenhydramine membantu mengurangkan batuk, manakala ammonium chloride membantu mencairkan kahak supaya ianya mudah untuk dibatuk keluar.

Sebelum menggunakan Coredin Paediatric Linctus

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ubat ini jika anda mempunyai:

- alahan terhadap diphenhydramine hydrochloride, ammonium chloride atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut ubat).

- Sebelum mula menggunakan Coredin Paediatric Linctus

Maklumkan kepada doktor anda jika anda mempunyai:

- masalah pengekalan air kencing

- glaukoma atau masalah mata
- pembesaran prostat atau pundi kencing tersumbat.
- hipersensitiviti kepada antihistamin

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil:

- Perencat Monoamine oxidase (MAOIs) (antidepresan) termasuk furazolidone (merawat cirit birit) dan procarbazine (merawat beberapa jenis penyakit *Hodgkins*) iaitu jenis kanser yang bermula dalam sejenis sel darah putih yang biasanya melawan jangkitan.
- Dimenhydrinate (untuk merawat loya, muntah dan pening), atau hydroxyzine (untuk membantu mengawal kebimbangan dan ketegangan yang disebabkan oleh keadaan saraf dan emosi)
- Alkohol
- ubat-ubatan yang mempengaruhi sistem saraf (cth. Maprotiline dan *tricyclic antidepressants*)
- ubat untuk merawat masalah gastrousus seperti cirit birit.
- ubat-ubatan yang boleh menyebabkan masalah pendengaran atau keseimbangan.
- ubat yang boleh menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif terhadap cahaya.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Coredin Paediatric Linctus

- Berapa banyak harus digunakan

Goncang Sebelum Guna
Kanak-kanak

2 - 3 tahun : setengah hingga satu sudu teh (2.5 ml-5ml)

3 - 6 tahun : satu sudu teh (5 ml)

6-12 tahun : satu hingga dua sudu teh (5 ml - 10 ml)

- Bila perlu digunakan

Berikan 3 hingga 4 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Coredin Paediatric Linctus mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Jika anda atau sesiapa secara tidak sengaja mengambil dos yang berlebihan, hubungi doktor atau ahli farmasi anda, atau hospital yang berdekatan dengan segera. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Mengambil ubat ini secara berlebihan boleh menyebabkan:

- kekok atau tidak stabil
- mengantuk
- hidung, mulut atau tekak kering
- kemerahan muka
- kesukaran pernafasan
- degupan jantung yang cepat atau tidak tetap
- khayalan
- sawan
- sukar tidur
- tekanan darah rendah

Semasa menggunakan Coredin Paediatric Linctus

- Perkara yang perlu dilakukan

- Guna ubat anda mengikut arahan doktor.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Coredin Paediatric Linctus.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

COREDIN PAEDIATRIC LINCTUS

Diphenhydramine Hydrochloride / Ammonium Chloride ((7mg/67.5mg bagi setiap 5ml)

- Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi Coredin Paediatric Linctus kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.
- Elakkan pengambilan alkohol semasa mengambil ubat ini.
- Jangan menggunakan ubat ini untuk jangka masa yang lama kerana ianya boleh menyebabkan masalah pergigian.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan gunakan Coredin Paediatric Linctus:

- pada bayi yang baru lahir atau pramatang kerana ianya boleh mengakibatkan sawan.

Tidak boleh digunakan untuk kanak-kanak berumur kurang daripada 2 tahun untuk rawatan batuk dan sejuk. Gunakan ubat ini hanya dengan nasihat doktor pada kanak-kanak 2 hingga 6 tahun untuk rawatan batuk dan sejuk.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Coredin Paediatric Linctus juga boleh menyebabkan beberapa kesan sampingan yang tidak diingini walaupun tidak semua orang mendapatnya. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami kesan sampingan semasa mengambil ubat ini. Ubat ini boleh menyebabkan keterujaan pada kanak-kanak.

Kesan sampingan yang lebih kerap adalah berlaku:

- mengantuk,
- kekeringan mulut, hidung, atau tekak
- masalah gastrousus,
- sakit perut, atau loya.

Kesan sampingan yang tidak kerap atau jarang berlaku adalah:

- Anafilaksis (batuk; kesukaran menelan; pening; degupan jantung yang cepat; gegata, gatal, bengkak pada kelopak mata atau sekitar mata, muka, bibir atau lidah; sesak nafas; ruam kulit; sesak di dada; keletihan

- atau kelemahan yang luar biasa, berdehit
- Degupan jantung yang kuat atau berdebar-debar
- masalah hati yang mungkin menyebabkan sakit perut, menggigil, najis berwarna tanah liat atau air kencing gelap, cirit-birit, pening, demam, sakit kepala, gatal-gatal
- sawan
- bengkak
- masalah penglihatan
- mimpi ngeri; keterujaan yang luar biasa, kegelisahan, rasa tidak tenteram mudah marah
- kahak yang pekat
- kekok atau tidak stabil, sembelit, cirit-birit, haid awal, keletihan,
- menggeletar

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Coredin Paediatric Linctus

- Penyimpanan

Jauhkan semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C di tempat kering yang jauh daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap jernih berwarna merah dengan rasa manis dan berbau buah

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Diphenhydramine hydrochloride,
ammonium chloride

- Bahan tidak aktif
Carboxy methyl cellulose sodium, hydrogenated castor oil, tutti fruity, propylene glycol, sorbitol, carmoisine, propyl paraben, sugar, liquid glucose, citric acid, sodium citrate, sodium chloride, purified water, methyl paraben, sodium saccharin

- Nombor MAL:

MAL19880311AZ

Pemegang Pendaftaran Produk dan Pengilang

Terapeutics Sdn. Bhd. (590500-W)
Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B,
14100 Simpang Ampat, S.P.S.,
Pulau Pinang, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

26/07/2022

Nombor Siri

NPRA(R4/1)220622/00037