

DEXIN TABLET

Dexamethasone (0.5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dexin Tablet
2. Bagaimana Dexin Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dexin Tablet
4. Cara menggunakan Dexin Tablet
5. Semasa menggunakan Dexin Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dexin Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dexin Tablet

Dexin tablet digunakan untuk merawat keradangan dan merawat beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem imunisasi badan.

Bagaimana Dexin Tablet berfungsi

Dexin Tablet tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil glukokortikosteroid. Ia berfungsi dengan menekan sistem imun dan menyekat pengeluaran bahan yang mencetuskan alahan dan keradangan.

Sebelum menggunakan Dexin Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Dexin Tablet jika anda (alah) hipersensitif terhadap dexamethasone, atau bahan-bahan yang disenaraikan di hujung risalah ini.

- Sebelum mula menggunakan Dexin Tablet

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Dexin Tablet jika anda mempunyai:

- jangkitan bakteria, virus, parasit, kulat atau jangkitan lain
- hepatitis aktif (keradangan hati berjangkit)
- vaksinasi dalam tempoh 8 minggu sebelum atau 2 minggu setelah vaksinasi
- penyakit nodus limfa setelah vaksinasi BCG.

- sejarah tibi, melainkan jika dirawat dengan ubat-ubatan
- ulser gastrousus
- kerapuhan tulang (osteoporosis)
- kegagalan fungsi jantung yang teruk
- tekanan darah tinggi atau kencing manis yang tidak dikawal
- gangguan mental (psikologi), termasuk kecenderungan bunuh diri
- peningkatan tekanan di mata (glaukoma)
- kecederaan dan ulser pada kornea mata
- keradangan yang teruk mengakibatkan lubang dan bernanah di permukaan usus besar
- keradangan lipatan kecil yang terbentuk dalam dinding usus (*diverticulitis*)
- pembedahan usus baru-baru ini
- kelumpuhan otot
- barah darah
- masalah intoleransi, kekurangan atau penyerapan gula yang diwarisi, tetapi jarang berlaku

Kanak-kanak dan remaja; kerana risiko pertumbuhan terbantut pada kanak-kanak, penilaian antara manfaat dan risiko rawatan dengan dexamethasone harus dipertimbangkan dengan teliti oleh doktor.

Terdapat bukti yang menunjukkan kesan sampingan berjangka panjang pada bayi pramatang yang mempunyai masalah pernafasan selepas rawatan awal dexamethasone.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil ubat lain termasuk yang diperolehi tanpa preskripsi. Ini termasuk ubat-ubatan herba. Ini kerana dexamethasone boleh mempengaruhi cara beberapa ubat berfungsi.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil salah satu daripada yang berikut:

- Cobicistat untuk rawatan jangkitan HIV
- Kontraseptif oral (seperti oestrogen)
- Antasid digunakan untuk melegakan pedih ulu hati, gangguan penghadaman atau sakit perut
- Antibiotik (seperti rifampicin dan fluoroquinolone)
- Carbamazepine, phenytoin dan primidone yang digunakan untuk mengawal kekejangan
- Barbiturate digunakan untuk merawat kesukaran tidur, sawan dan sakit kepala
- Antikulat (contohnya ketoconazole dan itraconazole)
- Ephedrine digunakan untuk merawat masalah pernafasan dan tekanan darah rendah
- ACE inhibitor digunakan untuk menurunkan tekanan darah
- Cardiac glycoside digunakan untuk merawat masalah jantung dan degupan jantung yang tidak teratur
- Ubat yang digunakan untuk mengeluarkan garam melalui kencing
- Laksatif yang digunakan untuk merawat sembelit
- Insulin dan ubat yang digunakan untuk merawat kencing manis
- Ubat Coumarin digunakan untuk menghalang pembekuan darah
- Ubat anti-radang bukan steroid (NSAID), salicylate dan indomethacin digunakan untuk melegakan kesakitan, mengurangkan keradangan dan demam
- Ubat pengenduran otot tertentu
- Atropin digunakan untuk meningkatkan kadar denyutan jantung
- Praziquantel digunakan untuk merawat jangkitan cacing

DEXIN TABLET

Dexamethasone (0.5mg)

- Chloroquine digunakan untuk mencegah dan merawat malaria
- Somatropin digunakan untuk merawat masalah pertumbuhan pada kanak-kanak dan orang dewasa
- Ubat yang digunakan untuk menekan atau mengurangkan sistem imunisasi badan

Cara menggunakan Dexin Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

1-4 tablet sehari, dalam dos tunggal atau dalam beberapa dos. Dos ditetapkan oleh doktor anda dan biasanya bergantung pada keterukan keadaan anda. Telan tablet keseluruhan dengan air dan jangan mengunyah.

Garis skor pada tablet bukannya untuk pembahagian.

- Bila perlu digunakan

Untuk diberikan dalam dos tunggal atau dalam beberapa dos atau seperti yang diarahkan oleh doktor.

- Berapa lama perlu digunakan

Sentiasa ikuti arahan doktor anda dan baca label. Sekiranya anda tidak pasti, tanyakan kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk mengambil Dexin Tablet, ambil dos seterusnya pada masa yang ditetapkan. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Jangan mengambil terlalu banyak tablet kerana ia akan meningkatkan kesannya dan kesan sampingan yang disenaraikan dalam risalah ini.

Beritahu doktor yang merawat simptom anda jika anda mengambil dos berlebihan dan doktor akan kurangkan dos dexamethasone anda secara perlahan-lahan.

Jangan berhenti mengambil Dexin Tablet secara tiba-tiba.

Semasa menggunakan Dexin Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan tepat, mengambil semua ubat yang dalam jumlah yang ditetapkan setiap hari.

Gangguan penglihatan boleh berlaku dengan penggunaan kortikosteroid. Semasa terapi jangka panjang dengan dexamethasone, pemeriksaan perubatan secara berkala (termasuk pemeriksaan mata setiap tiga bulan) diperlukan.

Pada dos yang tinggi, pastikan pengambilan kalsium dan vitamin D mencukupi dan pengambilan garam natrium dikawal

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil Dexin Tablet hanya kerana anda berasa lebih baik. Sekiranya anda hentikan ubat dengan terlalu cepat atau tiba-tiba, anda mungkin mendapat gejala yang lebih teruk.

Rawatan dengan glukokortikoid boleh menyebabkan penghasilan glukokortikoid tidak mencukupi oleh badan; bergantung pada dos dan tempoh rawatan.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Doktor atau ahli farmasi anda akan memberi anda nasihat mengenai cara mengurangkan dos yang anda ambil sekiranya anda perlu melakukannya.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai penggunaan produk ini, tanyakan kepada doktor atau ahli farmasi anda. Dexamethasone boleh menyebabkan keputusan positif dalam ujian doping dan boleh mempengaruhi ujian alergi.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Dexin Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Kesan serius:

Sekiranya anda mendapati anda mempunyai masalah ini berbincang dengan doktor dengan segera:

- Rasa tertekan, termasuk pemikiran bunuh diri
- Rasa terlalu teruja (mania) atau perubahan mood
- Rasa cemas, menghadapi masalah tidur
- Khayalan

Ini adalah tanda reaksi alahan dan anda mungkin perlu berhenti mengambil ubat.

- Segala jenis ruam kulit atau gatal-gatal pada kulit
- Kesukaran bernafas atau pengsan

Dengan dos dexamethasone yang tinggi, kadar denyutan jantung yang lebih perlahan mungkin berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Dexin Tablet

- Penyimpanan

Jauhkan semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C di tempat kering yang jauh daripada cahaya langsung.

- Pelupusan

Jangan buang ubat tersebut di dalam air buangan atau bersama-sama dengan sampah-sarap rumah apabila doktor atau

DEXIN TABLET

Dexamethasone (0.5mg)

ahli farmasi memberitahu anda untuk berhenti mengambil tablet ini atau ia telah tamat tempoh. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat yang tidak lagi diperlukan.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat berwarna putih tanpa bau dengan TPI timbul di satu sisi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Dexamethasone

- Bahan tidak aktif

Sodium benzoate, lactose, magnesium stearate, corn starch, sodium starch glycolate, croscarmellose sodium

- Nombor MAL:

MAL19890266ACZ

Pengilang

Teraputics Sdn. Bhd.

(590500-W)

Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang,
Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Zontron Pharmaceuticals Sdn. Bhd.

(445695-T)

Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

04/06/2021

Nombor Siri

NPRA(R4/1)030621/00038