

PANAMOL SUSPENSION

Paracetamol (250mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Panamol Suspension
2. Bagaimana Panamol Suspension berfungsi
3. Sebelum menggunakan Panamol Suspension
4. Cara menggunakan Panamol Suspension
5. Semasa menggunakan Panamol Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Panamol Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Panamol Suspension

Panamol Suspension digunakan untuk melegakan sakit dan demam.

Bagaimana Panamol Suspension berfungsi

Paracetamol berfungsi untuk menghalang penghantaran signal sakit sampai ke otak. Ia juga bertindak pada otak untuk mengurangkan demam.

Sebelum menggunakan Panamol Suspension

- Bila tidak boleh menggunakan:

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda alah kepada paracetamol atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam produk ini.

- Sebelum menggunakan Panamol Suspension:

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami keadaan berikut:

- penyakit hati atau buah pinggang yang teruk.
- Penyakit hati alkoholik
- Gejala yang berterusan
- mengandung, merancang untuk hamil atau menyusu. Paracetamol boleh digunakan semasa kehamilan jika betul-betul diperlukan dengan menggunakan dos terendah dalam

tempoh paling singkat. Paracetamol dirembes ke dalam susu ibu. Maklumat yang tersedia tidak menghalang penyusuan susu ibu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain:

Sila maklumkan kepada doktor anda jika anda mengambil:

- Sebarang ubat-ubatan lain, termasuk mana-mana ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.
- Ubat yang boleh mengganggu Panamol Suspension seperti:
 - Alkohol
 - Ubat anti-kemurungan
 - Ubat untuk mengurangkan muntah: Metoclopramide, Domperidone
 - Ubat anti-sawan
 - Ubat cair darah: Warfarin
 - Ubat untuk mengawal kolesterol: Cholestyramine
 - Pil perancang hormon

Cara menggunakan Panamol Suspension

- Berapa banyak harus digunakan:

Kanak-kanak (6 - 12 tahun): 5 ml - 10 ml
(1-2 sudu teh)
(1 - 5 tahun): 2.5 ml - 5ml
(1/2 - 1 sudu teh)

- Bila perlu digunakan :

- Untuk diberikan setiap 3 atau 4 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan lebih daripada 4 dos dalam tempoh masa 24 jam.
- Biarkan sekurang-kurangnya 4 jam antara dos

- Berapa lama perlu digunakan :

- Gunakan Panamol Suspension mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.
- Jangan berikan ubat ini kepada anak anda lebih pada 3 hari tanpa berbincang dengan doktor atau farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakan :

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda mengenai perkara yang harus anda lakukan sekiranya anda terlupa menggunakannya. Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos) :

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Gejala pengambilan paracetamol secara berlebihan dalam 24 jam pertama ialah pucat, loya, muntah, gangguan makanan dan sakit perut. Kerosakan hati yang ketara boleh terjadi dalam 12 hingga 48 jam pengambilan. Gangguan metabolisme gula dan terlalu banyak asid dalam badan mungkin akan berlaku.

Semasa keracunan yang teruk, ia boleh menyebabkan kerosakan otak dan kematian. Kegagalan buah pinggang akut dengan kematian sel, boleh berlaku. Denyutan jantung yang tidak teratur, keradangan pankreas dan kematian sel hati juga telah dilaporkan.

Semasa menggunakan Panamol Suspension

- Perkara yang perlu dilakukan :

- Guna ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan doktor, doktor gigi dan ahli farmasi bahawa anda sedang menggunakan Panamol Suspension.
- Beritahu doktor dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Goncang ubat sehingga sebatil sebelum menggunakannya.

PANAMOL SUSPENSION

Paracetamol (250mg/5ml)

- Sentiasa gunakan sudu yang dibekalkan bersama pek.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan :

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi Panamol Suspension kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.
- Ubat ini mengandungi PARACETAMOL. Jangan gunakan dengan produk lain yang mengandungi paracetamol.
- Jangan terlebih isi sudu.

- Perkara yang perlu diberi perhatian :

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika ubat ini menyebabkan anda rasa loya pening, letih, atau menyebabkan anda rasa sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan- kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Panamol Suspension boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan paracetamol jarang berlaku tetapi Sindrom Stevens-Johnson, Toxic Epidermal Necrolysis telah dilaporkan. Terdapat laporan tentang gangguan darah termasuk platelet dan sel darah putih rendah dalam darah.

AMARAN ALAHAN UBAT:
Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala-gejalanya termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini boleh menjadi tanda-tanda

untuk keadaan yang serius. Jika keadaan ini berlaku, penggunaan harus dihentikan dan dapatkan perhatian perubatan dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Panamol Suspension

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C di tempat kering dan jauh daripada cahaya. Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Ampaian likat yang berwarna oren dengan bau buah dan rasa manis.

- Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif
Paracetamol

-Bahan tidak aktif

Tutti fruity, sorbitol, propylene glycol, sugar, purified water, sodium saccharin, sodium chloride, methyl paraben, propyl paraben, rhodigel, titanium dioxide, liquid glucose, silicone antifoam emulsion, sunset yellow, gum tragacanth.

-Nombor MAL:

MAL19940171XCZ

Pengilang

Teraputics Sdn. Bhd. (590500-W)
Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat S.P.S. Penang, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Zontron Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
(445695-T)
Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat S.P.S. Penang, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

14/10/2022

Nombor Siri

NPRA(R4/1)12102022/00086