

U-ALKALIZER POTASSIUM CITRATE MIXTURE

Potassium Citrate (3 g setiap 10mL)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan U-Alkalizer Potassium Citrate
2. Bagaimana U-Alkalizer Potassium Citrate berfungsi
3. Sebelum menggunakan U-Alkalizer Potassium Citrate Mixture
4. Cara menggunakan U-Alkalizer Potassium Citrate Mixture
5. Semasa menggunakan U-Alkalizer Potassium Citrate Mixture
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan U-Alkalizer Potassium Citrate Mixture
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan U-Alkalizer Potassium Citrate

U-Alkalizer Potassium Citrate digunakan untuk menjadikan air kencing kurang berasid.

Bagaimana U-Alkalizer Potassium Citrate berfungsi

Ubat ini mengandungi potassium citrate yang menjadikan air kencing kurang berasid dan mengurangkan rasa sakit atau iritasi semasa membuang air kecil.

Sebelum menggunakan U-Alkalizer Potassium Citrate

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil U-Alkalizer Potassium Citrate jika anda mempunyai:

- alahan kepada potassium citrate atau bahan-bahan lain di dalam U-Alkalizer Potassium Citrate. (disenaraikan dalam maklumat lanjut)
- paras kalium yang tinggi dalam darah
- masalah buah pinggang
- penyakit Addison (penghasilan hormon steroid yang tidak mencukupi).
- masalah degupan jantung yang tidak teratur.

Beritahu kepada doktor anda jika anda mengalami masalah jantung.

- Sebelum mula menggunakan U-Alkalizer Potassium Citrate

Ubat ini melegakan gejala yang dialami dan tidak boleh digunakan untuk merawat jangkitan bakteria. Doktor anda mungkin akan memberikan antibiotik yang bersesuaian untuk diambil bersama dengan ubat ini.

Mengandung dan menyusukan anak.

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil:

- ubat yang mengandungi kalium
- ubat potassium sparing diuretics (ubat untuk tekanan darah tinggi) yang meningkatkan kadar kalium (misalnya ACE inhibitors, ciclosporin, aliskiren).
- cardiac glycosides (ubat yang diambil untuk masalah jantung) tetracycline antibiotik ubat tahan sakit seperti salicylates

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan U-Alkalizer Potassium Citrate

- Berapa banyak harus digunakan

Goncang ubat sebelum minum.

Setiap dos ubat ini boleh dicairkan dengan 50 ml air minuman.

Dewasa: 10-20 ml

Kanak-kanak: 1 tahun ke atas : 2.5 ml,

1 - 5 tahun : 5 ml,

6 - 12 tahun : 10 ml

- Bila perlu digunakan

- Ambil 3 kali sehari selepas makan atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan U-Alkalizer Potassium Citrate secara berlebihan mungkin menyebabkan:

- loya, muntah, sakit perut
- tahap kalium yang tinggi (kelemahan otot atau kebas pada anggota badan) dan metabolik asid (kekeliruan, peningkatan kadar degupan jantung).

Semasa menggunakan U-Alkalizer Potassium Citrate

- Perkara yang perlu dilakukan

- Guna ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan U-Alkalizer Potassium Citrate.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan hentikan penggunaan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

U-ALKALIZER POTASSIUM CITRATE MIXTURE

Potassium Citrate (3 g setiap 10mL)

- Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi U-Alkalizer Potassium Citrate kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati ketika memandu atau menggunakan mesin sehingga anda tahu bagaimana kesan U-Alkalizer Potassium Citrate terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, U-Alkalizer Potassium Citrate boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Beritahu doktor anda jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan berikut:

- mual dan kadang-kadang muntah boleh berlaku yang disebabkan oleh iritasi gastrik.
- Tahap kalium tinggi dalam darah

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan U-Alkalizer Potassium Citrate

- Penyimpanan

Jauhkan semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C di tempat kering dan terlindung daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan

lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap yang tidak berwarna, jernih hingga sedikit keruh dengan bau limau dan rasa masin.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Potassium Citrate

- Bahan tidak aktif

Lemon flavour, propylene glycol, propyl paraben, sugar, methyl paraben, sodium saccharin, sodium chloride, purified water, citric acid anhydrous

- Nombor MAL:

MAL19940179XC

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Terapeutics Sdn. Bhd. (590500-W)
Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B,
14100 Simpang Ampat, S.P.S.,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

14/01/2022

Nombor Siri

NPRA(R4/1)130122/00008.