

MMT MIXTURE

Magnesium Carbonate Light/Magnesium Trisilicate/Sodium Bicarbonate
(228.5mg/228.5mg/228.5mg per 5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan MMT Mixture
2. Bagaimana MMT Mixture berfungsi
3. Sebelum menggunakan MMT Mixture
4. Cara menggunakan MMT Mixture
5. Semasa menggunakan MMT Mixture
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan Pelupusan MMT Mixture
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan MMT Mixture

MMT Mixture digunakan untuk melegakan kesakitan dan ketidakselesaan di perut akibat asid berlebihan.

Bagaimana MMT Mixture berfungsi

Ubat ini mengandungi antasid untuk mengurangkan asid perut berlebihan.

Sebelum menggunakan MMT Mixture

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil MMT Mixture jika:

- anda mengalami kegagalan buah pinggang yang teruk atau tahap fosfat dalam darah rendah.
- anda alah kepada bahan yang terkandung di ubat ini.
- anda ada masalah kegagalan fungsi jantung, tekanan darah tinggi atau hati berparut.
- Anda ada masalah pernafasan, tahap kalsium dalam darah rendah atau tahap asid perut rendah.

- Sebelum mula menggunakan MMT Mixture

- Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.
- Maklumkan kepada doktor sekiranya anda sedang mengalami masalah kesihatan seperti:

- pengumpulan cecair dalam badan.
- kemerosotan buah pinggang.
- sawan semasa mengandung dengan tekanan darah tinggi.
- pengeluaran hormon aldosteron yang berlebihan.
- Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mengandung, mungkin mengandung atau menyusukan anak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Antasid boleh berinteraksi dengan sebilangan besar ubat lain sehingga mengurangkan keberkesanannya. Untuk mengurangkan risiko interaksi, produk ini tidak boleh diambil dalam masa dua hingga empat jam dengan ubat-ubatan lain termasuk:

- tetracycline, azithromycin, rifampicin (antibiotik)
- salicylates seperti aspirin (ubat tahan sakit)
- lansoprazole (ubat gastrik)
- digoxin (ubat kegagalan fungsi jantung)
- gabapentin, phenytoin (rawatan untuk epilepsi)
- rosuvastatin (rawatan untuk kolesterol tinggi)
- atazanavir (antivirus)
- polystyrene sulphonate resins (digunakan untuk tahap kalium darah tinggi)
- ketoconazole, itraconazole (digunakan untuk jangkitan kulat pada kulit)
- kortikosteroid (ubat anti-radang)

Cara menggunakan MMT Mixture

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: 5ml – 20ml

- Bila perlu digunakan

Untuk digunakan 3 hingga 4 kali sehari selepas makan dan sebelum tidur atau ambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan MMT Mixture dalam jangka masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk mengambil MMT Mixture, ambilkannya secepat mungkin apabila anda ingat dan kemudian ambil dos seterusnya mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan MMT Mixture secara berlebihan mungkin menyebabkan:

- Peningkatan kepekatan natrium dalam darah
- Tahap magnesium dalam darah tinggi (e.g. loya, muntah, kulit kemerah-merahan, dahaga, mengantuk, tekanan darah rendah, kekeliruan, kekurangan refleks, degupan jantung berkurang atau tidak teratur, susah bernafas, koma dan serangan jantung.
- tahap kalium rendah (e.g. perubahan mood, keletihan, sesak nafas, otot lemah dan degupan jantung tidak teratur).

Semasa menggunakan MMT Mixture

- Perkara yang perlu dilakukan

- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan MMT Mixture.

MMT MIXTURE

Magnesium Carbonate Light/Magnesium Trisilicate/Sodium Bicarbonate
(228.5mg/228.5mg/228.5mg per 5ml)

- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi MMT Mixture dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati ketika memandu atau menggunakan mesin sehingga anda tahu bagaimana kesan MMT Mixture terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, MMT Mixture boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Jika kesan sampingan berterusan, jangan ambil ubat ini dan rujuk doktor.

Beritahu doktor anda jika anda dapati mana-mana kesan sampingan berikut atau mengalami apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

- Cirit-birit
- kekejangan perut, kembung perut
- bengkak tekak, lidah dan muka

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan MMT Mixture

- Penyimpanan

Jauhkan semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C di tempat kering yang jauh daripada cahaya langsung.

- Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Campuran berwarna putih hingga putih kekuningan dengan bau pudina dan rasa masin yang akan dipisahkan apabila dibiarkan..

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Magnesium Carbonate Light, Magnesium Trisilicate, Sodium Bicarbonate

- Bahan tidak aktif

Propyl Paraben, Methyl Paraben, Propylene Glycol, Peppermint oil, Tween 80, purified water

- Nombor MAL:

MAL19940180XC

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Terapeutics Sdn. Bhd. (590500-W)
Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

05/07/2021

Nombor Siri

NPRA (R4/1)020721/00059