

BEPROSALIC OINTMENT

Betamethasone Dipropionate / Salicylic Acid (0.05%w/w / 3%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan BEPROSALIC OINTMENT
2. Bagaimana BEPROSALIC OINTMENT berfungsi
3. Sebelum menggunakan BEPROSALIC OINTMENT
4. Cara menggunakan BEPROSALIC OINTMENT
5. Semasa menggunakan BEPROSALIC OINTMENT
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan BEPROSALIC OINTMENT
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim tentang BEPROSALIC OINTMENT. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang tersedia. Ia juga tidak menggantikan tempat ahli farmasi atau doktor anda.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Ahli farmasi atau doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda menggunakan BEPROSALIC OINTMENT berbanding manfaat yang mereka jangka untuk anda.

Simpan risalah ini bersama ubat. Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan BEPROSALIC OINTMENT

BEPROSALIC OINTMENT diindikasikan untuk kelegaan daripada manifestasi radang hyperkeratotic dan dermatoses kering responsif kortikosteroid. Ini termasuk:

- *Psoriasis* (keadaan kulit yang menyebabkan tompok-tompok merah, tidak stabil dan kulit

rekah yang diliputi dengan sisik keperakan).

- *Kronik Atopic Dermatitis* (keadaan yang membuatkan kulit merah dan gatal).
- *Neurodermatitis* (keadaan kulit yang bermula dengan gatal).
- *Planus liken* (tidak berjangkit, ruam gatal yang boleh memberi kesan kepada banyak bidang badan).
- *Ekzema* (istilah untuk sekumpulan masalah kesihatan yang menyebabkan kulit menjadi radang atau gatal-gatal).
- *Dyshidrosis* (keadaan kulit di mana lepuh pada tapak kaki atau/ dan tangan).
- *Seborrheic dermatitis* kulit kepala (biasa, keadaan kulit radang yang menyebabkan tidak stabil, putih kepada skala kekuningan untuk membentuk pada kawasan berminyak seperti kulit kepala. Ia boleh berlaku dengan atau tanpa kulit merah).
- *Ichthyosis vulgaris* (keadaan kulit yang menyebabkan sel-sel kulit mati dan kering berkumpul pada tompok-tompok atas permukaan kulit).
- *Ichthyotic* lain (sejenis penyakit kulit sejak lahir, biasanya ia keturunan dengan keadaan kulit yang kering, tebal, dan bersisik).

Bagaimana BEPROSALIC OINTMENT berfungsi

BEPROSALIC OINTMENT mengandungi ubat yang disebut Betamethasone Dipropionate dan Salicylic Acid. Betamethasone Dipropionate ialah kortikosteroid berfluorin yang aktif secara topikal dan mempunyai tindakan antiinflamatori, anti-kegatalan dan pengecutan salur darah. Salicylic Acid mempunyai keupayaan untuk

melembutkan lapisan kulit bersisik, tindakan antibakteria dan antikulat.

Tanya ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang ubat ini.

Sebelum menggunakan BEPROSALIC OINTMENT

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna ubat ini sekiranya anda alergi (hipersensitif) terhadap Betamethasone Dipropionate, kortikosteroid lain, Salicylic Acid atau salicylate lain, atau sebarang komponen lain dalam produk ini.

Kortikosteroid topikal tidak digalakkan dalam kebanyakan jangkitan virus kulit, batuk kering serta jerawat.

-Sebelum mula menggunakan

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda:

- Jika anda mempunyai jangkitan pada kulit anda dan nyatakan bahagian yang dijangkiti.
- Jika anda menggunakan produk kulit yang lain

Kehamilan dan penyusuan:

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini sekiranya anda hamil atau menyusu. Ia boleh digunakan hanya jika potensi manfaat melebihi potensi risiko kepada janin atau bayi yang menyusu.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda sedang mengambil apa-apa produk lain (misalnya ubat yang dibeli di kaunter, ubat yang dipreskripsikan dan produk-produk herba).

Cara menggunakan BEPROSALIC OINTMENT

Sentiasa guna ubat ini seperti yang dinasihatkan oleh doktor anda. Tanya doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

-Berapa banyak harus digunakan

Sapukan lapisan tipis untuk melitupi seluruh kawasan yang terjejas dan gosok dengan berhati-hati.

-Bila perlu digunakan

Sapukan ubat dua kali sehari, pagi dan malam. Jika penyakit kulit anda semakin pulih, beritahu doktor kerana anda mungkin boleh menggunakan ubat ini secara kurang kerap.

-Berapa lama perlu digunakan

Jangan guna ubat ini untuk tempoh masa yang panjang kecuali diarahkan oleh doktor.

-Jika terlupa menggunakan

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Gunakan dos yang terlupa itu sebaik sahaja anda ingat. Jika sudah hampir dengan waktu untuk dos yang seterusnya, tunggu sehingga tibanya waktu itu untuk menggunakan ubat ini dan abaikan sahaja dos yang tertinggal itu. Jangan guna dua dos sekali untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil ubat ini berlebihan, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda. Bawa sebarang baki ubat bersama anda.

Semasa menggunakan BEPROSALIC OINTMENT

-Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda bersedia untuk memulakan pengambilan ubat baru yang lain, maklumkan ahli farmasi atau doktor anda yang anda sedang menggunakan BEPROSALIC OINTMENT.

Hubungi doktor jika anda mengalami penglihatan yang kabur atau gangguan penglihatan yang lain.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan melainkan dibenarkan oleh doktor anda.

Jangan sapu dalam atau sekeliling mata.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Hentikan penggunaan jika berlaku kerengsaan, sensitiviti, kekeringan atau tindak balas yang berlebihan.

Kortokosteroid yang disapu pada kulit boleh diserap dengan jumlah yang mencukupi untuk menghasilkan kesan sistemik seperti penindasan adrenal, manifestasi sindrom *Cushing*, tahap gula dalam darah tinggi dan kehadiran gula dalam urin.

Salicylic Acid dalam penyediaan yang digunakan untuk kulit juga boleh diserap dalam jumlah yang mencukupi untuk menghasilkan *salicylism* seperti loya, muntah-muntah dan bunyi deringan dalam telinga.

Dengan itu, langkah berjaga-jaga yang sesuai perlu diambil semasa rawatan yang berpanjangan, apabila merawat kawasan permukaan badan yang luas, apabila menggunakan teknik balutan dan apabila merawat kanak-kanak (disebabkan nisbah jumlah luas permukaan kepada berat badan yang lebih besar).

Langkah berjaga-jaga yang sesuai perlu diambil apabila merawat dermatitis stasis (keradangan kulit)

dan penyakit kulit yang lain dimana peredaran darah terjejas.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, BEPROSALIC OINTMENT boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Tindak balas sampingan yang pernah dilaporkan adalah rasa pedih, rasa gatal-gatal, perengsaan, kekeringan, keradangan folikel rambut, pertumbuhan rambut yang tidak normal, jerawat, menipiskan kulit, mencerahkan warna kulit, jangkitan sekunder, melembutkan dan melemahkan kulit, tanda regangan, ruam panas dan penglihatan kabur. Persediaan Salicylic Acid boleh menyebabkan keradangan kulit.

Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan ini, walaupun yang tidak dinyatakan di dalam risalah ini, maklumkan doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan BEPROSALIC OINTMENT

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Tutup dengan rapat dan betul. Lindungi daripada cahaya terik. Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Lupuskan ubat selepas tarikh luput. Sila dapatkan nasihat ahli farmasi tentang cara pelupusan sebarang ubat yang tidak digunakan lagi.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

BEPROSALIC OINTMENT
berwarna putih dan boleh didapati
dalam 15g tiub aluminium.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan-bahan aktif:
Betamethasone Dipropionate 0.064
% w/w (setara dengan 0.05% w/w
betamethasone) dan Salicylic Acid
3%w/w

-Bahan-bahan tidak aktif:
White Soft Paraffin dan Liquid
Paraffin.

-Nombor MAL: MAL19871164AZ

**Pengilang dan Pemegang
Pendaftaran Produk:**

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

14/02/2023

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)140818/00237