

DECOZOL CREAM

Miconazole Nitrate (2%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan DECOZOL CREAM
2. Bagaimana DECOZOL CREAM berfungsi?
3. Sebelum mengambil DECOZOL CREAM
4. Cara menggunakan DECOZOL CREAM
5. Semasa menggunakan DECOZOL CREAM
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan DECOZOL CREAM
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim tentang DECOZOL CREAM. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang tersedia. Ia juga tidak menggantikan tempat ahli farmasi atau doktor anda.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Ahli farmasi atau doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda mengambil DECOZOL CREAM berbanding manfaat yang mereka jangka untuk anda.

Jika anda mempunyai sebarang kemusykilan tentang pengambilan ubat ini, tanya ahli farmasi atau doktor anda.

Simpan risalah ini bersama ubat. Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan DECOZOL CREAM?

DECOZOL CREAM digunakan untuk rawatan jangkitan kulat pada kulit atau kuku termasuk dermatophytes, yis dan beberapa jenis bakteria. Ini termasuk *Tinea*

pedis (Kaki atlet), *Tinea cruris*, *Tinea corporis*, kandidiasis kulit (jangkitan kulat kulit yang disebabkan oleh yis) dan *Tinea versicolor* (panau badan).

Bagaimana DECOZOL CREAM berfungsi?

Ubat ini mengandungi *Miconazole Nitrate* yang mempunyai aktiviti fungistatik terhadap beberapa kulat yang menyebabkan *mycoses* sistemik.

Miconazole Nitrate, antikulat imidazole yang berfungsi dengan mengganggu sintesis ergosterol dan mengubah kebolehtelapan membrane sel kulat yang sensitif.

Sebelum menggunakan DECOZOL CREAM

Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan DECOZOL CREAM sekiranya:

- Anda alergi (hipersensitif) terhadap *Miconazole Nitrate* atau apa-apa bahan dalam ubat ini.

Sebelum mula menggunakan

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda:

- **Jika anda hamil, menyusu atau bercadang untuk hamil.** Jika anda telah berbincang dengan doktor atau ahli farmasi, ikut arahan mereka dengan teliti.
- anda sedang melalui terapi warfarin

Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda sedang mengambil apa-apa produk lain (misalnya ubat yang dibeli tanpa preskripsi doktor, ubat yang

dipreskripsikan dan produk-produk herba). Tiada rekod interaksi DECOZOL CREAM dengan ubat lain.

Cara menggunakan DECOZOL CREAM

Selalu menggunakan DECOZOL CREAM seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak yang berumur melebihi 2 tahun:

- Cuci dan keringkan kawasan yang terlibat. Sapukan dengan berhati-hati pada bahagian yang terlibat dan kawasan sekitarnya.
- Jangkitan kulit : Sapu dua kali sehari, pagi dan petang atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangkitan kuku : sapu sekali sehari.

Bila perlu digunakan

Rawatan harus dimulakan secepat mungkin selepas jangkitan pertama.

Berapa lama perlu digunakan

Rawatan perlu diteruskan sekurang-kurangnya satu minggu selepas kehilangan semua tanda-tanda dan gejala. Ini akan menghentikan jangkitan daripada kembali.

Jika kawasan yang terjejas masih tidak sembuh selepas tempoh rawatan, penggunaan krim harus berhenti dengan segera dan beritahu doktor anda.

Jika keadaan menjadi lebih teruk atau tidak bertambah baik selepas penggunaan produk ini seperti yang diarahkan, dapatkan nasihat doktor.

Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda mengingatinya. Jangan menggandakan dos untuk menganti dos yang tertinggal.

Jika menggunakan secara berlebihan (terlebih dos)

Jika, tersilap menggunakan lebih daripada yang anda perlu, jangan bimbang. Jika anda sapu terlalu banyak atau tertelan, ia boleh membuat anda sakit. Berbincang dengan doktor anda atau pergi ke hospital secepat mungkin.

Semasa menggunakan DECOZOL CREAM

Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru yang lain, ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi dan ubat-ubatan herba, beritahu doktor atau ahli farmasi anda bahawa anda sedang menggunakan DECOZOL CREAM.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan guna pada mata dan membran mukus (untuk kegunaan luar sahaja). DECOZOL CREAM boleh menyebabkan kerengsaan kulit. Jika anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan.

Jangan beri ubat ini kepada kanak-kanak di bawah 2 tahun.

- Dapatkan nasihat daripada doktor anda jika anda ingin memberi ubat ini kepada kanak-kanak di bawah 2 tahun.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian khusus perlu diambil untuk mengelakkan penggunaan dengan tidak sengaja ke dalam mata. Jika kerengsaan atau sensitiviti berlaku, rawatan perlu dihentikan. Nasihat

untuk berjumpa dengan doktor jika tiada tanda sembuh.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, DECOZOL CREAM boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Seperti semua ubat-ubatan, sesetengah orang mungkin alah terhadap krim.

Kesan sampingan yang jarang dilaporkan akibat *Miconazole Nitrate* termasuk rasa pedih, terbakar, edema, vesication, desquamation, kegatalan, sesak nafas dan urticarial. Jika kerengsaan atau sensitiviti berlaku, rawatan perlu dihentikan.

Jika gejala berterusan atau anda mengalami kesan sampingan yang tidak tersebut di atas, sila jumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Untuk Kegunaan Luar Sahaja. Tidak boleh digunakan untuk kegunaan pada mata (oftalmik).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)*) or *Vaccines (AEFI)*.

Cara penyimpanan dan pelupusan DECOZOL CREAM

Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Tutup dengan rapat dan betul. Lindungi daripada cahaya terik. Jauhi daripada kanak-kanak.

Pelupusan

Lupuskan ubat selepas tarikh luput.

Sila dapatkan nasihat ahli farmasi tentang cara pelupusan sebarang ubat yang tidak digunakan lagi.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna DECOZOL CREAM

DECOZOL CREAM adalah krim putih dan boleh didapati dalam 15g tiub aluminium.

Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan aktif:
Miconazole Nitrate 2%w/w

Bahan-bahan tidak aktif:
Chlorocresol, White Soft Paraffin, Liquid Paraffin, Propylene Glycol, Cetostearyl Alcohol, Cetomacrogol 1000 dan Purified Water.

Nombor MAL: MAL19986504AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Pengilang

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohd. 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohd. 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Tarikh kemaskini RiMUP

7/12/2020

Nombor siri :

NPRA(R2/1)201130/571